MATHESIS
Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche

SCUOLA ESTIVA

Il tema dei luoghi Geometrici

Montegrotto Terme, 22-25 Luglio 2014

Emilio Ambrisi

Qual è il grafico di $y = f(x)$?

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Esistono solo cinque poliedri regolari

Equazioni di luoghi geometrici

Permutazioni
Disposizioni
Combinazioni

Come approssimare e , π , φ

$\aleph_0$

Chi è *aleph-zero*?

Equazioni?

Problemi di massimo e minimo

Applicazione degli integrali al calcolo di aree e volumi

Dall'andamento del grafico alla possibile espressione analitica della funzione

Come approssimare un integrale definito

I teoremi di *Lagrange*, *Rolle*, *l'Hôpital*

Il principio di induzione

Principio di Cavalieri

Cos'è un sistema assiomatico?

Quante volte devo giocare al lotto per vincere?

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Le Indicazioni Nazionali

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi.

Che cos'è un luogo geometrico?

- Già in Euclide la retta come luogo dei punti che “giacciono ugualmente su stessi”. La definizione IV:
- *Linea retta è quella che giace ugualmente rispetto ai punti su essa (cioè, ai suoi punti)*
- Negli Elementi dell'edizione UTET di Lamberto Maccioni e Attilio Frajese

Nell'insegnamento

- Punti notevoli di un triangolo
- Asse di un segmento
- Bisettrice di un angolo (luogo dei centri delle circonferenze inscritte, luogo dei punti equidistanti dai lati)
- Luogo dei punti che vedono sotto angolo assegnato gli estremi di un segmento...

Tanti i temi assegnati alla maturità e ai concorsi a cattedre come punto di arrivo della comprensione della geometria analitica.

Esami di Stato del 2007

Si considerino i triangoli la cui base è $AB=1$ e il cui vertice C varia in modo che l'angolo $\hat{C}AB$ si mantenga doppio dell'angolo ABC .

1. Riferito il piano ad un conveniente sistema di coordinate, si determini l'equazione del luogo geometrico γ descritto da C .
2. Si rappresenti γ , tenendo conto, ovviamente, delle prescritte condizioni geometriche.
3. Si determini l'ampiezza dell'angolo ABC che rende massima la somma dei quadrati delle altezze relative ai lati AC e BC e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato in gradi e primi (sessagesimali).
4. Si provi che se $\hat{ABC} = 36^\circ$ allora è $AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

Le reazioni al problema

- Problema fu giudicato difficile
- Proteste (la fronda veneta) e riprese vigore la proposta di un Syllabus per la prova scritta.
- Un ordinario di geometria: lasciate che i luoghi geometrici si trattino all'Università

1748

INSTITUZIONI
ANALITICHE
AD USO
DELLA GIOVENTU' ITALIANA
DI D.^{NA} MARIA GAETANA
AGNESI
MILANESE

Dell' Accademia delle Scienze di Bologna.

TOMO I.

IN MILANO, MDCCXLVIII.

NELLA REGIA-DUCAL CORTE.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AL LETTORE.

On avvi alcuno, il quale informato
essendo delle Matematiche cose,
non sappia altresì quanto, in oggi
spezialmente, sia necessario lo stu-
dio dell'Analisi, e quali progressi
si sieno con questa fatti, si faccia-
no tuttora, e possano sperarsi nell'
avvenire; che però non voglio, nè debbo trattenermi
qui in lodando quella scienza, che punto non ne abbi-
sogna, e molto meno da me. Ma quanto è chiara la
necessità di lei, onde la Gioventù ardentemente s'in-
voglj di farne acquisto, grandi altrettanto sono le diffi-
coltà, che vi s'incontrano, sendo noto, e fuor di dub-
bio, che non ogni Città, almeno nella nostra Italia,
à persone, che sappiano, o vogliano insegnarla, e non
tutti anno il modo di andar fuori della Patria a cercar-
ne

LA VERSIERA

PROBLEMA III.

238. Dato il semicircolo ADC (Fig. 135.) del diametro AC ; si ricerca fuori di esso il punto M tale, che condotta MB normale al diametro AC , che taglierà il circolo in D , sia $AB, BD :: AC$ alla BM , e perchè infiniti sono i punti M , che soddisfanno al problema, se ne dimanda il luogo.

Sia M uno di questi punti, e chiamata $AC = a$, $AB = x$, $BM = y$, farà, per la proprietà del circo-

PROBLEMA IIL

238. Dato il semicircolo ADC (Fig. 135.) del diametro AC; si ricerca fuori di esso il punto M tale, che condotta MB normale al diametro AC, che taglierà il circolo in D, sia AB, BD::AC alla BM, e perciò infiniti sono i punti M, che soddisfanno al problema, se ne dimanda il luogo.

Sia M uno di quelli punti, e chiamata $AC=a$, $AB=x$, $BM=y$, sarà, per la proprietà del circo-

In occasione degli esami di Stato del giugno di quest'anno, i media hanno potuto parlare di matematica al grande pubblico in un modo diverso. Qualche giornale ha titolato: "Quintiliano al classico, Fitzgerald al linguistico e Agnesi allo scientifico". Al nome di Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) riconduceva infatti uno dei problemi assegnati ai giovani candidati: lo studio di una curva molto bella e interessante, nota appunto come *versiera di Agnesi*. In copertina, e qui sopra, la versiera è riportata nel disegno e nella formulazione che si ritrovano nelle *Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana* del 1748, scritte onde la gioventù ardente s'invogli di "fare acquisto" di una disciplina necessaria alla loro formazione e con un titolo decisamente importante e significativo per l'epoca. L'opera dell'Agnesi ebbe, per tali motivi, grande diffusione e influenza didattica e fu anche tradotta in altre lingue.

Mathesis

Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
Dipartimento di Matematica, Facoltà di Scienze
Seconda Università di Napoli
Via Vivaldi 43 - 81100 Caserta
www.mathesisnazionale.it

ISSN: 1582-8832

Periodico di matematiche

Numero 2, Mag-Ago 2013, Volume 5, Serie XI, Anno CXXIII

Rivista quadrimestrale

Periodico di matematiche

Organo della
MATHESIS

Società italiana di scienze
matematiche e fisiche
fondata nel 1895

Numero 2 Mag-Ago 2013

Volume 5 Serie XI

Anno CXXIII

Una delle formulazioni proposte (2013)

Sia f la funzione definita, per tutti gli x reali, da $f(x) = 8/(4+x^2)$

1. Si studi f e se ne disegni il grafico Φ in un sistema di coordinate cartesiane Oxy . Si scrivano le equazioni delle tangenti a Φ nei punti $P(-2;1)$ e $Q(2;1)$ e si consideri il quadrilatero convesso che esse individuano con le rette OP e OQ . Si provi che tale quadrilatero è un rombo e si determinino le misure, in gradi e primi sessagesimali, dei suoi angoli.
2. [Sia \$\Gamma\$](#) la circonferenza di raggio 1 e centro $(0;1)$. Una retta t , per l'origine degli assi, taglia Γ oltre che in O in un punto A e taglia la retta d'equazione $y=2$ in un punto B . Si provi che, qualunque sia t , l'ascissa x di B e l'ordinata y di A sono le coordinate $(x; y)$ di un punto di Φ .

Concorso a cattedre del 2000

- Nel piano, sono dati: il cerchio γ di diametro AB , la retta t tangente ad esso in B , una retta r passante per A , i punti C, D intersezione di r rispettivamente con γ e t . Al variare di r , i punti P di essa per i quali è $AP=CD$ (in valore e segno) descrivono la notissima [cissoide](#) di Diocle. Il candidato dopo averne esplicitato le equazioni – parametriche, cartesiana e polare – e calcolato le aree che essa delimita sia con il cerchio γ sia con l'asintoto si soffermi sull'utilizzo fattone da Diocle per duplicare il cubo. In ordine a tale ultima questione chiarisca il significato di problema classico dell'antichità e la visione più attuale di risolubilità di un problema.

Laboratorio a distanza MATMEDIA

Home

Antologia

Archivio

Biblioteca

Orientamento
e Valutazione

Esami di Stato

Formazione

Insegnamento

Matematica
Società

Programmi

Ricerca in Rete

Tecnologie

$$x^3 = (a - x)y^2$$

Si riporti sulla tangente in A alla circonferenza un segmento $AS=2a$. Conguiamo S con B e detta U l'intersezione di SB con la cissoide, si unisca U con B, l'intersezione di AU con la tangente in B alla circonferenza (che è l'asintoto della cissoide).

Si ha che BT è il lato del cubo di volume doppio di quello considerato. Infatti consideriamo i triangoli SAB e UHB ; essi sono simili per cui possiamo scrivere: $\overline{SA} : \overline{AB} = \overline{UH} : \overline{HB}$.

U è un punto della cissoide di coordinate (x,y) con $0 \leq x \leq a$. La proporzione precedente diventa:

$$2a : a = y : (a - x) \Rightarrow 2 = \frac{y}{a - x}; \quad \text{dall'equazione della cissoide } x^3 = (a - x)y^2 \text{ segue che } \frac{1}{a - x} = \frac{y^2}{x^3}.$$

Concorso a cattedre del 2000

- Una delle curve più famose è certamente la cicloide definita altresì l'«*Hélène de la géométrie*». Il candidato spieghi in che cosa essa consista; ne derivi (per la cicloide ordinaria) le equazioni e le misure delle grandezze più significative. Ne chiarisca infine le proprietà di tautocrona e di brachistocrona.
- George B. Thomas, JR. Ross L. Finney, *Analisi Matematica*, Zanichelli

Il luogo per eccellenza la Sfera /Circonferenza

- *Deus est sphaera cuius centrum ubique, circumferentia nusquam*
- Appare per la prima volta in un manoscritto del XII secolo.
- San Bonaventura (1221- 1274) in *Itinerarium mentis ad Deum*:
“Poichè Dio è eterno e assolutamente attuale, abbraccia e compenetra tutte le porzioni di tempo, quasi esistendo simultaneamente in tutti i loro momenti come loro centro e circonferenza. Poichè è infinitamente semplice e infinitamente grande, si trova, in tutta la sua completezza, all’interno ed all’esterno di tutto; ed è per questo che è una sfera intelligibile che ha il centro dovunque e la circonferenza in nessun luogo”.

Archetipo geometrico

- Invariante per omotetie, mantiene la sua struttura globale simile al suo germe, un'altra solidarietà tra locale/globale.
- ha influenzato tutto: teoria e pratica, dottrine teologiche, cosmologiche, psicologiche, utopistiche, sociologiche, letterarie, urbanistiche....
- G.Poulet, *Metamorfosi del cerchio*, Rizzoli 1971
- Umanesimo e Rinascimento: *Passando attraverso le età il grande emblema del centro e della sfera ha cambiato senso in maniera singolare. Ormai non si applica più esclusivamente a Dio, ma anche all'uomo. E' l'uomo che, pari a Dio, scopre di essere centro e sfera infinita*

LE CONICHE

- La teoria delle coniche è sviluppata da Apollonio (262-190 a.C.) – ultimo degli alessandrini - nell’opera “sezioni coniche”: 8 libri per 487 proposizioni.
- Abbiamo: i primi 4 conservati in manoscritti greci del XII e XIII sec. e il V-VI-VII in traduzioni arabe del 1300; l’ottavo è perduto.
- **Perchè un’opera così importante è andata perduta?**
- fu decisamente una delle più profonde conquiste della geometria classica greca ma è il ‘600, il secolo matematico per eccellenza – secondo M. Kline - a conferire loro l’importanza che hanno.

Il canone della purezza

- “...per la geometria classica la retta e il cerchio occupano un posto privilegiato; l’uso delle coniche o di altre curve nelle costruzioni grafiche è considerato illegittimo, e alcuni strumenti poco più complicati del compasso ordinario vengono riguardati come strumenti imperfetti, da usarsi, occorrendo per la pratica, ma indegni di penetrare nel tempio della geometria pura.” (E. Artom in Enciclopedia Hoepli, delle Matematiche Elementari e Complementi)
- “Nella sua interezza il cerchio è centralmente presente nel centro; poichè il centro è la causa, e il cerchio è ciò che viene causato da esso” (Proclo)
- **Apollonio non ha avuto al pari di Euclide un commentatore come Proclo**

L'arte dei numeri di J. Dieudonné -tra i dieci libri da leggere-

58

Jean Dieudonné

perché, per la definizione di prodotto di due rapporti (paragrafo 5):

$$x^2/a^2 = 2a \times x/(x \times a) = 2$$

Questo modo di porre il problema condusse Ippocrate di Chio (V secolo) a ridurre la duplicazione del cubo alla costruzione di due "medie proporzionali" tra a e $2a$, cioè due segmenti x, y verificanti le equazioni

$$(2) \quad 2a/x = x/y = y/a$$

In effetti, per i greci, il prodotto di 3 segmenti A, B, C è il volume del parallelepipedo di lati A, B, C , e quindi le relazioni (2) implicano (Euclide, Libro VIII, 12 per i rapporti commensurabili)

$$y^3/a^3 = 2a \times x \times y/(x \times y \times a) = 2$$

La realizzazione di questa costruzione non sembrava più facile del problema di partenza. Ma Menecmo, un discepolo di Eudosso, osservò che la (2) poteva essere scritta anche sotto forma di due relazioni simultanee

$$(3) \quad x^2 = 2ay$$

$$(4) \quad xy = 2a^2$$

Allora ebbe l'idea di prendere in un piano due semirette perpendicolari OX, OY , e di considerare separatamente le relazioni (3) e (4) tra un segmento $x = OP$ su OX e un segmento $y = OQ$ su OY . Ma per ogni punto Q su OY con $OQ = y$ esistono, sulla parallela a OX condotta per Q (fig. 19), un punto M_1 tale che $x_1 = OP_1 = QM_1$ verifica $x_1^2 = 2ay$ (una "media proporzionale" tra $2a$ e y) e un punto M_2 tale che $x_2 = OP_2 = QM_2$ verifica $x_2 y = 2a^2$ (un "quarto proporzionale" dopo $2a, y$ e a).

Quando Q varia su OY , M_1 e M_2 descrivono due curve C_1, C_2 ; lo stesso Menecmo scoprì un po' più tardi che queste curve si potevano ottenere come sezioni piane di un cono di rotazione. Dopo Euclide e Archimede, queste sezioni piane, chiamate *coniche* furono studiate approfonditamente da Apollonio (III secolo a.C.) che chiamò C_1 una *parabola* e C_2 un'*iperbole*.

Se N è il punto di intersezione di queste due curve, i segmenti $OH = NK = x$ e $OK = NH = y$ forniscono la soluzione di (2). La storia aneddotica riferisce che questa soluzione non piacque a Platone, perché utilizzava curve diverse dalla retta e dal cerchio; ma questo tipo di "costruzioni" mediante intersezione di curve non diventò meno popolare tra i successori di Euclide (anche se comportava pro-

Figura 19

prietà "visibili" ma non dimostrate) ed era ancora altamente apprezzato da Cartesio e Newton.¹⁹

L'importanza del metodo utilizzato da Cartesio e Fermat deriva dal fatto che esso permette di tradurre ogni problema di geometria piana in un problema equivalente di algebra. Ciò risulta dal fatto che enti e relazioni dell'assiomatica di Hilbert possono essere interpretati come enti e relazioni della teoria dei numeri reali, secondo il "dizionario" seguente:

- punto M coppia di numeri (x, y) ²⁰
- si scrive $M = (x, y)$
- retta equazione $ax + by + c = 0$
- con $a^2 + b^2 \neq 0$
- punto appartenente a... coppia che verifica...

¹⁹ Si potrebbe definire in modo analogo tre, quattro... "medie proporzionali" tra $2a$ e a , ma ciò non avrebbe permesso ai greci di effettuare "costruzioni" di radici di ordine $n > 3$, dato che per loro un prodotto di più di tre lunghezze non aveva senso.

²⁰ Ovviamente $(x, y) \neq (y, x)$, eccetto il caso $x = y$.

Quali i fatti fondamentali

- Galilei scoprì che un proiettile gettato orizzontalmente dalla cima di una torre, cade a terra descrivendo un arco di parabola (se si trascurano la resistenza dell'aria e se il movimento avviene sopra una parte della terra che possa essere considerata come un piano).
- Cartesio dà il metodo che consente di vederle come equazioni e come luoghi geometrici. Non è necessaria la costruibilità per sancire l'esistenza di una curva, è sufficiente che essa abbia un'equazione. E viceversa si allarga il concetto di curve ammissibili: ad una data equazione in x e y corrisponde una curva: *“Ma i moderni, procedendo molto più innanzi dei luoghi piani, solidi e lineari dei Greci, hanno accolto nella Geometria tutte le linee che possono essere espresse da equazioni”* (Newton, 1707)[*Arithmetica universalis*].

L'Armonia del Mondo e il successo dell'ellisse

- Keplero (1571- 1630) : i pianeti percorrono orbite ellittiche. Le coniche sono anch'esse nella mente di Dio; il *Mysterium Cosmographicum* (1596) è svelato!
- Un'ottantina d'anni più tardi, Newton riuscì a dimostrare che l'orbita ellittica dei pianeti implica una legge di attrazione gravitazionale con forze inversamente proporzionali al quadrato della distanza. Nel seguito si scoprì ancora che le coniche compaiono non solo come orbite dei pianeti e dei satelliti ma anche come traiettorie di particelle atomiche elementari. Anche nella pratica il '600 affina il ricorso alle coniche per disegnare lenti o specchi e dilaga il loro uso nell'architettura e nell'arte in generale.

Religione e Matematica

La cappella degli italiani a Praga forse la prima a pianta ellittica

Il Barocco

S. Carlo alle 4 fontane il capolavoro di

Francesco Borromini(1599-1667)

gae ficara photographer

Divinatio Apollonii

Vincenzo Viviani (1622-1703)

lia, ne dicam Europa Mathematicos intercessere, quales, inter hos D. Fermat Senator Tholosanus, D. Roberuallius in Parisiensi Academia Regius Mathematicum Professor, ac D. de Verdus) presatus Cl. Vir de Fermat ipsi Torricellio olim proposuerat, qui licet statim in ipsius solutionem non incidisset, inde mox animaduertens Problema determinatum esse, illud demum triplici via, altera nimirum per locos planos, reliquis per solidos demonstrauit, nobisque postmodum exercitationis gratia in hunc, qui sequitur modum enodandum tradidit.

Dato triangulo, cuius vnusquisq; angulorum minor sit graduum 120. punctum reperire, à quo si ad angulos tres rectæ educantur ipsarum aggregatum sit MINIMUM.

Quod, ut vera fatear, non nisi iteratis oppugnationibus tunc nobis vincere datum fuit, sed aggressione omnino ab alijs discrepante, ac, ni decipimur, satis incunda, & ad ipsiusmet Problematum propagationem valde accommodata, dum non tantum ad tria data puncta, (quæ sunt vertices angulorum propositi trianguli) verum etiam ad quæcumq; libuerit, ex alio quesito puncto, MINIMUM educatarum aggregationum reperiri queat, manente tamen determinata eorum positione, prout determinatum est prædictum triangulum.

Alterum Problema præclarissimum Virum, & Aurore splendens, & morum integritate conspicuum agnoscit Auctorem: P. Honoratum Fabbri, natione Gallum, in Iesuitarum celeberrima Societate magni nominis Theologum, omnigena historiarum, humaniorumque literarum eruditione decoratum, Mathematicum præstantissimum, Philosophum acutissimum, qui olim Lugduni apud Gallos Philosophiam publice edocens, summam egregy acuminis famam sibi peperit, quod manifestè testantur (ita nobis asserente alibi iam, sed parum commendato nobilissimo Adolescente Laurentio Magalotti tanti Viri amantissimo, & obsequentissimo) quædam ipsius PROPOSITIONES PHYSICAE, CVM BREVISSIMIS RATIONVM MOMENTIS, tunc ibidem publicè iuris factæ, & prout susius, Deo dante, patebit ex nouis eiusdem geometricis, ac physicomathematicis contemplationibus, quibus Literatorum Respublica aliquando se locupletaturam expectat.

Hoc igitur Problema, anno 1656. idem Cl. Adolescens Laurentius Magalotti, (dum in Pisano Lyceo Iurisprudentiam excoleret) à prædicto P. Fabbri, tunc Romæ immorante receperat, nobisque per epistolam, Pisæ, sub 27. Decembris datam communicarat, cui post triannum respondentes, vniuersaliorem quesiti propositionem, ita exposuimus;

Il punto da cui si vedono i lati di un triangolo sotto un angolo di 120°

- Il problema risolto da Viviani non pare abbia suscitato altri interessi anche successivi e rimase nell'ombra fino a quando J. Steiner (1796-1863) non lo riscoprì per suo conto nel 1837 dandone anche una generalizzazione ritenuta però, in seguito, di scarso interesse e “una delle generalizzazioni superficiali che si incontrano spesso nella letteratura matematica”.
- Il giudizio sulla generalizzazione operata da Steiner è di R. Courant e H. Robbins che hanno avuto il merito di riformulare il problema, che impropriamente attribuiscono a Steiner, e di portarlo all'attenzione della comunità matematica in ragione del largo e meritato successo del loro **“Che cos'è la matematica?”**

La generalizzazione del problema

- Per trovare - scrivono Courant e Robbins - la generalizzazione del problema di Steiner che abbia un vero interesse, si deve abbandonare la ricerca di un solo punto P e proporsi invece la determinazione del **reticolato** di lunghezza totale. In termini matematici diremo: “Dati n punti $A_1, A_2, \dots, A_n$, trovare un sistema connesso di segmenti, di minima lunghezza totale, tale che ogni coppia di punti possa essere collegata con un poligono formato da segmenti del sistema”.

Un'idea delle difficoltà può formarsi dall'esame della situazione, particolarissima, di 4 punti disposti ai vertici di un rettangolo, dove occorrono due punti aggiuntivi, detti anche **punti di Steiner**

La somma
 $AP+DP+PQ+QB+QC$
è la lunghezza minima
per congiungere i 4 punti
A, B, C, D.

La rete minima

- Il fatto è che al crescere del numero n di punti (n si può assumere come la misura della dimensione del problema) il problema diventa intrattabile. I tempi di risoluzione crescono esponenzialmente con n : è cioè un problema **NP** (non deterministico in un tempo polinomiale).

o anche dall'esame del grafico seguente, rappresentativo del collegamento minimo tra 29 città degli Stati Uniti [i]

Il problema con 29 punti qualche decennio fa era già al limite delle possibilità di elaborazioni di potenti computer.

[i]il grafico è tratto da : *“Il problema della rete di lunghezza minima”* di M.W. Bern-R.Graham in LE SCIENZE n.247, marzo 1989.

Le possibilità grafiche

La dimostrazione del teor. di Torricelli-Viviani è immediata. Con il ricorso ad una rotazione di 60° di centro A, P va in P' e B in B'. ABB' è equilatero e i triangoli AP'B' e APB sono congruenti. La spezzata B'P'PC ha lunghezza pari a $PB+PA+PC$. Essa è minima quando i punti della spezzata sono allineati, cioè quando P appartiene a B'C. P dunque è l'intersezione di B'C con BF e con DA (rifacendo il ragionamento con altro centro di rotazione). Ma anche i tre cerchi circoscritti ai tre triangoli esterni si incontrano in P.

P è il punto cercato. Conseguenza immediata è il teorema di *Napoleone*. I centri G,H,I dei triangoli equilateri costruiti esternamente ad ABC sono vertici di un triangolo equilatero.

I Frattali

- luogo geometrico è tutto ciò che sostanzia la nostra percezione dello spazio vitale e che si associa alla forma di ogni oggetto ideale o concreto che lo riempie o può descriverlo.
- Gli oggetti ai quali ci si riferisce sono gli *artefatti* (letteralmente: prodotti di un'arte – più in particolare dell'uomo) i cui elementi caratteristici sono gli elementi della geometria euclidea (angoli, spigoli, angoli diedri, superfici piane.....)

La geometria della natura

- Nuvole, catene montuose, coste frastagliate,... si presentano diverse e tali apparirebbero – secondo l’ E.T. del film di Spielberg ed il biologo J. Monod - lontani dai canoni euclidei. Sono gli oggetti della natura, i frattali, figure molto complesse immerse in spazi molto semplici.
- Luoghi geometrici di estrema bellezza, mostri matematici dotati di continuità ma non di derivabilità eppure ottenibili da semplici procedure iterative, anzi dal trattamento ricorsivo di semplici equazioni. Il successo della formula di Newton!

Conclusione

- Il discorso è appena abbozzato.....l'intera matematica è suscettibile di un'immagine, un luogo geometrico che essa permea e domina allo stesso tempo.
- E' solo abbozzato il racconto che possiamo fare dei luoghi, artefatti e naturali che siano. E c'è ancora un'altra geometria che si sostanzia di altri caratteri, altre simmetrie, altre curvature, a metà strada tra oggetti fatti dall'uomo e oggetti naturali, modelli di forme che Dio realizzò a sua immagine e somiglianza!