

Indice Articoli Anno 1897

N°	Autore/i	Titolo	Pagine	Anno
1	LAZZERI G.	LE CONFIGURAZIONI PIANE DI CAPORALI	3-16	1897
2	FELLINI D.	LA RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI DI II GRADO E DELLE DISEQUAZIONI BIQUADRATICHE A COEFFICIENTI REALI	21-26	1897
3	LORIA G.	SOPRA CERTI DETERMINANTI I CUI ELEMENTI SONO FUNZIONI TRIGONOMETRICHE	33-34	1897
4	LORIA G.	SULLA DEFINIZIONE DI INFINITO	34-35	1897
5	LAZZERI G.	SUL POSTULATO DELL'EQUIVALENZA	35-40	1897
6	BETTAZZI R.	APPENDICE AI FONDAMENTI PER UNA TEORIA GENERALE DEI GRUPPI	40-42	1897
7	BETTINI B.	SUL NUMERO DELLE CIFRE DEL PERIODO NELLE FRAZIONI DECIMALI PERIODICHE	43-50	1897
8	MURER V.	CORDE NOTEVOLI DEL TRAPEZIO	50-54	1897
9	ANDREINI A.	SULLO SVILUPPO DEL SENO E DEL COSENO DELLA SOMMA DI N ARCCHI	55-58	1897
10	CATANIA S.	TEOREMI E PROBLEMI SUI TETRAEDRI ISOBARICENTRICI	73-79	1897
11	PANIZZA F.	FORMULE RELATIVE AL NUMERO DELLE COMBINAZIONI SEMPLICI E CON RIPETIZIONE DEDOTTE DALLE PROGRESSIONI ARITMETICHE	79-82	1897
12	PIRONDINI G.	ALCUNE PROPRIETA' DELLA SVILUPPANTE DEL CERCHIO (1/2)	83-88	1897
13	SFORZA G.	SOPRA ALCUNI POSTULATI DEL SEGMENTO	88-91	1897
14	BETTAZZI R.	SULLA DEFIZIONE DI INFINITO	91-92	1897
15	SFORZA G.	UN'OSSERVAZIONE SULL'EQUIVALENZA DEI POLIEDRI PER CONGRUENZA DELLE PARTI	105-109	1897
16	PALATINI F.	UNA DEFINIZIONE DEL POLIGONO CONVESSO	109-111	1897
17	PIRONDINI G.	ALCUNE PROPRIETA' DELLA SVILUPPANTE DEL CERCHIO (2/2)	112-120	1897
18	BELLACCHI G.	NOTA SU ALCUNE FORMULE DI STEINER	120-121	1897
19	BETTAZZI R.	GRANDEZZE FINITE E INFINITE	122-124	1897
20	CARLINI L.	GENERALIZZAZIONE DEL TEOREMA DEL PRO. E. CESARO	137-139	1897
21	TRAVERSO N.	DIMOSTRAZIONE ELEMENTARE DI UN TEOREMA	140-142	1897
22	MURER V.	SULLE FRAZIONI PERIODICHE. PROPRIETA' DEI GRUPPI IN CUI SI PUO' SCOMPORRE IL PERIODO E DEI RELATIVI RESTI	142-150	1897
23	FUBINI G.	NUOVO METODO PER LO STUDIO E PER IL CALCOLO DELLE FUNZIONI TRASCENDENTI ELEMENTARI	169-178	1897
24	ZUCCAGNI MARTINI A.	SUL SIGNIFICATO DI UNA NOTA ESPRESSIONE ARITMETICA	178-180	1897
25	GIUDICE F.	PER UNA DIMOSTRAZIONE ELEMENTARE	180-182	1897
26	MUSSO G.	SOPRA UN NUOVO MODO DI DEFINIRE LE RADICI PRIMITIVE DI UNA CONGRUENZA	182-184	1897
27	CIAMBERLINI C.	SULLE DEFINIZIONI DI EQUAZIONI E DI SISTEMA DI EQUAZIONI	184-187	1897
28	CANDIDO G.	UN TEOREMA SUL TRIANGOLO	187-189	1897

UNA GENERALIZZAZIONE DEI TEOREMI

di Ceva e di Menelao

I. — Tre punti A_1, B_1, C_1 presi rispettivamente sulle rette di un triangolo ABC determinano su queste sei segmenti tali che la differenza fra il prodotto di tre di essi non consecutivi e il prodotto degli altri tre è

$$\frac{abc}{a'b'c'} \alpha \beta \gamma \left(\frac{\Delta'}{\Delta} \right)^2$$

dove Δ, a, b, c sono rispettivamente l'area e le lunghezze dei lati di ABC ; Δ', a', b', c' l'area e le lunghezze dei lati del triangolo formato dalle congiungenti i tre punti A_1, B_1, C_1 coi vertici opposti A, B, C ; α, β, γ le lunghezze delle trasversali AA_1, BB_1, CC_1 .⁽¹⁾

Sieno A', B', C' i punti d'incontro delle coppie di rette $(BB_1, CC_1), (CC_1, AA_1), (AA_1, BB_1)$, e $B'C' = a', C'A' = b', A'B' = c', A'B'C' = \Delta'$; e si ponga

$$(1) \quad \frac{BA_1}{A_1C} = h, \frac{CB_1}{B_1A} = p, \frac{AC_1}{C_1B} = q;$$

componendo, si ha

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{BC}{BA_1} = \frac{h+1}{h}, \frac{CA}{CB_1} = \frac{p+1}{p}, \frac{AB}{AC_1} = \frac{q+1}{q}, \\ \frac{BC}{A_1C} = h+1, \frac{CA}{B_1A} = p+1, \frac{AB}{C_1B} = q+1. \end{cases}$$

Si ponga inoltre

$$1 + h + hp = \mu_1, \quad 1 + p + pq = \mu_2, \quad 1 + q + qh = \mu_3.$$

I triangoli AA_1C, AA_1B segati rispettivamente dalle rette BB_1, CC_1 danno

$$\frac{AC'}{C'A_1} \cdot \frac{A_1B}{BC} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = -1, \quad \frac{AB'}{B'A_1} \cdot \frac{A_1C}{CB} \cdot \frac{BC_1}{C_1A} = -1$$

⁽¹⁾ Questo teorema fu proposto nelle *Nouvelles Annales* (questione 1529, anno 1892) dal professore Cesaro e vi rimase indimostrato.

donde per le (1) (2)

$$\frac{AC'}{CA_1} = \frac{h+1}{hp}, \quad \frac{AB'}{BA_1} = q(h+1),$$

e componendo,

$$\frac{AC'}{AA_1} = \frac{h+1}{\mu_1}, \quad \frac{AB'}{AA_1} = \frac{q(h+1)}{\mu_2};$$

e sottraendo e riducendo

$$\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{(h+1)(1-hpq)}{\mu_2 \mu_1}.$$

Analogamente si troverà

$$\frac{\beta'}{\beta} = \frac{(p+1)(1-hpq)}{\mu_1 \mu_2}, \quad \frac{\gamma'}{\gamma} = \frac{(q+1)(1-hpq)}{\mu_2 \mu_3}.$$

Dalle quali moltiplicando

$$(3) \quad \frac{\alpha'\beta'\gamma'}{\alpha\beta\gamma} = \frac{(1-hpq)^3 (h+1)(p+1)(q+1)}{\mu_1^2 \mu_2^2 \mu_3^2}.$$

Si sa che l'area del triangolo $A'B'C'$, circoscritto ad ABC , si può esprimere mediante la formola

$$(4) \quad \Delta' = \Delta \frac{(1-hpq)^2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3};$$

e perciò la (3) si può scrivere

$$\frac{\alpha'\beta'\gamma'}{\alpha\beta\gamma} = \left(\frac{\Delta'}{\Delta}\right)^2 \frac{(h+1)(p+1)(q+1)}{1-hpq},$$

ossia

$$(5) \quad \frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha'\beta'\gamma'} \left(\frac{\Delta'}{\Delta}\right)^2 = \frac{1-hpq}{(h+1)(p+1)(q+1)}.$$

Ora dalle (2) si ha

$$\frac{1}{(h+1)(p+1)(q+1)} = \frac{A_1C \cdot B_1A \cdot C_1B}{BC \cdot CA \cdot AB},$$

$$\frac{hpq}{(h+1)(p+1)(q+1)} = \frac{BA_1 \cdot CB_1 \cdot AC_1}{BC \cdot CA \cdot AB};$$

e perciò la (5) diventa

$$(6) \quad \frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha'\beta'\gamma'} abc \left(\frac{\Delta'}{\Delta}\right)^2 = A_1C \cdot B_1A \cdot C_1B - BA_1 \cdot CB_1 \cdot AC_1.$$

Questa relazione per $\Delta' = 0$ dà quella di Ceva.

II. — Tre punti delle tre rette di un triangolo ABC determinano su queste segmenti tali che la somma del prodotto di tre non consecutivi e del prodotto degli altri tre è

$$\frac{\Delta_1}{\Delta} abc$$

dove Δ, a, b, c , sono l'area e i lati di ABC , e Δ_1 è l'area del triangolo dei tre punti.

Essendo A_1, B_1, C_1 i tre punti presi rispettivamente sulle rette BC, CA, AB , e ritenendo le denominazioni del teorema I, dalle (2) si ha

$$\frac{BA_1}{BC} \cdot \frac{CB_1}{CA} \cdot \frac{AC_1}{AB} + \frac{A_1C}{BC} \cdot \frac{B_1A}{CA} \cdot \frac{C_1B}{AB} = \frac{1 + hpq}{(h+1)(p+1)(q+1)},$$

e poichè l'area del triangolo $A_1B_1C_1$ inscritto in ABC si può esprimere mediante la formola

$$\Delta_1 = \Delta \frac{1 + hpq}{(h+1)(p+1)(q+1)},$$

la precedente diviene

$$(7) \quad BA_1 \cdot CB_1 \cdot AC_1 + A_1C \cdot B_1A \cdot C_1B = \frac{\Delta_1}{\Delta} abc.$$

La (7) per $\Delta_1 = 0$ dà il teorema di Menelao.

III. — Quattro punti A_1, B_1, C_1, D_1 presi rispettivamente sulle rette AB, BC, CD, DA di un quadrangolo gobbo $ABCD$ determinano su queste otto segmenti tali che la differenza fra il prodotto di quattro di essi non consecutivi e il prodotto degli altri quattro è

$$\frac{a'b'c'd'}{abcd} \alpha \beta \gamma \delta \left(\frac{T'}{T} \right)^2$$

dove T, a, b, c, d sono rispettivamente il volume del tetraedro $ABCD$ e i lati AB, BC, CD, DA del quadrangolo $ABCD$; T', a', b', c', d' sono il volume e le faccie del tetraedro formato dai quattro piani $ABC_1, BCD_1, CDA_1, DAB_1$; $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ le aree dei triangoli trasversali $ABC_1, BCD_1, CDA_1, DAB_1$.

Sieno A', B', C', D' rispettivamente i punti d'incontro delle quattro terne di piani $(CDA_1, DAB_1, ABC_1), (DAB_1, ABC_1, BCD_1), (ABC_1, BCD_1, CDA_1), (BCD_1, CDA_1, DAB_1)$, e $A'B'C' = a', B'C'D' = b', C'D'A' = c', D'A'B' = d', A'B'C'D' = T'$; e si ponga

$$(8) \quad \frac{AA_1}{A_1B} = h, \quad \frac{BB_1}{B_1C} = p, \quad \frac{CC_1}{C_1D} = q, \quad \frac{DD_1}{D_1A} = r;$$

se ne deduce, componendo

$$(9) \quad \begin{cases} \frac{AB}{AA_1} = \frac{h+1}{h}, & \frac{BC}{BB_1} = \frac{p+1}{p}, & \frac{CD}{CC_1} = \frac{q+1}{q}, & \frac{DA}{DD_1} = \frac{r+1}{r} \\ \frac{AB}{A_1B} = h+1, & \frac{BC}{B_1C} = p+1, & \frac{CD}{C_1D} = q+1, & \frac{DA}{D_1A} = r+1. \end{cases}$$

Si ponga inoltre

$$\begin{aligned} 1 + h + hp + hpq &= \mu_1, & 1 + p + pq + pqr &= \mu_2 \\ 1 + q + qr + qrh &= \mu_3, & 1 + r + rh + rhp &= \mu_4 \end{aligned}$$

e sia N il punto d'incontro delle rette (BC_1, B_1D) ed S quello delle rette (AC_1, CD_1) .

Dai triangoli BCC_1, DAC_1 , segati rispettivamente dalle rette DB_1 e CD_1 , si ha

$$\frac{BN}{NC_1} \cdot \frac{C_1D}{DC} \cdot \frac{CB_1}{B_1B} = -1, \quad \frac{C_1S}{SA} \cdot \frac{AD_1}{D_1D} \cdot \frac{DC}{CC_1} = -1,$$

donde per le (8) (9)

$$(10) \quad \frac{BN}{NC_1} = p(q+1), \quad \frac{C_1S}{SA} = \frac{rq}{q+1}.$$

Ora il triangolo $A'B'C'$ è circoscritto al triangolo ABC_1 , ed i suoi lati $A'B', B'C', C'A'$, incontrano i lati BC_1, C_1A, AB di ABC_1 rispettivamente nei punti N, S, A_1 , e perciò, applicando ad esso la formola (4) e tenendo presenti i valori (8) (9) (10), si trova

$$\frac{a'}{\alpha} = \frac{(1-hpqr)^2(q+1)}{\mu_1 \mu_2 \mu_3}.$$

Analogamente

$$\frac{b'}{\beta} = \frac{(1-hpqr)^2(r+1)}{\mu_2 \mu_3 \mu_4}, \quad \frac{c'}{\gamma} = \frac{(1-hpqr)^2(h+1)}{\mu_3 \mu_4 \mu_1}, \quad \frac{d'}{\delta} = \frac{(1-hpqr)^2(p+1)}{\mu_4 \mu_1 \mu_2}.$$

E moltiplicando

$$(11) \quad \frac{a'b'c'd'}{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{(1-hpqr)^8(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)}{\mu_1^8 \mu_2^8 \mu_3^8 \mu_4^8}.$$

Si sa che il volume di un tetraedro $A'B'C'D'$, le cui faccie passano per i lati del quadrangolo gobbo $ABCD$ si può esprimere mediante la formola

$$T' = T \frac{(1-hpqr)^8}{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \mu_4},$$

e perciò la (11) si può scrivere

$$\frac{a'b'c'd'}{\alpha\beta\gamma\delta} = \left(\frac{T'}{T}\right)^8 \frac{(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)}{1-hpqr},$$

ossia

$$(12) \quad \frac{\alpha\beta\gamma\delta}{a'b'c'd'} \left(\frac{T'}{T}\right)^8 = \frac{1-hpqr}{(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)}.$$

Ora dalla (9) si ha

$$\frac{1}{(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)} = \frac{A_1B \cdot B_1C \cdot C_1D \cdot D_1A}{AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA},$$

$$\frac{hpqr}{(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)} = \frac{AA_1 \cdot BB_1 \cdot CC_1 \cdot DD_1}{AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA};$$

e perciò la (12) diventa

$$(13) \frac{\alpha\beta\gamma\delta}{a'b'c'd'} abcd \left(\frac{T'}{T}\right)^3 = A_1B_1.B_1C_1.C_1D_1.D_1A_1 - AA_1.BB_1.CC_1.DD_1$$

La (13) per $T' = 0$ dà il noto teorema sul quadrangolo gobbo analogo al teorema di Ceva.

IV. — *La differenza dei prodotti dei segmenti, di cui è questione nel teorema III è, anche eguale a*

$$\frac{T_1}{T} abcd$$

dove T_1 è il volume del tetraedro $A_1B_1C_1D_1$, e T, a, b, c, d hanno il significato del teorema III.

Difatti dalle (9) si ha

$$\frac{AA_1.BB_1.CC_1.DD_1}{AB.BC.CD.DA} - \frac{A_1B_1.B_1C_1.C_1D_1.D_1A_1}{AB.BC.CD.DA} = \frac{1 - hpqr}{(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)}$$

e poichè si sa che il volume del tetraedro $A_1B_1C_1D_1$ inscritto nel quadrangolo gobbo $ABCD$ si può esprimere colla formola

$$T_1 = T \frac{1 - hpqr}{(h+1)(p+1)(q+1)(r+1)}$$

la precedente diviene

$$(14) AA_1.BB_1.CC_1.DD_1 - A_1B_1.B_1C_1.C_1D_1.D_1A_1 = \frac{T_1}{T} abcd$$

La (14) per $T_1 = 0$ dà il noto teorema sul quadrangolo gobbo analogo al teorema di Menelao.

Ottobre 1897.

FRANCESCO FERRARI.

Qualche osservazione sulla determinazione di numeri come limiti di insiemi

Gli Ill.^{mi} Prof.^{ri} RICCI e CAPELLI ⁽¹⁾ hanno svolta recentemente la teoria delle operazioni numeriche, facendo uso rispettivamente di ripartizioni di DEDEKIND e di classi contigue per la determinazione di numeri. Il metodo delle classi contigue permette molta semplicità nelle dimostrazioni;

⁽¹⁾ *Giornale di Matematiche*, Napoli, 1897, pag. 22, 209.

e per ciò lo ho seguito in miei libri elementari: ⁽¹⁾ esso collegasi strettamente agli altri metodi usuali per la determinazione di numeri, come feci vedere nel Periodico di Matematica, ⁽²⁾ e potrebbesi dire molto opportunamente *metodo dei valori approssimati*. Ed è chiaro che conviene considerare sistemi ascendenti o discendenti, perchè il concetto, che si ha d'un numero per la conoscenza d'un valore approssimato ad esso, si può migliorare solo con la conoscenza d'un valore più approssimato.

Il metodo ora accennato e quello delle *parti integranti di WEIERSTRASS* ⁽³⁾ sono facilmente accessibili agli scolari, che sono abituati a considerare un numero decimale periodico come somma della parte intera con i decimi, i centesimi, i millesimi ecc. ed anche come unico numero separante i valori approssimati ad esso per difetto a meno di 1, di 0,1, di 0,01, di 0,001, ecc. da quelli approssimati per eccesso. Ed anche nella pratica è uso costante e naturale di considerare appunto una grandezza come somma delle parti integranti in cui vien divisa dal processo di misurazione, cosicchè dall'estensione della parte misurata progressivamente si ricava, per successive approssimazioni, un concetto relativamente esatto dell'estensione dell'intera grandezza.

Delle considerazioni utili anche relativamente alla determinazione di numeri mediante insiemi di numeri razionali, e specialmente atte a giustificare la sostituzione di successioni ascendenti o discendenti ad insiemi disordinati di valori approssimati per difetto o per eccesso, trovansi in una mia comunicazione al Circolo Matematico di Palermo, ⁽⁴⁾ dove ho date notevoli proposizioni sulle successioni a più limiti; le quali provano p. es. che; *se si può stabilire una corrispondenza univoca tra i limiti d'un insieme ed i numeri 1. 2. 3, ..., si può stabilire una corrispondenza univoca ancora tra questi numeri e tutti i numeri dell'insieme, cioè i numeri dell'insieme si possono ordinare in successione*. Prima di procedere oltre faremo vedere come queste cose possano avere svariate applicazioni.

Se una grandezza finita è divisa in infinite parti, l'insieme di queste ha necessariamente per limite lo zero (grandezza nulla, se s'ammetta questa espressione) ed esso solo: per ciò esse parti si possono ordinare in successione, e questa, comunque siasi formata, tenderà necessariamente al limite zero (cioè qualsiasi grandezza α , omogenea con quella divisa, ne supererà tutte le parti, che nella successione seguono una di posto assegnabile dopo che α sia data). ⁽⁵⁾ E, se si aggruppino arbitrariamente delle parti consecutive in modo da avere ancora una successione infinita, questa tenderà anch'essa a zero per la stessa ragione, cioè per essere necessariamente ancora zero unico limite dell'insieme dei gruppi, la

⁽¹⁾ *Algebra*, Palermo, (ed. R. Sandron) 1886; *Geometria piana*, Brescia, (ed. F. Apollonio) 1897; *solida*, Palermo, 1890.

⁽²⁾ *Periodico di Matematica*, 1893, pag. 144.

⁽³⁾ V. L. PINCHERLE, *Giornale di Matematica*, 1880, pag. 178.

⁽⁴⁾ V. Rendiconti, V, 1891, pag. 280.

⁽⁵⁾ V. S. SBRAN, *Rivista di Matematica*, Torino, 1891, pag. 147.

somma di questi dovendo essere ancora la primitiva grandezza finita. Mediante considerazioni analoghe si potrebbe manifestamente stabilire il criterio generale di convergenza delle serie.

Per la determinazione di numeri mediante parti integranti, od anche mediante successioni ascendenti o discendenti di valori approssimati, ho dati due metodi, molto convenienti nella pratica, in una nota, che, sebbene vi sia fatto uso delle notazioni della logica matematica, (1) può facilmente intendersi da tutti.

Dopo d'aver fatti allenni richiami al solo scopo d'evitare ripetizioni, credo opportuno di fare alcune considerazioni nuove.

Si vuol dire che il metodo delle parti integranti di Weierstrass è indipendente dai concetti d'ordine e di limite, ed altrettanto, con egual ragione, si può dire del metodo dei valori approssimati: ed invero un numero s'intuisce come somma delle sue parti integranti o come separante due suoi sistemi contigui di valori approssimati, per difetto e per eccesso, senza ricorrere, almeno apparentemente, né all'idea d'ordine né a quella di limite. La cosa presentasi però affatto diversamente nella pratica. Per dare infiniti numeri razionali in modo, che si possano veramente concepire, dovremo generalmente darli ordinati, la qual cosa sarà sempre possibile, perchè l'insieme di tutti i numeri razionali è di prima potenza, cioè numerabile; e mentre può sembrare, e generalmente si crede, che l'ordine si possa stabilire ad arbitrio, è invece prestabilito, in quanto che si potrà bensì dare un ordine arbitrario ad un numero illimitato di termini e precisamente a quelli che la mente può isolare; ma, per quanto sia grande il numero degli elementi già separati ed ordinati, sarà sempre infinita la probabilità che un elemento casuale dell'insieme si trovi tra quelli, che non furono ancora separati, perchè rimarranno sempre degli insiemi parziali condensati intorno ai limiti e formanti come degli elementi di continuo; questi insiemi si potranno dire molto a proposito *gruppi filanti* o *chiome dei limiti*, e si possono concepire solo (affatto astrattamente) come elementi di continuo formati dai numeri estremi d'una successione od, in generale, dai numeri d'un insieme discontinuo.

Per chiarire quanto ora fu detto, limitandoci al caso d'un sol limite, dimostreremo la seguente proposizione, che si trova nella già citata comunicazione al Circolo Matematico:

Ogni successione ad unico limite tende a questo nel senso usuale della parola; cioè diviene infinitesima con $\frac{1}{n}$ la differenza tra il termine n^{mo} della successione ed il limite, se questo è finito, e diviene infinitesimo positivo o negativo il reciproco del termine n^{mo} della successione, se il limite è $+\infty$ o $-\infty$.

Supponiamo infatti che la successione

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

(1) V. Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino, XXIX, 1893-94, pag. 110.

abbia l'unico limite a . Per quanto piccolo sia ε , la successione avrà soltanto un numero finito di termini fuori dell'intervallo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, perchè, se ne avesse infiniti, avrebbe anche un limite finito od infinito fuori di questo intervallo e per ciò diverso da a , la qual cosa è contraria all'ipotesi. Dopo d'aver dato ε in qualunque modo, si potrà dunque fissare n abbastanza grande, perchè precedano a_n tutti i termini della successione, che non sono interni all'intervallo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, e conseguentemente siano interni a questo intervallo tutti i numeri

$$a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots,$$

ciascuno dei quali avrà quindi da a una differenza minore di ε . Segue di qui che la differenza tra a_n ed a tende a zero coll'aumentare indefinitamente di n , e questo è appunto quanto dire che la successione tende ad a nel senso usuale. Per vedere che il teorema è vero anche per una successione, che abbia per unico limite $+\infty$ o $-\infty$, basta p. es. riflettere che, in luogo d'una tal successione, se ne può considerare un'altra, che abbia per termini quelli della proposta, che son compresi tra -1 e $+1$, ed i reciproci dei rimanenti.

Ciò spiega come mai, per quanto si alteri l'ordine dei termini della successione a_1, a_2, \dots sfuggiranno sempre a qualsiasi alterazione i numeri, che sono, per così dire, aderenti al limite, come mai cioè la successione debba sempre far capo allo stesso insieme filante od elemento di continuo, il quale seguirà sempre necessariamente i termini isolati della successione (esterni alla sfera d'attrazione del limite), che sono in numero illimitato, ma non assolutamente infinito.

Si riconosce così facilmente perchè, nella pratica, un'idea relativamente esatta d'un numero, che sia definito mediante insiemi di numeri razionali, si acquisti generalmente considerando valori sempre più approssimati e seguendoli colla mente in modo da intuire il numero, che si concepisce appunto come limite a cui il pensiero è guidato dalla progressiva considerazione dei numeri razionali, che lo determinano; il numero cioè, che è centro comune d'attrazione di tutte le menti, che percorrano affatto liberamente i numeri razionali componenti i detti insiemi, cosicchè ad esso convergono tutte le vie non chinate attraversanti questi numeri, essendo esso comune limite delle successioni infinite separabili da questi insiemi.

Queste considerazioni peraltro non tolgono pregio ai metodi dei valori approssimati e delle parti integranti, mediante i quali si può dare la teoria dei numeri irrazionali in modo affatto elementare, evitando di ricorrere esplicitamente ai concetti d'ordine e di limite. Questi concetti riceveranno intanto un lento, ma continuato, sviluppo virtuale, per cui si presenteranno poi spontaneamente e si potranno quindi esplicitare con facilità estrema.

UN TEOREMA SULL' APPROSSIMAZIONE DELLE RADICI QUADRATE

Le radici quadrate a meno di $\frac{1}{2n+1}$ per difetto dei $2n$ interi compresi fra n^2 ed $(n+1)^2$ e, rispetto ai numeratori delle frazioni che ne danno i valori, i resti relativi, godono le seguenti proprietà, che ne permettono la quasi immediata determinazione.

1°. Tali numeratori, termini consecutivi e crescenti della serie de' numeri naturali, si possono ottenere coll'aggiungere $n^2 + n$ all'intero di cui si vuole la radice; la quale uguaglia n più una frazione di numeratore eguale al numero che ne indica il posto.

2°. I resti relativi alla determinazione degli anzidetti numeratori, formano ordinatamente i termini della serie.

1. $2n$, $2(2n-1)$, $3(2n-2)$... $k[2n-(k-1)]$... $(2n-2)3$, $(2n-1)2$, $2n \cdot 1$, (1) evidentemente eguali, se equidistanti dagli estremi.

3°. Per questi la somma di ogni coppia di radici a meno di $\frac{1}{2n+1}$ per difetto, dei numeri che vi corrispondono, è costante ed eguale a $2n+1$.

Infatti, estraendo la radice quadrata a meno di un'unità per difetto dal prodotto $(n^2 + k)(2n+1)^2$, si ottiene l'identità

$$(n^2 + k)(2n+1)^2 = [(n^2 + k) + (n^2 + n)]^2 + k[2n - (k-1)],$$

e ponendo $2n - (k-1)$ al posto di k

$$[n^2 + 2n - (k-1)](2n+1)^2 = [(n^2 + 2n - (k-1)) + (n^2 + n)]^2 + [2n - (k-1)]k,$$

eperò le radici quadrate a meno di $\frac{1}{2n+1}$ dei numeri $n^2 + k$, ed $n^2 + 2n - (k-1)$ saranno rispettivamente

$$\frac{2n^2 + n + k}{2n+1} = n + \frac{k}{2n+1},$$

$$\frac{2n^2 + 3n - (k-1)}{2n+1} = n + \frac{2n - (k-1)}{2n+1} = n + 1 - \frac{k}{2n+1};$$

dalle quali formole risultano evidentemente le proprietà enunciate.

Ecco infine alcuni esempi di applicazione:

Pei numeri 5, 6, 7, 8, compresi fra i quadrati consecutivi $4=2^2$ e $9=3^2$,

(1) Ove la somma dei due fattori di ciascun termine è $2n+1$, mentre il primo è quanto il numero che ne indica il posto; inoltre i due resti consecutivi r_n ed r_{n+1} , eguali e necessariamente massimi, sono anche eguali al minore $n^2+n=n(n+1)$ dei due termini medii della serie degl'inter fra n^2 ed $(n+1)^2$

essendo $n = 2$, il denominatore dell'approssimazione è $2n + 1 = 5$, ed $n^2 + n = 6$ è la costante da aggiungere ai dati, per ottenere a meno di una unità per difetto i numeratori delle rispettive radici; i quali saranno quindi 11, 12, 13 e 14, rispettivamente coi resti 4, 6, 6 e 4 poichè è ora $1. 2n = 4$; $2(2n - 1) = 6 = 3(2n - 2)$ ecc. Ovvero, più semplicemente, tali radici, a meno di $\frac{1}{5}$ per difetto, saranno $2\frac{1}{5}$, $2\frac{2}{5}$, $2\frac{3}{5}$, $2\frac{4}{5}$.

Trattisi ancora di calcolare $\sqrt{275}$: poichè 275 è compreso fra $256 = 16^2$ e $289 = 17^2$, si ha qui per $n = 16$, $2n + 1 = 33$ (denominatore dell'approssimazione); ed essendo inoltre $275 - 256 = 19$, sarà questo il numero che indica il posto di 275 nella serie degli interi fra 256 e 289. Quindi a meno di una unità per difetto, $\sqrt{275 \times 33^2} = 275 + 16^2 + 16 = 547$ col resto $r_{19} = 19 \times 14$ (essendo $14 = 33 - 19$): ed a meno di $\frac{1}{33}$ per difetto, e

indipendentemente dalla divisione di 547 per 33, sarà $\sqrt{275} = 16 + \frac{19}{33}$ ecc.

Similmente, a meno di $\frac{1}{2001}$ per difetto, sarà $\sqrt{1000^2 + 1} = 1000 + \frac{1}{2001}$.

Ed è ovvio come tali calcolazioni siano tanto più vantaggiose, quanto più grandi sono i numeri dei quali ricercasi la radice quadrata; giacchè cresce con essi l'indicato denominatore dell'approssimazione.

Palermo, Settembre 1897.

F. P. PATERNÒ.

GEOMETRIA ELEMENTARE RECENTE

Nel fascicolo I dell'anno VI-1892 del *Periodico di Matematica* l'egregio prof. A. Lugli, di cui amici e colleghi piansero la dolorosa perdita, pubblicò una nota riassuntiva delle prime nozioni di Geometria elementare recente, alla quale ne sarebbe certamente seguita un'altra che la completasse, se la morte non avesse privato il *Periodico* del suo valente Direttore.

E poichè ognora più progrediscono in Italia ed all'estero glì studi della Geometria recente, per opera specialmente del prof. Cesàro, del Lemoine, del Casey, del Brocard, del Neuberg, ho stimato conveniente ed utile esporre in questa interessante rivista un riassunto delle teorie che fanno seguito a quelle contenute nella citata nota del prof. Lugli, sperando d'invogliare con ciò i giovani studiosi di Matematica a dare parte della loro attività a questo nuovo ed importante ramo della Geometria elementare, che, al dire del Davis, « a été le progrès le plus remarquable et le plus importante qu'aient fait les mathématiques élémentaires en ces derniers temps ».

I. — Figure direttamente simili.

1. Se sopra ciascuna delle semirette DA, DB, DC, ..., essendo D un punto fisso arbitrario ed A, B, C, ... gli elementi di un dato sistema di punti, si prende un segmento DA', DB', DC', ... in modo che si abbia la serie di rapporti uguali :

$$\frac{DA'}{DA} = \frac{DB'}{DB} = \frac{DC'}{DC} = \dots = k,$$

i due sistemi di punti A, B, C, ... e A', B', C', ... sono omotetici, essendo D il loro centro di omotetia.

Il punto D, se si considera come punto di uno dei due sistemi, è anche il suo omologo nell'altro, e perciò si chiama *punto doppio* dei due sistemi. Dati due poligoni, si può determinare con facilità il loro punto doppio. Due lati omologhi AB e A'B' s'intersechino in G; le due circonferenze determinate rispettivamente dai punti A, A' e G, B, B' e G oltre al punto G avranno in comune un altro punto, che è il punto doppio D domandato, perchè nei due triangoli DAB e DA'B' simili il vertice D del primo è omologo al vertice D del secondo. Questa costruzione non vale nel caso che i due lati omologhi scelti siano segmenti consecutivi. Siano ad esempio AB ed AC; in tal caso si descrivono le due circonferenze aggiunte relative ai segmenti considerati, cioè le circonferenze passanti per B o per C e tangenti in A ad AB o ad AC; il secondo punto d'intersezione di esse è il punto doppio richiesto D [perchè ADB ed ADC sono simili e D è omologo a D], il quale gode anche la proprietà di essere il centro del segmento AH, essendo H l'intersezione di AD colla circonferenza Z circoscritta ad ABC. Esso gode di altre proprietà, fra cui le seguenti :

1ª le distanze di D da due punti omologhi hanno un rapporto costante

2ª le distanze di D da due rette omologhe hanno un rapporto costante

3ª l'angolo di vertice D ed avente i lati passanti per due punti omologhi è costante.

2. D₁, D₂, D₃ siano rispettivamente i punti doppi delle coppie F₂ ed F₃, F₃ ed F₁, F₁ ed F₂ di tre figure direttamente simili; il triangolo D₁D₂D₃ = t chiamasi *triangolo di similitudine* ed il circolo circoscritto e chiamasi *circolo di similitudine*.

3. In ogni sistema di tre figure direttamente simili F₁, F₂ ed F₃ il triangolo S₁S₂S₃, formato da tre rette omologhe s₁, s₂ ed s₃, è omologico col triangolo di similitudine t, ed il luogo dei centri di omologia è la circonferenza di similitudine c. Infatti si ha per ipotesi:

$$\frac{(D_1, s_2)}{(D_1, s_3)} = \frac{a_2}{a_3} \quad \frac{(D_2, s_3)}{(D_2, s_1)} = \frac{a_3}{a_1} \quad \frac{(D_3, s_1)}{(D_3, s_2)} = \frac{a_1}{a_2}$$

essendo a_1, a_2, a_3 tre lati omologhi di F_1, F_2, F_3 ed indicando con (D, s) la distanza del punto D dalla retta s ; le tre rette D_1S_1, D_2S_2, D_3S_3 si tagliano quindi in un punto K tale che le sue distanze dalle tre rette s_1, s_2, s_3 sono proporzionali alle lunghezze a_1, a_2, a_3 di tre lati corrispondenti in F_1, F_2 ed F_3 e che viene chiamato *centro di omologia* dei triangoli $D_1D_2D_3$ ed $S_1S_2S_3$. Gli angoli di $S_1S_2S_3$ sono i supplementi degli angoli $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, angoli costanti che formano tra loro due rette omologhe di F_2 ed F_3 , di F_3 ed F_1 , di F_1 ed F_2 ; e perciò gli angoli $S_1KS_2, S_2KS_3, S_3KS_1$, ossia anche gli angoli $D_1KD_2, D_2KD_3, D_3KD_1$, sono costanti. Ne viene che il punto K descrive al variare di $S_1S_2S_3$ la circonferenza c circoscritta a $D_1D_2D_3$, perchè si muove sulle circonferenze passanti per le coppie D_1 e D_2, D_2 e D_3, D_3 e D_1 .

4. Le rette KP_1, KP_2, KP_3 , parallele ai lati di $S_1S_2S_3$ e condotte per K , centro di omologia di $D_1D_2D_3$ ed $S_1S_2S_3$, fino a tagliare la circonferenza c , sono rette omologhe, perchè si ha:

$$\frac{(D_i, KP_m)}{(D_i, KP_n)} = \frac{(D_i, s_m)}{(D_i, s_n)} = \frac{a_m}{a_n}$$

con $i = 1, 2, 3; m = 2, 3, 1; n = 3, 1, 2$. Inoltre è: $D_i\widehat{K}P_i = \text{angolo } (KS_i, S_mS_n) = \text{costante}$; quindi l'arco D_iP_i è fisso e perciò fisso anche il punto P_i . Dunque nel sistema F_1, F_2, F_3 di tre figure direttamente simili vi sono infiniti gruppi di tre rette omologhe concorrenti, le quali ruotano intorno a tre punti fissi della circonferenza c . Questi tre punti P_1, P_2 e P_3 diconsi *punti invariabili* ed *invariabile* il triangolo $P_1P_2P_3$, che è inversamente simile ad ogni triangolo formato da tre rette omologhe. I triangoli $P_1P_2P_3$ e $D_1D_2D_3$ sono omologici e le distanze del loro centro di omologia dai lati di $P_1P_2P_3$ sono inversamente proporzionali ad a_1, a_2, a_3 , lunghezze di lati omologhi di F_1, F_2, F_3 . Basta per ciò dimostrare che le rette che congiungono due a due i vertici omologhi dei due triangoli si tagliano in un medesimo punto. Infatti si ha:

$$\frac{a_m}{a_n} = \frac{D_i P_m}{D_i P_n} = \frac{(D_i, P_i P_m)}{(D_i, P_i P_n)}$$

con $i = 1, 2, 3; m = 2, 3, 1; n = 3, 1, 2$; dunque D_1P_1, D_2P_2, D_3P_3 si tagliano in un medesimo punto Δ , che chiamasi *punto direttore* delle tre figure F_1, F_2, F_3 .

5. Sia D'_1 , punto di F_1 , omologo a D_1 , punto di F_2 e di F_3 ; per questo le rette D'_1P_1, D_1P_2, D_1P_3 si tagliano in un medesimo punto ed i punti D'_1, P_1 e D_1 sono collineari. Similmente se D'_2 , punto di F_2 , è l'omologo di D_2 , punto di F_3 e di F_1 , i punti D'_2, P_2 e D_2 sono collineari; come pure sono collineari D'_3, P_3 e D_3 , nelle ipotesi corrispondenti. Quindi i tre triangoli $D_1D_2D_3$ (di similitudine), $P_1P_2P_3$ (invariabile) e $D'_1D'_2D'_3$ sono omologici ed hanno il medesimo centro di omologia. I punti D'_1, D'_2, D'_3 si dicono *punti aggiunti*.

6. Come esercizio si può dimostrare che il punto direttore Δ e l'uno e l'altro dei triangoli $D_1D_2D_3$ e $P_1P_2P_3$, sono sufficienti per determinare le figure F_1 , F_2 ed F_3 .

7. Di un triangolo ABC siano O il centro del circolo circoscritto Z e K il punto di Lemoine; su OK , come diametro, si descriva un circolo, che chiamasi *circolo di Brocard* [Lugli, N. C., 16]; le perpendicolari OX , OY , OW ai lati di ABC incontrino il circolo di Brocard nei punti A' , B' , C' che determinano un triangolo detto *primo triangolo di Brocard*. Si ha per costruzione che OA' , OB' ed OC' sono rispettivamente perpendicolari ai lati BC , CA , AB ; quindi con semplici considerazioni si ottiene:

$$\begin{aligned} \widehat{A'OB'} &= \widehat{ACB} = \widehat{A'C'B'}, \\ \widehat{B'OC'} &= \widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}, \\ \widehat{C'OA'} &= \widehat{CBA} = \widehat{C'B'A'}, \end{aligned}$$

cioè i triangoli ABC e $A'B'C'$ sono inversamente simili. E poichè si ha: $\widehat{OA'K} = \widehat{OB'K} = \widehat{OC'K} = 90^\circ$, le rette $A'K$, $B'K$, $C'K$ non sono altro che le parallele di Lemoine.

Si prolunghi KA' e siano F' ed E i punti di intersezione col circolo circoscritto Z ad ABC . Il circolo di Lemoine [Lugli, N. C., 11] ed il circolo di Brocard sono concentrici; la perpendicolare OQ ad EF' divide per metà tanto EF' , quanto KA' e però è: $F'A' = KE$. Ne viene che AA' ed AK sono coniugate isotomiche [Lugli, N. C., 7] rispetto ad A . Similmente si prova, che BB' e BK , che CC' e CK sono coniugate isotomiche rispetto a B ed a C ; quindi AA' , BB' , CC' si tagliano in un medesimo punto, che è il coniugato isotomico del punto di Lemoine.

8. Si conducano le simediane [Lugli, N. C., 2] del triangolo ABC ; i punti d'intersezione col circolo di Brocard siano A'' , B'' , e C'' ; il triangolo $A''B''C''$ chiamasi *secondo triangolo di Brocard*; esso è il triangolo di similitudine (2) di tre figure direttamente simili e qualunque costruite sui lati di ABC .

E invero $OA''K$ è retto, perchè inscritto in semicirconferenza, A'' è il centro della corda simediana corrispondente (1) e per conseguenza è il punto doppio delle due figure direttamente simili descritte sui lati AB ed AC . Perciò $A''B''C''$ è il triangolo di similitudine.

Poichè $A_1A_2A_3$, triangolo formato da tre rette omologhe di tre figure direttamente simili costruite sui lati di ABC , è simile ad ABC , essendo A'' il punto doppio delle due figure costruite sui lati BA ed AC omologhi ai lati A_1A_2 e A_2A_3 , la retta $A''A_3$ divide l'angolo $A_1A_2A_3$ in parti rispettivamente uguali a quelle in cui $A''A$ divide l'angolo BAC ; quindi $A''A_3$ è una simediana di $A_1A_2A_3$, e tali sono pure $B''A_1$ e $C''A_2$; perciò si ha che le simediane di $A_1A_2A_3$ passano per i vertici del secondo triangolo di Brocard. Essendo poi $A_1A_2A_3$ omologico col triangolo di similitudine $A''B''C''$ (3), il centro di omologia, che è il punto di Lemoine

di $A_1A_2A_3$, è un punto del circolo di similitudine, cioè del circolo di Brocard di ABC.

Si ha infine che i vertici A', B', C' del primo triangolo di Brocard sono i punti invariabili (4) di tre figure direttamente simili descritte sui lati di ABC.

9. Esercizio utile ed elegante è il seguente: I simmetrici dei vertici A, B, C di un triangolo ABC rispetto ai lati opposti siano A_1, B_1, C_1 ; supponendo che A_1BC, B_1CA, C_1AB facciano parte di tre figure direttamente simili descritte sui lati di ABC, dimostrare che: 1° A, B, C sono i punti doppi; 2° gli ortocentri di A_1BC, B_1CA, C_1AB sono i punti invariabili; 3° A_1, B_1, C_1 sono i punti aggiunti; 4° l'ortocentro di ABC è il punto direttore.

II. — Poligoni armonici.

10. La teoria dei poligoni armonici può ritenersi come la generalizzazione della Geometria recente del triangolo, estensione intuita fuo dal 1886 dall'illustre geometra Tucker, il quale lasciò scritto: « je crois que « tous ces résultats auraient lieu pour un polygone inscrit dans un cercle, « s'il y avait entre les côtés une relation telle qu'il existe un point, « dont les distances aux côtés soient proportionnelles à ces côtés ».

Sui poligoni armonici pubblicarono note importanti il Tucker, il Neuberg, il Casey, il Tarry ed il Simmons in varii periodici di matematica di Francia e di Inghilterra.

11. Nel piano di un poligono qualunque ABCD.... inscritto in un circolo si possa trovare un punto K, il quale abbia la proprietà che le sue distanze dai lati del poligono siano proporzionali ai lati stessi; il poligono ABCD.... chiamasi allora *poligono armonico*; le rette KA, KB, KC,.... *simediane* del poligono ed il punto K *centro delle simediane*. Se due poligoni hanno le medesime simediane diconsi *co-simediani*.

12. Sia O il centro del circolo circoscritto al poligono ABCD....; siano a, b, c, \dots i suoi lati; x, y, z, \dots le lunghezze delle perpendicolari condotte dal centro delle simediane K ai lati; il circolo di diametro OK chiamasi allora *circolo di Brocard* [Lugli, N. C., 16] e l'angolo ω determinato da una delle seguenti equazioni: $\text{tang } \omega = \frac{2x}{a} = \frac{2y}{b} = \frac{2z}{c} = \dots$ dicesi *angolo di Brocard* [Lugli, N. C., 8].

13. In un circolo Z qualunque di centro M sia inscritto un poligono regolare ABC....; i raggi AM, BM, CM,.... prolungati oltre M incontrino il circolo nei punti A', B', C', \dots ; sia un punto qualunque P del piano del poligono il polo d'inversione rispetto al quale si trasformi la figura per inversione. Il circolo circoscritto si trasforma allora in un altro circolo X; se $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ è il sistema di punti che corrisponde al sistema A, B, C,.... ed $\alpha', \beta', \gamma', \dots$ quello che corrisponde al sistema A', B', C', \dots si ha che le rette congiungenti α con α' , β con β' , γ con γ' ,.... passano

per un medesimo punto K , e siccome i punti A, B, C, B' formano un gruppo armonico, anche i loro inversi α, β, γ e β' formeranno un gruppo armonico; e poichè la retta $\beta\beta'$ passa per K , le perpendicolari condotte da K sui lati $\alpha\beta$ e $\beta\gamma$ sono proporzionali a questi stessi lati; perciò per inversione dal poligono regolare $ABC\dots$ si è ottenuto un poligono armonico $\alpha\beta\gamma\dots$ dello stesso numero di lati.

Reciprocamente si può sempre trasformare un poligono armonico in un poligono regolare dello stesso numero di lati. Sia infatti $ABC\dots$ un poligono armonico, Z il circolo circoscritto di centro O e K il centro delle simediane. Siano S ed S' i punti limiti del circolo Z e di quello OKX descritto sul diametro OK ; si unisca S con B e con A e si prolunghino le congiungenti, qualora occorra, fino a tagliare il circolo Z nei punti A' e B' ; il segmento $A'B'$ è il lato del poligono regolare risultante dalla trasformazione. Le rette AB e $A'B'$ si taglino in P e taglino OK in C e C' .

La polare di S passerà per P e per S' , ed il fascio $P(SCS'C')$ è armonico; quindi si ha:

$$\frac{2}{SS'} = \frac{1}{SC} + \frac{1}{SC'} = \frac{1}{SK} + \frac{1}{SO};$$

$$\frac{SK - SC}{SK \cdot SC} = \frac{SC' - SO}{SC' \cdot SO}; \quad \frac{KC}{SC} : \frac{OC'}{SC'} = \frac{SK}{SO};$$

$$\frac{(K, AB)}{(S, AB)} : \frac{(O, A'B')}{(S, A'B')} = \frac{SK}{SO},$$

ossia:

$$\frac{(K, AB)}{AB} : \frac{(O, A'B')}{A'B'} = \frac{SK}{SO},$$

perchè dai triangoli simili SAB ed $SA'B'$ si ha:

$$\frac{(S, AB)}{(S, A'B')} = \frac{AB}{A'B'}.$$

Ma $\frac{(K, AB)}{AB}$ è costante, perchè AB è lato del poligono armonico, di cui K è il centro delle simediane; $\frac{SK}{SO}$ è dato, perchè S, K ed O sono punti dati; dunque $\frac{(O, A'B')}{A'B'}$ è costante e però costante è pure $A'B'$.

I punti S ed S' si chiamano *centri d'inversione* del poligono armonico e sono coniugati armonici rispetto ad O ed a K .

Si può quindi trasformare sempre un poligono armonico in un altro pure armonico.

14. In un poligono armonico siano $1, 2, 3, \dots$ i vertici; siano $1, 2$ e 3 tre vertici consecutivi; KP e KP' le perpendicolari condotte dal centro delle simediane ai lati $1, 2$ ed $1, 3$; sia $1'$ il punto d'intersezione di $1, K$ col circolo circoscritto Z . Il rapporto $\frac{KP}{1, 2} : \frac{KP'}{1, 3}$ è uguale al rapporto

anarmonico (1, 2, 3, 1'), il quale è costante, perchè uguale al rapporto anarmonico corrispondente in un poligono regolare; essendo $\frac{KP}{1, 2}$ costante, lo è pure $\frac{KP'}{1, 3}$; cioè il poligono stellato formato dalle corde (1, 3), (2, 4), (3, 5)... è un poligono armonico ed ha K per centro delle simediane.

In modo analogo si può dimostrare che è pure armonico il poligono stellato formato dalle corde (1, 4), (2, 5), (3, 6),... che ha K per centro delle simediane.

Così pure si può dimostrare facilmente che i poligoni formati dai vertici alternati 1, 3, 5,.... $2n - 1$ e 2, 4, 6,.... $2n$ di un poligono armonico di un numero pari di lati sono pure armonici e che hanno il medesimo centro delle simediane.

15. Sia d la lunghezza KO ed R il raggio di Z. Si è visto che ω è definito dalla equazione: $\text{tang } \omega = \frac{2x}{a} = \frac{2(K, AB)}{AB}$; sia A'B' il lato del poligono regolare di n lati inscritto a Z; si ha dalla geometria elementare: $\text{cotang } \frac{\pi}{n} = \frac{2h_a}{a}$; essendo: $h_a = a(O, A'B')$, è: $\text{cotang } \frac{\pi}{n} = \frac{2(O, A'B')}{A'B'}$.
Dividendo termine a termine le espressioni che danno $\text{tang } \omega$ e $\text{cotang } \frac{\pi}{n}$ si ottiene:

$$\frac{\text{tang } \omega}{\text{cotang } \frac{\pi}{n}} = \frac{(K, AB)}{AB} : \frac{(O, A'B')}{A'B'} = \frac{SK}{SO},$$

per quanto si è visto precedentemente (14).

Ma siccome O e K sono coniugati armonici rispetto ad S ed S', che sono inversi rispetto a Z, si ha:

$$SK : SO = \sqrt{1 - \frac{d^2}{R^2}};$$

e quindi si ricava:

$$\text{tang } \omega = \text{cotang } \frac{\pi}{n} \sqrt{1 - \frac{d^2}{R^2}},$$

da cui, risolvendo rispetto a d :

$$d^2 = R^2 \left(1 - \text{tang}^2 \omega \text{ tang}^2 \frac{\pi}{n} \right).$$

Come caso particolare si supponga che il poligono armonico sia un triangolo equilatero. Poichè le distanze x, y, z del punto K di Lemoine dai lati sono proporzionali ai lati stessi [Lugli, N. C., 5], da: $\text{tang } \omega = \frac{2x}{a}$, si ha: $\text{tang } \omega = \frac{4\Delta}{3a^2}$; ed essendo: $h_a = \frac{a}{2}\sqrt{3}$ e quindi: $2\Delta = ah_a = \frac{a^2}{2}\sqrt{3}$, sostituendo si ricava: $\text{tang } \omega = \frac{a^2\sqrt{3}}{3a^2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ e perciò: $\omega = 30^\circ$ [Lugli, N. C., 9].

Essendo dunque: $\text{tang } \frac{\pi}{n} = \text{tang } \frac{180^\circ}{3} = \text{tang } 60^\circ = \sqrt{3}$, si ottiene:

$d^2 = R^2 \left(1 - \frac{1}{3} \cdot 3\right) = 0$, come si poteva prevedere, giacchè nel caso del triangolo equilatero il centro del circolo circoscritto ed il punto di Lemoine coincidono.

Si verifica subito che per gli angoli ω ed ω' di Brocard di due poligoni armonici di m e di n lati, aventi il medesimo circolo circoscritto e lo stesso centro delle simediane, si ha la relazione:

$$\text{tang } \omega : \text{tang } \omega' = \text{cotang } \frac{\pi}{m} : \text{cotang } \frac{\pi}{n}.$$

E poichè un poligono regolare di n lati può occupare nel circolo circoscritto infinite posizioni, risulta evidente che nel medesimo circolo si possono inscrivere infiniti poligoni armonici di n lati col medesimo centro delle simediane.

16. Per il punto K di un poligono armonico $ABCD\dots$ di n lati si conduca una retta qualunque che tagli i lati nei punti R_1, R_2, R_3, \dots ; il luogo del punto P di essa preso in modo da verificare l'uguaglianza:

$$\frac{1}{KR_1} + \frac{1}{KR_2} + \frac{1}{KR_3} + \dots = \frac{n}{KP},$$

è la polare di K rispetto al circolo circoscritto Z , polo e polare armonica rispetto al dato poligono, che furono chiamati *punto e retta di Lemoine* del poligono.

Analogamente se il punto P è l'intersezione della retta arbitraria col circolo circoscritto Z , è verificata la medesima uguaglianza.

17. Con una dimostrazione analoga a quella fatta al n. 16 della nota del prof. Lugli, linea 5^a, si può provare esattamente la seguente proprietà generale: in ogni poligono armonico di n lati le perpendicolari condotte dal centro del circolo circoscritto Z ai lati incontrano il circolo Z in n punti tali che la $2n$ rette congiungenti questi punti cogli estremi dei lati corrispondenti si tagliano, n ad n , in due punti fissi Q ed Q' di Z che si chiamano *punti di Brocard* del poligono [Lugli, N. C., 10]. Gli n punti L, M, N, \dots , in cui le perpendicolari tagliano il circolo di Brocard sono detti *punti invariabili* [4]; le proiezioni del centro O di Z sulle simediane sono i *punti doppi* [1] del poligono.

18. Sia $ABCD\dots$ un poligono armonico inscritto in un circolo Z ; per il centro K delle simediane si conduca la KU_1 , parallela alla tangente AT condotta al circolo Z per il vertice A , sino a tagliare in U il lato AB ; il segmento KU è costante. Sia A' il punto, in cui AK incontra Z ; si congiunga A' con B e si conduca KX perpendicolare ad AC . Si ha subito per semplici cognizioni di geometria piana e di trigonometria:

$$KX : KU = \text{sen } \widehat{AUK} = \text{sen } \widehat{TAU} = \text{sen } \widehat{AA'B} = \frac{AB}{2} : R;$$

è dunque:

$$KX : KU = \frac{AB}{2} : R,$$

ossia:

$$KU : R = KX : \frac{AB}{2};$$

ed essendo [12]: $\text{tang } \omega = \frac{2KX}{AB}$, è pure: $KU = R \text{ tang } \omega = \text{costante}$.

Si divida ora KA con un punto A'' in modo che sia: $KA'' : A''A = m : n$, essendo m ed n quantità date; per A'' si conducano le $A''U'$ e $A''O'$, parallele alla tangente AT e ad OA , sino a tagliare AB in U' e KO in O' ; si unisca O' con U' e si conduca KU parallela ad $A''U'$ sino a tagliare AB in U . Il triangolo $O'U'A''$ è rettangolo in A'' ; quindi è:

$$\overline{O'U'}^2 = \overline{A''U'}^2 + \overline{A''O'}^2.$$

Dai triangoli simili $KA'O$ e $KA''O'$ si ha:

$$KA : KA'' = AO : A''O';$$

e dalla ipotesi $KA'' : A''A = m : n$ con semplici trasformazioni si ricava: $KA : KA'' = m + n : m$; quindi si ha:

$$AO : A''O' = m + n : m,$$

ossia:

$$A''O' = \frac{m \cdot AO}{m + n} = \frac{m \cdot R}{m + n}.$$

Analogamente dai triangoli simili $AU'A''$ e AKU si ha:

$$KA : AA'' = KU : A''U' = m + n : n,$$

avendosi:

$$KA : AA'' = m + n : n;$$

e perciò:

$$A''U' = \frac{n : KU}{m + n} = \frac{nR \text{ tang } \omega}{m + n}$$

per quanto precede. Quadrando ed addizionando i valori di $A''U'$ e $A''O'$ si ottiene:

$$\overline{O'U'}^2 = R^2 (m^2 + n^2 \text{ tang}^2 \omega) : (m + n)^2 = \text{costante},$$

e quindi $O'U' = \text{costante}$, cioè i punti analoghi ad U' sono sopra una circonferenza Γ di centro O' e di raggio $O'U'$.

Se $B''V'$ è parallela alla tangente in B al circolo Z e taglia BC in V' , il triangolo $O'B''V'$ è uguale al triangolo $O'A''U'$; quindi si ha:

$$U'\widehat{O'}V' = A\widehat{O}B;$$

se ne deduce perciò che i punti U', V', \dots sono i vertici di un poligono simile al poligono ABC, \dots , e formano dunque un poligono armonico. Un altro poligono armonico si ottiene ripetendo la costruzione nel senso opposto, cioè rispetto alla semiretta AT' opposta ad AT .

19. Da questa importante proposizione si possono trarre alcuni casi particolari dando al rapporto $m:n$ valori diversi. Si ha così:

1° se $m = 0$, il circolo Γ è il secondo circolo di Lemoine (circolo del coseno degli Inglesi) [Lugli, N. C., 17];

2° se $m = n$, O' è il centro di OK ed il circolo Γ è concentrico al circolo di Brocard; per analogia chiamasi *primo circolo di Lemoine* del poligono [Lugli, N. C., 11]; il suo diametro è uguale ad $R \sec \omega$;

3° se $m = n \tan^2 \omega$, il centro del circolo Γ è il centro del segmento QQ' [17];

4° se il poligono si riduce ad un triangolo, e se è:

$$m : n = - \cotang A \cotang B \cotang C : \cotang \omega,$$

il circolo Γ è il circolo di Taylor [Lugli, N. C., 18];

5° ogni circolo di Tucker [Lugli, N. C., 20] di un triangolo ABC è un circolo di Taylor di qualunque altro triangolo A'B'C' che abbia il medesimo circolo circoscritto ed il medesimo punto di Lemoine.

Chi abbia desiderio di acquistare più estese cognizioni su questo argomento, potrà consultare le seguenti pubblicazioni, delle quali io pure mi sono servito: *Annuaire de l'Association française pour l'avancement des sciences*, année 1881-1883-1886; *Chapitre supplémentaire de A sequel to the first six Books of the Elements of Euclid* del Casey; *Companion to the Weehly Papers* del Milne, *Mathesis de Mansion et Neuberg*, tome II, V, VII e *Nouvelle Correspondance mathématique*, tome III, IV, V et VI.

Novembre, 1897.

Dott. U. CERETTI.

A PROPOSITO DELLA NOTA DEL PROF. CIAMBERLINI

* Sulle definizioni di equazione e di sistemi di equazione *

(V. *Periodico*, anno XII, fasc. VI, pag. 184)

Nel mio insegnamento io definisco l'equazione od inequazione un *problema da risolvere*, che consiste nel cercare quali sono i valori dell'incognita o delle incognite che rendono uguali o disuguali, due date espressioni algebriche. E similmente per i sistemi. Così si mette in luce, io credo, la vera natura delle equazioni od inequazioni, e restano incluse anche le equazioni od inequazioni impossibili e quelle identiche; e le equazioni identiche conservano una certa distinzione dalle identità, in quanto le prime corrispondono, come *problemi*, alle *domande*: " Cercate il valore di x per cui A è uguale a B ", alla quale si risponde: " x può assumere qualunque valore. ", mentre le seconde sono veri *teoremi*, ed *enunciano le verità* " A è uguale a B per ogni valore di x ", costituendo così questa come la *risposta* a quelle.

Nel concetto, come si vede, la mia definizione collima con quella del prof. Ciambertini.

Torino, Novembre 1897.

RODOLFO BETTAZZI.

RISOLUZIONI DELLE QUISTIONI 190 278 281 293 325 358

190. Date tre tangenti a , b , c , alla parabola ed il punto M_c di contatto sull'una c , determinare analiticamente il fuoco e la grandezza del parametro.

APPLICAZIONE. — Cercare il luogo geometrico dei fuochi delle parabole tangenti a due rette fisse e ad una circonferenza inscritta nell'angolo di queste rette.

BELLACCHI.

Risoluzione del Prof. U. Ceretti di Badia Polesine.

Assi coordinati siano le tangenti c e b , che formino un angolo θ ; siano x_1 e 0 le coordinate cartesiane di M_c . Le equazioni di b di c , e di a saranno: $x = 0$, $y = 0$, $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$, essendo perciò $-\frac{1}{m}$ e $-\frac{1}{n}$ le coordinate plückeriane di a . L'equazione della parabola tangente agli assi coordinati è della forma

$$(1) \quad uv + hu + kv = 0,$$

nella quale h e k sono parametri arbitrari. Ogni tangente alla (1) essendo rappresentata da

$$(2) \quad ux + vy + 1 = 0,$$

affinchè la parabola sia tangente alla c nel punto $M_c (x_1, 0)$, dovrà essere $u = -\frac{1}{x_1}$, e dalla (1) si dedurrà: $v = \frac{h}{kx_1 - 1}$; se la tangente c è anche l'asse delle ascisse, il valore di v deve essere infinito per h diverso da zero, onde si ha: $k = \frac{1}{x_1}$. Inoltre alla parabola è pure tangente la a ; perciò la (1) deve essere soddisfatta da $-\frac{1}{m}$ e $-\frac{1}{n}$; si ha così la condizione: $hn + km = 1$, la quale

coll'altra $k = \frac{1}{x_1}$ dà: $h = \frac{x_1 - m}{nx_1}$. Eliminando v fra le equazioni (1) e (2) si ottiene

$$u^2x + u(kx - hy + 1) + k = 0,$$

di cui il discriminante, uguagliato a zero, rappresenta la parabola in coordinate cartesiane e cioè

$$(3) \quad (kx - hy)^2 - 2(kx + hy) + 1 = 0,$$

dalla quale, per una nota formola della Geometria analitica, per il parametro p risulta

$$(4) \quad p = \frac{2hk \operatorname{sen}^2 \theta}{(h^2 + k^2 + 2hk \cos \theta)^{\frac{3}{2}}}.$$

Poichè le rette congiungenti il fuoco $F (X, Y)$ della parabola coi punti ciclici all'infinito sono date dalle equazioni $y - Y + (x - X)(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = 0$ per $i = \pm \sqrt{-1}$, ponendole sotto la forma (2), si ricava:

$$u = -\frac{\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta}{Y + X(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)}, \quad v = -\frac{1}{Y + X(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)} = u(\cos \theta - i \operatorname{sen} \theta);$$

sostituendo questi valori di u e di v nella formola (1) si trova:

$$h(X \cos \theta + Y) + k(X + Y \cos \theta) - 1 + i \operatorname{sen} \theta (hX - kY) = 0;$$

da cui si ha il sistema:

$$(5) \quad \begin{cases} hX - kY = 0, \\ kX + h(2X \cos \theta + Y) = 1, \end{cases}$$

il quale risolto rispetto ad X e ad Y dà

$$(6) \quad \begin{cases} X = \frac{k}{h^2 + k^2 + 2hk \cos \theta}, \\ Y = \frac{h}{h^2 + k^2 + 2hk \cos \theta}, \end{cases}$$

coordinate che determinano il fuoco per i valori determinati di h e di k . Sostituendo nelle (4) e (6) $\frac{1}{x_1}$ a k e $\frac{x_1 - m}{nx_1}$ ad h , e ponendo $P = (x_1 - m)(x_1 - m + 2n \cos \theta) + n^2$ si ottiene

$$p = \frac{2n^2 x_1 (x_1 - m) \sin^2 \theta}{P^{\frac{3}{2}}}, \quad X = \frac{n^2 x_1}{P}, \quad Y = \frac{nx_1 (x_1 - m)}{P},$$

relazioni che risolvono la prima parte della questione.

OSSERVAZIONE. — Per $\theta = 90^\circ$ i numeratori non variano, essendo: $\sin^2 \theta = 1$ ed il denominatore P diventa: $(x_1 - m)^2 + n^2$.

APPLICAZIONE. — Come precedentemente siano le tangenti b e c assi coordinati che formino un angolo θ . L'equazione generale del cerchio in coordinate pluckeriiane, essendo α e β le coordinate del suo centro, ed R il raggio, è

$$(\alpha u + \beta v + 1)^2 \sin^2 \theta - R^2 (u^2 + v^2 - 2uv \cos \theta) = 0;$$

e poichè deve essere tangente agli assi coordinati, si hanno le relazioni

$$\beta^2 \sin^2 \theta - R^2 = 0, \quad \alpha^2 \sin^2 \theta - R^2 = 0,$$

dalle quali si ottiene $\alpha = \beta = \frac{R}{\sin \theta} = \frac{1}{s}$; e però l'equazione precedente si riduce ad

$$\{R(u + v) + \sin^2 \theta\}^2 - R^2 (u^2 + v^2 - 2uv \cos \theta) = 0,$$

oppure

$$(7) \quad 2quv + 2s(u + v) + s^2 = 0,$$

avendo posto per brevità $1 + \cos \theta = q, \frac{1}{R} \sin \theta = s$.

Eliminando v tra le equazioni (1) e (7) si ottiene l'equazione

$$2u^2 (qh - s) - u [2s(k - h) + s^2] - ks^2 = 0;$$

il discriminante nullo di questa esprime che le curve (1) e (7) sono tangenti, il che appunto si ha per dato; si ricava così

$$(8) \quad \{2(k - h) + s\}^2 + 8k(qh - s) = 0.$$

Eliminando h e k fra le equazioni (5) e (8) si ricava una equazione fra X e Y che rappresenta il luogo cercato. Dalla prima delle (5) si ha:

$$h = \lambda Y \quad \text{e} \quad k = \lambda X;$$

e perciò dall'altra si ha

$$\lambda = \frac{1}{X^2 + 2XY \cos \theta + Y^2};$$

sostituendo ora nella (8) e riducendo, si ottiene l'equazione:

$$(9) \quad \begin{cases} X^4 + Y^4 + AXY + B(X^3Y + XY^3) + C(X^2 + Y^2) + D(X^2Y + XY^2) \\ + E(X^2 + Y^2) + FXY = 0, \end{cases}$$

avendo posto $A = 2(1 + 2 \cos \theta)$; $B = 4 \cos \theta$; $C = -\frac{4}{s}$; $D = -\frac{4}{s}(1 + 2 \cos \theta)$;
 $E = \frac{4}{s^2}$; $F = \frac{8}{s^2} \cos \theta$, equazione di una curva di 4° ordine passante per l'origine.

Osservazione. — Per $\theta = 90^\circ$ la (6) diventa:

$$X^4 + Y^4 + 2X^2Y^2 - \frac{4}{s}(X^3 + Y^3) - \frac{4}{s}(X^2Y + XY^2) + \frac{4}{s^2}(X^2 + Y^2) = 0,$$

che si può anche scrivere

$$(10) \quad (X^2 + Y^2) \left\{ X^2 + Y^2 - \frac{4}{s}(X + Y) + \frac{4}{s^2} \right\} = 0,$$

equazione di un luogo di 4° ordine che si scinde nei due:

$$X^2 + Y^2 = 0 \quad \text{e} \quad X^2 + Y^2 - \frac{4}{s}(X + Y) + \frac{4}{s^2} = 0,$$

dei quali il primo è l'insieme delle rette isotrope condotte per l'origine, ed il secondo è una circonferenza tangente agli assi coordinati.

278. Si considerino tutti i triangoli inscritti in una conica, aventi un vertice comune ed il lato opposto parallelo alla tangente in quel punto. Trovare il luogo del centro del cerchio circoscritto a ciascuno di questi triangoli.

G. SCORZA.

Risoluzione del sig. G. Gallucci studente a Napoli.

Supponiamo che la conica sia una ellisse. Prendiamo come assi di coordinate, il diametro passante pel vertice fisso A ed il suo coniugato. L'equazione della curva sarà

$$(1) \quad \frac{x^2}{a'^2} + \frac{y^2}{b'^2} = 1$$

Se alla distanza $OP = m$ dal centro O si conduce la parallela alla tangente in A, ossia all'asse delle y , questa incontra l'ellisse in due punti, di cui l'ascissa comune è m e le ordinate sono $x = \pm l$, ove $l = b'^2 \left(1 - \frac{m^2}{a'^2}\right)$. Allora i 3 punti A, M, M' avranno per coordinate $(a', 0)$, (m, l) , $(m, -l)$. Se x, y sono le coordinate di un punto equidistante da A, M, N, si avrà, indicando con ω l'angolo degli assi,

$$(2) \quad \begin{cases} (x - a')^2 + y^2 + 2(x - a')y \cos \omega = (x - m)^2 + (y - l)^2 + 2(x - m)(y - l) \cos \omega \\ (x - a')^2 + y^2 + 2(x - a')y \cos \omega = (x - m)^2 + (y + l)^2 + 2(x - m)(y + l) \cos \omega. \end{cases}$$

Per trovare l'equazione del luogo richiesto bisogna eliminare la m e la l . Per sottrazione dalle (2) si ha

$$4ly + 4l(x - m) \cos \omega = 0;$$

da cui

$$x - m = -\frac{y}{\cos \omega}, \quad m = \frac{x \cos \omega + y}{\cos \omega}.$$

Addizionando invece si ha:

$$(x - a')^2 + y^2 + 2y(x - a') \cos \omega = (x - m)^2 + y^2 + l^2 + 2(x - m)y \cos \omega.$$

Sostituendo in questa eguaglianza $-\frac{y}{\cos \omega}$ ad $x - m$, e

$$b'^2 \left(1 - \frac{m^2}{a'^2}\right) = b'^2 - b'^2 \frac{x^2 \cos^2 \omega + y^2 + 2xy \cos \omega}{a'^2 \cos^2 \omega}$$

ad l^2 , dopo le opportune riduzioni si ha

$$x^2 (a'^2 + b'^2) \cos^2 \omega + 2xy (a'^2 \cos^2 \omega + b' \cos \omega) + y^2 (2a'^2 \cos^2 \omega - a'^2 + b'^2) - 2xa'^2 \cos^2 \omega + 2ya'^2 \cos^2 \omega + (a'^2 - a'^2 b'^2) \cos^2 \omega = 0.$$

Questa è l'equazione del luogo. Se la conica data è una iperbole, il risultato è analogo; basta sostituire $-b'^2$ a b'^2 . In entrambi i casi è facile vedere che l'invariante assoluto

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

è $-\alpha'^2 \operatorname{sen}^2 \omega \cos^2 \omega$, onde il luogo richiesto è una iperbole, che può degenerare anche in due rette secondo i valori ω .

Se la conica data è una parabola, prendendo come assi il diametro passante per A e la tangente in A, la sua equazione è $y^2 = px$ e le coordinate dei 3 punti A, M, M' sono $(0,0)$, (m, \sqrt{pm}) , $(m, -\sqrt{pm})$. Con lo stesso procedimento precedente si arriva alla equazione

$$x^2 \cos^2 \omega + 2xy \cos^2 \omega - y^2 \operatorname{sen}^2 \omega - px \cos^2 \omega - py \cos \omega = 0$$

la quale rappresenta un'iperbole.

Se $\omega = 90^\circ$, qualunque sia la conica data l'equazione del luogo si riduce ad $y^2 = 0$, che rappresenta il diametro passante per A contato due volte.

281. Due cerchi di centri O, O' si tagliano in A e B. Preso un punto P sul primo e condotte le secanti PA, PB a tagliare il secondo nuovamente in A', B', dimostrare che al muoversi di P sull'arco esterno del cerchio O, rimane costante il rapporto della potenza di P, rispetto ad O' , all'area del quadrilatero ABB'A'.

GALLUCCI.

Risoluzione del Sig. Francesco Celestri.

Si ha, indicando con θ l'angolo APB

$$\begin{aligned} \text{area ABB'A} &= \text{area A'PB'} - \text{area APB} \\ &= \frac{1}{2} \text{PA}' \times \text{PB}' \cdot \operatorname{sen} \theta - \frac{1}{2} \text{PA} \times \text{PB} \cdot \operatorname{sen} \theta \\ &= \frac{1}{2} (\text{PA}' \times \text{PB}' - \text{PA} \times \text{PB}) \cdot \operatorname{sen} \theta. \end{aligned}$$

Bisogna dunque dimostrare che si ha

$$(1) \quad \frac{\text{PA}' \times \text{PA}}{\frac{1}{2} (\text{PA}' \times \text{PB}' - \text{PA} \times \text{PB}) \operatorname{sen} \theta} = \text{costante};$$

ossia, essendo $\operatorname{sen} \theta$ costante, deve essere

$$\frac{\text{PA}' \times \text{PB}' - \text{PA} \times \text{PB}}{\text{PA}' \times \text{PB}} = \text{costante};$$

ossia ancora, dividendo numeratore e denominatore per $\text{PA}' \times \text{PA}$,

$$(2) \quad \frac{1}{\frac{\text{PB}'}{\text{PA}} \cdot \frac{\text{PB}}{\text{PA}'}} = \text{costante}.$$

Tiriamo ora le rette A'B, AB'; per un noto teorema si sa che al variare del punto P sull'arco esterno del cerchio O gli angoli PAB', PBA si mantengono costantemente uguali all'angolo OAO' sotto cui si tagliano i due cerchi, e quindi al variare di P i triangoli PAB', PBA, avendo sempre due angoli costanti, si mantengono simili a sè stessi e quindi i rapporti $\frac{\text{PB}'}{\text{PA}}$, $\frac{\text{PB}}{\text{PA}'}$ rimangono costanti e perciò rimane anche costante la (2) d'onde deriva che è anche vera la (1). c. d. d.

293. Se gli spigoli di un triedro trirettangolo, di vertice O , sono tagliati da un piano arbitrario π nei punti A, B, C , e sono M, M' due punti qualunque simmetrici rispetto a π , si ha la relazione

$$\frac{4 \overline{MM'}^2}{(\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2)^2} = \frac{1}{\overline{OA}^2} + \frac{1}{\overline{OB}^2} + \frac{1}{\overline{OC}^2}$$

A. DEL RE.

Risoluzione del sig. prof. Pietro Castelli.

Poniamo $OA = a, OB = b, OC = c$. Nel tetraedro rettangolo $OABC$ sieno S_1, S_2, S_3, S le aree delle facce OBC, OAC, OAB, ABC . Si ha la relazione $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$, ossia $4S^2 = b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2$. Inoltre il volume del tetraedro è la sesta parte del parallelepipedo retto avente i tre spigoli non paralleli eguali ad a, b, c . Quindi, se H è la proiezione del vertice O sulla faccia ABC , si ha

$$\frac{1}{6} abc = S \cdot \frac{1}{3} OH,$$

donde

$$a^2b^2c^2 = 4S^2 \cdot \overline{OH}^2 = \overline{OH}^2 (b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2)$$

Dividendo per $a^2b^2c^2 \cdot \overline{OH}^2$ avremo

$$(1) \quad \frac{1}{\overline{OH}^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$$

Siano N la traccia della retta MM' sul piano π e D la proiezione del vertice O su MM' . Nel triangolo OMM' la retta ON è mediana, quindi per un teorema noto si ha

$$\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2 = 2MM' \cdot ND = 2MM' \cdot OH,$$

donde

$$(\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2)^2 = 4 \overline{MM'}^2 \cdot \overline{OH}^2,$$

ossia

$$\overline{OH}^2 = \frac{(\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2)^2}{4 \overline{MM'}^2}.$$

Sostituendo questo valore nella (1) si ha,

$$\begin{aligned} \frac{4 \overline{MM'}^2}{(\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2)^2} &= \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \\ &= \frac{1}{\overline{OA}^2} + \frac{1}{\overline{OB}^2} + \frac{1}{\overline{OC}^2} \end{aligned} \quad \text{c. d. d.}$$

Altra risoluzione del sig. Francesco Celestri.

325. Se si pone $\varphi = u^2 + v^2 + w^2, \Delta = u\xi + v\eta + w\zeta + 1$, e si eliminano le ξ', η', ζ' fra le equazioni

$$(1) \quad u\xi + v\eta + w\zeta + (u\xi' + v\eta' + w\zeta' + 2) = 0,$$

$$(2) \quad u'\xi' + v'\eta' + w'\zeta' + 1 = 0,$$

$$(3) \quad \xi' - \xi : \eta' - \eta : \zeta' - \zeta = u : v : w,$$

si ha per equazione risultante

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 2\Delta - \varphi \\ 1 & 0 & 0 & -\xi & u \\ 0 & 1 & 0 & -\eta & v \\ 0 & 0 & 1 & -\zeta & w \\ u' & v' & w' & 1 & 0 \end{vmatrix} = \varphi (u'\xi + v'\eta + w'\zeta + 1) - 2\Delta (uu' + vv' + ww') = 0$$

DEL RE.

Risoluzione del Sig. E. Palumbo Tedaro studente della R. Università di Palermo.

Dalle (3), indicando con ρ un fattore di proporzionalità, si ricava

$$(4) \quad \begin{cases} \xi' - \xi = \rho u \\ \eta' - \eta = \rho v \\ \zeta' - \zeta = \rho w. \end{cases}$$

Da ambo i membri della (1) togliamo $2(u\xi + v\eta + w\zeta)$, ed otteniamo riducendo

$$u(\xi' - \xi) + v(\eta' - \eta) + w(\zeta' - \zeta) = -2(u\xi + v\eta + w\zeta + 1).$$

Sostituendo in questa a $(\xi' - \xi)$, $(\eta' - \eta)$, $(\zeta' - \zeta)$ i loro valori ricavati dalle (4), si ha

$$\rho(u^2 + v^2 + w^2) = -2(u\xi + v\eta + w\zeta + 1).$$

ossia, per quanto è stato premesso nell'enunciato

$$(\alpha) \quad \rho \varphi = -2\Delta$$

Se ora dalle (4) ricaviamo i valori di ξ' , η' , ζ' e li sostituiamo nella (2) essa diventa

$$u'\xi + v'\eta + w'\zeta + 1 + \rho(uu' + vv' + ww') = 0,$$

ossia

$$(\beta) \quad u'\xi + v'\eta + w'\zeta + 1 = -\rho(uu' + vv' + ww').$$

Moltiplicando adesso le (α) , (β) membro a membro, si ha

$$\varphi(u'\xi + v'\eta + w'\zeta + 1) = 2\Delta(uu' + vv' + ww')$$

ossia

$$\varphi(u'\xi + v'\eta + w'\zeta + 1) - 2\Delta(uu' + vv' + ww') = 0 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 2\Delta & -\varphi \\ 1 & 0 & 0 & -\xi & u \\ 0 & 1 & 0 & -\eta & v \\ 0 & 0 & 1 & -\zeta & w \\ u' & v' & w' & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

358. Se (ρ_0, ω_0) , (ρ_1, ω_1) , (ρ_2, ω_2) sono i raggi vettori focali e le corrispondenti anomalie vere di un pianeta in tre posizioni P_0, P_1, P_2 , il parametro dell'orbita è

$$p = \frac{\rho_0 \rho_1 \rho_2}{2\Delta} [\text{sen}(\omega_0 - \omega_1) + \text{sen}(\omega_1 - \omega_2) + \text{sen}(\omega_2 - \omega_0)],$$

ove Δ è l'area del triangolo $P_0 P_1 P_2$.

RETTALI.

Risoluzione del sig. Ernesto Laura.

L'equazione polare dell'orbita al fuoco è

$$\rho = p \frac{1}{1 + e \cos(\omega - \beta)}$$

ove β è l'angolo che fa l'asse fisso con l'asse principale.

Da essa deducesi

$$p - x\rho \cos \omega + y\rho \text{sen} \omega = p,$$

ove

$$x = e \cos \beta, \quad y = -e \text{sen} \beta.$$

Sostituendo in essa in luogo di (ρ, ω) rispettivamente (ρ_0, ω_0) , (ρ_1, ω_1) , (ρ_2, ω_2) si ottiene

$$\begin{aligned} p - x\rho_0 \cos \omega_0 + y\rho_0 \text{sen} \omega_0 &= p_0 \\ p - x\rho_1 \cos \omega_1 + y\rho_1 \text{sen} \omega_1 &= p_1 \\ p - x\rho_2 \cos \omega_2 + y\rho_2 \text{sen} \omega_2 &= p_2. \end{aligned}$$

Eliminando x e y , si ha

$$p = \frac{\begin{vmatrix} \rho_0 & -\rho_0 \cos \omega_0 & \rho_0 \operatorname{sen} \omega_0 \\ \rho_1 & -\rho_1 \cos \omega_1 & \rho_1 \operatorname{sen} \omega_1 \\ \rho_2 & -\rho_2 \cos \omega_2 & \rho_2 \operatorname{sen} \omega_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -\rho_0 \cos \omega_0 & \rho_0 \operatorname{sen} \omega_0 \\ 1 & -\rho_1 \cos \omega_1 & \rho_1 \operatorname{sen} \omega_1 \\ 1 & -\rho_2 \cos \omega_2 & \rho_2 \operatorname{sen} \omega_2 \end{vmatrix}};$$

da cui

$$p = \rho_0 \rho_1 \rho_2 \frac{\begin{vmatrix} 1 & \cos \omega_0 & \operatorname{sen} \omega_0 \\ 1 & \cos \omega_1 & \operatorname{sen} \omega_1 \\ 1 & \cos \omega_2 & \operatorname{sen} \omega_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_0 \cos \omega_0 & \rho_0 \operatorname{sen} \omega_0 \\ 1 & \rho_1 \cos \omega_1 & \rho_1 \operatorname{sen} \omega_1 \\ 1 & \rho_2 \cos \omega_2 & \rho_2 \operatorname{sen} \omega_2 \end{vmatrix}}.$$

Ma

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \omega_0 & \operatorname{sen} \omega_0 \\ 1 & \cos \omega_1 & \operatorname{sen} \omega_1 \\ 1 & \cos \omega_2 & \operatorname{sen} \omega_2 \end{vmatrix} = \operatorname{sen} (\omega_2 - \omega_1) + \operatorname{sen} (\omega_0 - \omega_2) + \operatorname{sen} (\omega_1 - \omega_0)$$

e in valore assoluto

$$\begin{vmatrix} 1 & \rho_0 \cos \omega_0 & \rho_0 \operatorname{sen} \omega_0 \\ 1 & \rho_1 \cos \omega_1 & \rho_1 \operatorname{sen} \omega_1 \\ 1 & \rho_2 \cos \omega_2 & \rho_2 \operatorname{sen} \omega_2 \end{vmatrix} = 2\Delta.$$

Quindi in valore assoluto

$$p = \frac{\rho_0 \rho_1 \rho_2}{2\Delta} [\operatorname{sen} (\omega_0 - \omega_1) + \operatorname{sen} (\omega_1 - \omega_2) + \operatorname{sen} (\omega_2 - \omega_0)].$$

QUISTIONI PROPOSTE

391. 1°. Se una conica, inscritta nel triangolo ABC, ha un fuoco nel punto H d'incontro delle altezze, ha l'altro nel centro O del cerchio circoscritto ad ABC.

2°. Se una conica, inscritta nel triangolo ABC, ha un fuoco nel centro D del cerchio inscritto ad ABC, è un cerchio.

3°. Se una conica, inscritta in ABC, ha un fuoco nel baricentro G di ABC, vuolsi sapere quale è il rapporto delle distanze di due vertici di ABC dalla retta, che unisce il terzo vertice al secondo fuoco H della conica.

FUBINI.

392. Se α e b sono tangenti a una conica K^2 nei punti A e B:

1°. La conica K_0^2 omologica armonica di K^2 con A centro e b asse di omologia, coincide con la omologica armonica di K^2 , quando si prende B per centro ed α per asse di omologia.

2°. Ognuna delle coniche K^2 e K_0^2 è polare reciproca di sè stessa rispetto all'altra.

3°. Le due coniche K^2 e K_0^2 in ognuno dei punti A e B, ove esse si toccano, hanno raggi di curvatura eguali e di segno contrario.

4°. Determinare la specie della conica K_0^2 dipendentemente dalla posizione del punto $O = (ab)$ e dalla natura della K^2 , supposta fissa.

RETALI.

393. Entro un'urna sono n palle numerate (P_1, P_2, \dots, P_n) e si estraggono tutte ad una alla volta. Probabilità che una almeno sortita nell'ordine dato dal proprio numero. — Caso di $n = \infty$.

394. Dati due mazzi di carte, se ne estraggono due alla volta, una per ogni mazzo. Probabilità che sortano insieme due carte uguali.

BAROZZINI.

395. Sieno c, c' due cerchi posti nello stesso piano, che abbiano per centri rispettivamente C, C' , e s'incontrino in due punti H e K. Immaginando un triangolo variabile MNP, tale che i lati MN, MP, NP, passino rispettivamente per H, C, C' ed i vertici M, N sieno rispettivamente su c e su c' , dimostrare che il luogo del terzo vertice P è il circolo che passa per C, C' e K.

CARDOSO-LAYNES.

396. Sia data la parabola $x^2 + 2hy(1 + \cos 2\alpha) - 2hx \sin 2\alpha = 0$, che ha l'asse di figura parallelo all'asse delle y . Dimostrare, essendo gli assi ortogonali,

1° che α è l'angolo che la tangente alla parabola nell'origine forma con l'asse positivo delle x ;

2° che staccando sull'asse delle y , a partire dall'origine, un segmento $OA = h$, la parallela all'asse delle x condotta da A è la direttrice della parabola;

3° descrivendo su di OA come diametro una semicirconferenza che incontri in B la tangente alla curva nell'origine, la parallela condotta da B all'asse delle x è la tangente alla parabola nel suo vertice;

4° se questa tangente incontra in C l'asse delle y , prendendo il segmento BD uguale ed opposto a BC, sarà D il vertice della parabola;

5° congiungendo A con B e prolungando questo segmento AB di altrettanto in F, sarà F il fuoco della parabola;

6° Il luogo dei vertici di tutte le parabole, che si ottengono dall'eq.^a data lasciando inalterato h e facendo variare α con legge di continuità, è una ellisse che ha per asse minore il segmento $OA = h$, e l'asse maggiore uguale a $2h$;

7° in questa stessa ipotesi di α variabile ed h costante il luogo dei fuochi di tutte le parabole è un circolo di centro O e raggio h ;

8° nella stessa ipotesi l'involuppo di tutte le parabole è un'altra parabola avente il vertice in A ed il fuoco in O;

9° il luogo dei vertici di tutte le parabole, che si ottengono dalla equazione data lasciando invariata α e facendo variare h con legge di continuità, è una retta che passa per l'origine e divide per metà le ordinate della tangente alla parabola nell'origine;

10° nella stessa ipotesi il luogo dei fuochi di tutte le parabole è una retta che passa per l'origine ed è perpendicolare alla retta che forma un angolo uguale a 2α con l'asse positivo delle x ;

11° nella stessa ipotesi l'involuppo di tutte le parabole è la retta che passa per l'origine e forma un angolo uguale ad α con l'asse positivo delle x .

BONOLIS.

BIBLIOGRAFIA

ROUBAUDI. - *Cours de géométrie descriptive*. - Paris, Masson et C^{ie}., 1897.

Questo libro, è la riproduzione delle lezioni che l'egregio autore fa da molti anni agli allievi della classe di seconda moderna; è quindi il frutto di una lunga esperienza dell'insegnamento.

L'opera è preceduta da una breve introduzione, nella quale sono esposte le prime nozioni sulla proiezione cilindrica, e conica (prospettiva) e la nozione degli elementi all'infinito della retta e del piano, con varie eleganti applicazioni. Fra queste ci sembra notevole una dimostrazione assai elementare delle proprietà di due triangoli omologici in un piano, dedotta da quelle di due triangoli omotetici.

Nella stessa introduzione è fatto opportunamente cenno della distinzione delle proprietà delle figure in descrittive, proiettive e metriche.

Nei 16 capitoli dei quali si compone il libro è trattata diffusamente la descrittiva col metodo di Marge, ed è fatta larga parte all'importantissimo metodo dei ribaltamenti. È esposta con cura la punteggiatura delle parti invisibili di una figura per distinguerle dalle visibili e la teoria delle ombre.

Il libro termina con una nota relativa alla soppressione della linea di terza nei disegni, nella quale nota sono esposti i vantaggi che derivano da tale soppressione.

Crediamo utile riportare le seguenti parole, colle quali l'egregio autore chiude la prefazione.

“ In tutte le quistioni che io ho trattato, io mi sono attenuto a presentare i
 “ metodi generali nel modo più semplice, a applicarli in tutti i casi piuttosto che
 “ ricorrere ad artifici; e a separare in ogni problema la soluzione geometrica, in
 “ generale indipendente dalla rappresentazione adottata, dalla soluzione grafica
 “ che si riduce sempre a un piccolo numero di tracciati fondamentali ”.

La lucidità e chiarezza di esposizione, unite alla bontà del metodo seguito e che è riassunto nelle parole sopra citate, rende il libro molto raccomandabile ai giovani studiosi.

K.

F. GOMES TEIXEIRA. — *Curso de Analyse Infinitesimal*. 3^a Ed. (Calcolo Differencial) premiado pela Academia Real des Sciencias de Lisboa — Porto, 1896.

Questa nuova edizione del Calcolo Differenziale dell'illustre professore F. Gomes Teixeira, venuta in luce sotto gli auspici della Reale Accademia delle Scienze di Lisbona, non poteva, anche a prescindere dal chiaro nome dell'autore, essere meglio raccomandata agli studiosi di matematica. Essa non è, come del resto era facile immaginare, per chi conosce l'operosità e la grande coltura dell'autore, una semplice ristampa delle precedenti edizioni, benchè l'autore vi abbia mantenuta inalterata, per così dire, l'orditura.

Questo primo volume del Corso di Analisi Infinitesimale si può dividere regolarmente in tre parti: Nozioni di analisi algebrica — Teoria elementare del calcolo differenziale — Nozioni sulle funzioni di variabili immaginarie. La prima parte è divisa in due capitoli, nel primo dei quali, dopo un breve cenno sull'operazioni algebriche, l'autore espone succintamente la teoria dei numeri irrazionali definiti mediante la decomposizione in classi, immaginata da Dedekind, e definisce i numeri negativi e le operazioni degli immaginari sotto forma ordinaria e sotto forma ridotta. A ciò fa seguito un'accurata nozione di limite, di cui faceva difetto la prima edizione, e quindi una elementare esposizione della teoria delle serie, dei

prodotti infiniti e delle frazioni continue. Nel secondo capitolo l'autore espone, in base ai teoremi di Weierstrass sull'esistenza dei limiti e di Cantor sulla continuità, i fondamenti della teoria di funzioni di variabili reali, poi dimostra alcune proprietà delle funzioni algebriche e delle trascendenti elementari. Questa prima parte occupa quasi un terzo del volume.

Nella seconda parte, premessa una facile e chiara esposizione della teoria delle derivate e dei differenziali delle funzioni a variabili reali, l'autore si occupa della derivazione del limite di una somma e dei determinanti funzionali, dimostrando alcune proprietà dell'Jacobiano e dell'heesiano. A ciò fa seguito un capitolo sulle applicazioni geometriche, ed un altro sulle derivate e differenziali di ordine superiore. In questo l'autore dimostra una propria formola di analisi, da cui deduce lo sviluppo di Taylor colle forme dei resti più importanti, e nel capitolo seguente l'applica allo sviluppo in serie di funzioni esplicite ed implicite, alla determinazione dei massimi e minimi di una funzione ad una o due variabili indipendenti. Quivi è anche un breve cenno sull'interpolazione, nel quale, unitamente alle note formole di Lagrangia e di Newton, l'autore dimostra una propria formola estratta dalle Memorie della Società Reale di Liegi. Segue poi un capitolo di applicazioni geometriche relative ai contatti ed alle singolarità delle curve. Due teoremi sulle funzioni definite per serie, l'uno per stabilire la continuità e l'altro la derivabilità, e da ultimo un interessante studio sulle singolarità di alcune funzioni mettono fine a quella che abbiamo chiamata la seconda parte del volume.

La terza parte è una interessante monografia di circa 50 pagine intorno ai più recenti progressi delle nostre conoscenze sulle funzioni di variabili immaginari, dovuti specialmente all'opera insigne di Weierstrass e di Mittaglegger. A. B.

N. COR & J. RIEMANN. — *Traité d'Algèbre élémentaire.* — Librairie Nony & C.^{ie} Paris.

Ho studiato questo eccellente trattato e credo bene meriti il detto: *indocti discant, ament meminisse periti.* — Quantunque il titolo indichi trattarsi di un libro elementare, pure vi è della materia superiore, che da noi viene trattata nel primo anno universitario. La esposizione, in generale, ha sapore di originalità e possiede rigore scientifico. Quasi sempre la teoria è accompagnata da applicazioni importanti che accrescono certamente l'interesse che desta l'opera; nè meno importante trovo la eccellentissima scelta dei gruppi di esercizi proposti.

La materia è così distribuita.

Numeri algebrici, Polinomi. Principi generali relativi alle equazioni considerate isolatamente. Principi generali relativi alle equazioni simultanee. Determinanti. Risoluzione d'un sistema qualunque di equazioni del primo grado. Equazione del secondo grado. Equazioni e sistemi di equazioni riducibili al secondo grado. Problemi del secondo grado. Progressioni. Definizioni riguardanti i limiti e la continuità. Studio di qualche funzione semplice.

$$\left[ax + b, ax^2 + bx + c, \frac{ax + b}{a'x + b'}, x + \frac{m}{x}, \frac{1}{ax^2 + bx + c}, \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'} \right]$$

Studio della funzione esponenziale. Studio della funzione logaritmica, del numero e . Funzioni circolari (è un bellissimo trattato di goniometria). Definizioni e teoremi generali sulle derivate. Calcolo delle derivate. Applicazioni (Studio della funzione

$y = A(x-a)(x-b)\dots(x-l)$, si ritorna sulla funzione $\frac{ax + byc}{a'x + b'y + c}$, sviluppo in serie della funzione esponenziale, logaritmica, di $\text{arctg } x$, studio di $y = x^x$ $v = \frac{a^x}{x^n}$).

Credo che il libro meriti l'attenzione dei signori Professori delle nostre Scuole Secondarie; indubbiamente poi i giovani studiosi di queste scuole che avessero intenzione di dedicarsi agli studi matematici si avvantaggerebbero non poco collo studio di questo trattato.

Dott. G. CANDIDO.

IL 1° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI MATEMATICHE A ZURIGO

9-11 Agosto 1897

Il 1° congresso internazionale di matematiche tenuto a Zurigo nello scorso Agosto è riuscito veramente degno degli egregi scienziati che lo organizzarono e della nazione che accolse, ospiti graditi, i più illustri matematici d'Europa.

Fra questi notiamo: *Brioschi* (Milano), *G. Cantor* (Halle), *M. Cantor* (Heidelberg), *Klein* (Göttingen), *Lindelöf* (Helsingfors), *Mittag-Leffler* (Stockholm), *Peano* (Torino), *Picard* (Parigi), *Weber* (Strassburg), *Weingarten* (Berlino) etc.

Anche il sesso gentile era degnamente rappresentato al congresso, poichè fra i congressisti si notavano ben 30 signore.

Il 9 Agosto il presidente del comitato promotore, sig. *Geiser* (Zurigo) tenne, in un'aula della scuola politecnica, il discorso inaugurale e dichiarò aperto il 1° congresso matematico.

Fu nominato il comitato definitivo come segue: *Geiser* (Zurigo) Presidente, *Franel* e *Rudio* (Zurigo) segretari generali;

Borel (Parigi), *Pierpont* (New-Haven), *Volterra* (Torino), *Weber* (Monaco) segretari;

Membri: *Brioschi* (Milano), *Bugaiëff* (Mosca), *Hobson* (Cambridge), *Klein* (Göttingen), *Mertens* (Vienna), *Mittag-Leffler* (Stoccolma), *Picard* e *Poincaré* (Parigi), *H. Weber* (Strasburgo).

Il Presidente scusò l'assenza del *Poincaré* che non poté intervenire per un lutto in famiglia, ma che però inviò una memoria " *Sui rapporti de l'analisi e de la fisica matematica.*

Le decisioni prese nell'adunanza generale furono le seguenti:

I. Per l'avvenire i congressi internazionali di matematiche si succederanno a intervalli di 3 a 5 anni. Sarà tenuto conto nella scelta delle sedi dei legittimi desideri dei differenti paesi.

II. Si sceglierà alla fine di ogni congresso la data e la sede del prossimo congresso come pure gli organi e le associazioni incaricate di prepararlo e di organizzarlo.

III. Se in seguito a casi imprevisi un congresso non potrà esser tenuto nel giorno e nel luogo fissato, il comitato dell'ultimo congresso dovrà prendere le disposizioni necessarie per la convocazione di un nuovo congresso. A questo scopo il comitato si accorderà con gli organi e le associazioni di cui al n. II.

IV. Ogni congresso può, quand'esso lo creda utile, per lo studio di certe questioni di natura internazionale, nominare delle commissioni permanenti, per le quali il mandato dura dall'uno all'altro congresso.

V. Il prossimo congresso sarà tenuto a Parigi nel 1900. La società matematica di Francia è incaricata della sua preparazione e organizzazione.

VI. L'ufficio del congresso di Zurigo è costituito in commissione permanente, in esecuzione della decisione IV per istudiare le questioni che giudicherà più importanti fra quelle che sono menzionate nel rapporto del comitato preparatorio o che potranno essergli sommesse. Esso potrà aggiungervi dei nuovi membri, e fornirà alla società matematica di Francia tutte le indicazioni utili per la preparazione del congresso del 1900.

Nella 2ª seduta si formarono le seguenti sezioni:

I. Aritmetica e Algebra. II. Analisi e teoria delle funzioni. III. Geometria. IV. Meccanica e Fisica matematica. V. Storia e Bibliografia.

I lavori letti nelle diverse sezioni furono i seguenti:

1ª SEZIONE.

- H. WEBER. Über die Genera in algebraischen Zahlkörpern.
 C. REUSCHLE. Konstituententheorie eine neue, prinzipielle und genetische Methode zur Invariantentheorie.
 C. STEPHANOS. Sur les systèmes associatifs des nombres symboliques.
 P. GORDAN. Resultante ternärer Formen.
 F. ENRIQUES. Sur les problèmes qui se rapportent aux résolutions des équations algébriques renfermant plusieurs inconnues.
 E. SCHRÖDER. On Pasigraphy its presents state and the passigraphic movement in Italy.
 G. RADOS. Zur Theorie der adjungirten quadratischen Formen.
 H. TARRY. 1° Généralisation du problème des reines. 2° Procédés mécaniques pour résoudre les équations indéterminées.
 A. VASSILIEF. Über einige asymptotische Werte.

2ª SEZIONE.

- F. BRIOSCHI. Sur une classe d'équations du cinquième degré résolubles algébriquement et la transformations du onzième ordre des fonctions elliptiques.
 E. PICARD. Sur les fonctions de plusieurs variables et en particuliers des fonctions algébriques.
 Z. DE GALDEANO. L'unifications des concepts dans la science mathématique.
 BUGAIEFF. Les mathématiques et la conception du monde au point de vue de la philosophie scientifique.

3ª SEZIONE.

- REYE. Neue Eigenschaften des Strahlenkomplexes zweiten Grades.
 GERBALDI. La configurazione del gruppo semplice di 360 collineazioni piane.
 BURALI. Les postulats pour la géométrie d'Euclide et de Lobatschewsky.
 ANDRADE. La statique non euclidienne et diverses formes mécanique du postulat d'Euclide.
 FANO. Über Gruppen insbesondere kontinuierliche Gruppen von Cremona — Transformationen der Ebene und des Raumes.

4ª SEZIONE.

- STODOLA. Die Beziehungen der Technik zur Mathematik.
 JOUKOWSKI. Über einen gyroskopischen Apparat.

5ª SEZIONE.

- H. G. ZEUTHEN. Isaac Barrow et la méthode inverse des tangentes.
 G. ENESTRÖM. Über die neusten mathematisch-bibliographischen Unternehmungen.

ASSOCIAZIONE « MATHESIS »

Il num. 1 dell'anno II del Bollettino di detta associazione, oltre alle consuete bibliografie e riviste di pubblicazioni, contiene una nota del prof. Certo sull'equivalenza e il Verbale dell'adunanza del Comitato Direttivo. In questa adunanza insieme ad altre cose furono proposte allo studio dei professori (soci o no) le seguenti questioni:

Questione VIII. — Dato che lo studio dell'aritmetica razionale debba assegnarsi parte al Ginnasio e parte al Liceo, o parte al 1° biennio e parte al 2° di Istituto Tecnico, fissare come debba essere distribuito il programma di detta disciplina.

Questione IX. — Dato che debba modificarsi il programma di geometria assegnato al Ginnasio, stabilire i limiti dell'insegnamento di questa materia nel Ginnasio, perchè dia in esso buoni frutti, e prepari allo studio della geometria nel Liceo.

Questione X. — Dato che debba lasciarsi agli insegnanti libera scelta fra il metodo della fusione e quello della separazione della geometria piana e solida, formulare programmi secondo i quali tale scelta sia possibile.

Questione XI. — Se, ed in quali scuole secondarie, convenga trattare la teoria delle proporzioni per un qualunque sistema di grandezze di 1°, 2° e 3° genere senza altra nozione numerica che quella dei numeri naturali (in modo che la detta teoria resti anche stabilita, in particolare, pel sistema dei numeri reali assoluti); ovvero se sia preferibile, premessa la teoria dei numeri reali assoluti e sviluppata la teoria delle proporzioni per essi, dedurre, mediante la teoria della misura, la teoria delle proporzioni anche per ciascuno dei citati sistemi di grandezze.

Questione XII. — In quali scuole secondarie conviene procedere allo studio delle varie specie di numeri in questo ordine: numeri interi assoluti, numeri razionali assoluti, numeri reali assoluti, numeri reali relativi.

Questione XIII. — Si indichino tutti gli enti della matematica elementare per i quali si usa dai vari autori, e talora con qualche ambiguità, più di un vocabolo (per es., rombo, romboide; cerchio, circolo, circonferenza; raggio, semiretta, direzione; semipiano, falda; quoto, quoziente, ecc.): e si proponga per ciascuno di essi il vocabolo da adottarsi definitivamente.

Questione XIV. — Sulle modificazioni da introdursi nell'ordinamento degli studi matematici universitari, affine d'ottenere buoni insegnanti secondari.

Il num. 2 contiene le relazioni sulle questioni I e IV proposte l'anno scorso dal Comitato e riprodotte nella copertina del n. 1° 1897 di questo Periodico, una bibliografia di pubblicazioni tedesche recenti, una replica del prof. Giudice all'articolo sull'equivalenza del prof. Certo, un riassunto di un articolo del prof. Pontain sul modo di insegnare la matematica, e un'osservazione del prof. Burali-Forti sui programmi delle scuole complementari. Nelle notizie varie si trova il rendiconto dell'adunanza di una società tedesca assai analoga a Mathesis.

CORRISPONDENZA

Nel N° precedente di questo periodico è stato pubblicato un saggio di quanto ha fatto l'associazione *Mathesis* nel corso dell'anno 1897. Fra le cose pubblicate nel Bollettino dell'Associazione fu riportata anche una definizione di equivalenza proposta dal Prof. Bettazzi che dichiarammo di non potere approvare " poichè " ci sembrava della stessa natura di quest'altra evidentemente *assurda*. Si chiama " parallelogrammo un quadrangolo che ha ogni lato parallelo al suo opposto, oppure che ha ogni lato eguale al suo opposto, oppure ecc. "

Questa osservazione ci ha procurato una risposta del Prof. Bettazzi, che non accetta la parola *assurda* applicata alla definizione sopra citata. Posso convenire che, in quella definizione non esistendo contraddizione, la parola *assurda* non era forse la più propria ad esprimere il mio pensiero; ma, tolto questo, non posso che confermare il mio giudizio.

G. LAZZERI.

GIULIO LAZZERI — Direttore responsabile

Finito di stampare il 18 Dicembre 1897.

FRANCESCO BRIOSCHI

Straordinaria versalità d'ingegno, singolare potenza di assimilazione rapida e profonda, instancabile tenacia in ogni ricerca come in ogni intrapresa, tali furono le doti onde rifulse la mente, davvero eccelsa, di Francesco Brioschi.

Nelle scienze matematiche poi, in cui egli raggiunse più presto la gloria, e gloria solida e duratura, recò un'altra preziosissima dote, quella che or si direbbe una impareggiabile virtuosità, cioè una agilità elegante di forma e di pensiero, la quale, se sgomentava gli impazienti ed i meno provetti, formava l'ammirazione dei dotti e degli studiosi di lena.

Allevato alla scuola di Bordoni nel culto, forse un po' troppo esclusivo, dei metodi lagrangiani, entrò poco appresso con Piola nell'ambiente meno rigido delle ricerche fisico-matematiche di Fourier, di Poisson e di Cauchy. Ma, per quanto grande e feconda fosse allora la produzione matematica francese, che era la sola cui attingessero i pochi studiosi d'Italia, egli intuì ben presto la necessità d'allargare la cerchia delle fonti, estendendola alla produzione delle altre nazioni colte d'Europa, massimamente della Germania e dell'Inghilterra. Fra noi egli fu indubbiamente il primo a mettersi risolutamente per questa via, e ad indirizzarvi quanti allievi e studiosi potè attirare con sè in quest'opera, che può ben dirsi di risanamento, giacchè soltanto per essa cessò quel tale ristagno che da lungo tempo pesava sulla scienza italiana, e incominciò quel sempre più attivo e fecondo ricambio intellettuale colla scienza e cogli scienziati di fuori, che fu certamente favorito e promosso dalla fortunata ricostituzione dell'unità nazionale, ma che sarebbe ingiustizia non revocare a lui, per ciò che spetta alle sue prime origini, ben più modeste, ma ben più laboriose.

È incredibile la quantità di lavori che il Brioschi seppe comporre e produrre in luce, nei più svariati indirizzi, non appena si fu rapidamente orientato nel vastissimo campo delle ricerche che occupavano, alla metà di questo secolo, i più valorosi matematici d'Europa.

La recente scomparsa del grande Jacobi, col quale il Brioschi aveva tanta affinità di temperamento scientifico, richiamava allora la attenzione sul grande problema delle equazioni dinamiche, e fu questo uno dei primi soggetti a cui egli si rivolse, trattovi anche dalla natura dell'insegnamento che impartiva all'Università di Pavia. Numerosi ed apprezzatissimi sono i suoi lavori, sia sul problema d'integrazione, sia sulle affini teorie delle equazioni a derivate parziali e delle equazioni isoperimetriche. Nè cessò mai, anche a maggior distanza di tempo, di ritornare su quei primi studii con altre geniali pubblicazioni, come, a cagion d'esempio, con quelle relative all'ellissoide fluido di Dirichlet ed al problema dei tre corpi.

Altro argomento di numerose ed interessantissime pubblicazioni è la teoria analitica della superficie, rimessa allora in onore da una celebre Memoria di Gauss, che era passata per lungo tempo inosservata, ma di cui i geometri riconoscevano finalmente la fondamentale importanza. Il Brioschi prese parte grandissima allo svolgimento (divenuto poi sempre più largo e più complesso) di questa teoria, e vi arrecò più d'un contributo essenziale, tra altro col concetto di coordinate curvilinee tangenziali, da lui primamente adombrato in una nota sulla superficie delle onde.

Non volle rimanere estraneo agli studii di pura geometria, il cui decisivo risveglio risale a un dipresso alla medesima epoca, benchè l'indole peculiare del suo ingegno lo chiamasse di preferenza alle ricerche di pura analisi; e fu felicissimo nella trattazione di quelle questioni in cui l'una e l'altra disciplina gareggiano nel raggiungere una stessa meta, del che basterà citare l'esempio fornito dei poligoni di Poncelet.

Ma l'indirizzo in cui il Brioschi si lanciò con vera passione e con istraordinario successo fu quello delle ricerche sulle equazioni algebriche e sui nuovi algoritmi, che si riassumono nell'uso sistematico dei determinanti, degli invarianti, dei covarianti e delle forme algebriche e simboliche. Basterebbe già il libro dei Determinanti, che risale ai primissimi anni della sua carriera scientifica, e che fu tradotto in pressochè tutte le lingue colte, per constatare le eminenti sue doti d'assimilazione e d'invenzione, come il profondo e sicuro possesso d'ogni più disparato dominio dello scibile matematico. Ma sarebbe impossibile analizzare anche sommariamente senza entrare in particolari troppo disformi dall'indole d'un giornale, l'infinita copia di nuove vedute, di nuove proposizioni, di nuovi procedimenti che si trovano disseminati nelle numerosissime memorie di lui sulle indicate teorie, fra le quali basterà menzionare quella Monografia sulle forme binarie, che doveva riassumere gran parte dei suoi studii e che sebbene rimasta incompleta, contiene pur tuttavia un ricco tesoro di materiali preziosi. E, per citare almeno uno dei moltissimi argomenti speciali in cui maggiormente brillarono l'acume e la genialità del

Brioschi, giovi ricordare le sue elegantissime ricerche sulle serie analoghe a quella di Sturm.

Per ciò poi che spetta alla dottrina delle equazioni algebriche, basti il dire che, nella memorabile scoperta della risoluzione dell'equazione di 5° grado, il nome di Brioschi è indissolubilmente legato a quelli di Hermite e di Kronecker, con questo di più, ch'egli non ha poi mai cessato di illustrare con nuove ricerche questo campo così irto di difficoltà, preparando il terreno e partecipando attivamente ad altri non meno cospicui progressi.

Un altro larghissimo campo di studii ai quali, non meno che ai precedenti, il Brioschi si trovò spontaneamente attratto dalle sue peculiari attitudini e preferenze scientifiche, e che del resto si collegava necessariamente ed intimamente coll'ultimo dei dianzi accennati, fu quello delle funzioni trascendenti, inaugurato da Legendre e recato d'un tratto a smisurate altezze dai lavori di Abel, di Jacobi e da quelli, allora recentissimi, di Weierstrass. Qui forse, più che altrove, il Brioschi era destinato a raccogliere una messe oltremodo feconda e rigogliosa, la materia prestandosi mirabilmente a quel suo genio, ormai maturo, di annalista supremamente classico, e già egli era entrato gloriosamente nell'arringo, ispirandosi ai lavori di Weierstrass, quando sopravvenuti gli eventi del 1859, si trovò d'un tratto chiamato a spendere in altro modo le forze esuberanti del suo ingegno. Così si chiuse il periodo eroico della sua operosità scientifica, periodo che durò non più d'un decennio, ma che bastò a circondare per sempre il suo nome d'una aureola di gloria purissima così presso di noi, come presso tutte le culte nazioni, di cui in così breve tempo egli aveva saputo assimilare ed eguagliare la poderosa produzione scientifica.

Se tuttavia, in tutto il tempo successivo, egli non potè mai più consacrare alla scienza pura l'intera somma delle sue smisurate energie intellettuali, neppur cessò mai di tener sempre ed amorosamente fiso in essa lo sguardo, tornando ad ogni tratto, e più d'una volta abbastanza intensamente, al culto di essa, così da aggiungere molto al moltissimo già prodotto, e nulla trascurando di ciò che poteva, direttamente od indirettamente, favorire la diffusione ed il progresso degli alti studii nel nostro paese. In quest'ultimo senso merita principalmente d'esser ricordata l'opera indefessa da lui data nel mantenere in vita dapprima, e nel recare poscia a rigogliosa fioritura quella pubblicazione periodica che s'intitola *Annali di matematica pura ed applicata*, e che da non breve tempo rappresenta degnamente l'Italia fra le congeneri e più apprezzate pubblicazioni d'Europa e d'America. Già fin dal 1858, quando questo periodico sorse in Roma, in continuazione d'un altro più modesto che lo precedette, egli aveva contribuito moltissimo a dargli alimento e notorietà; ma nel 1867, quando la vita ne era divenuta alquanto languida e stentata, egli ne trasportò la sede da Roma a Milano, e ne assunse la direzione, dapprima in-

siemo col collega Cremona, poi, dopo la partenza di questo, da solo. Nei trent'anni trascorsi dopo questo rinnovamento dell'antico periodico romano, ne sono apparsi in luce ben 26 volumi in-4°, ai quali collaborarono tutti i migliori matematici italiani e non pochi fra gli stranieri d'ogni nazione, attivando così anche fra noi quel ricambio d'ospitalità scientifica, che già s'era iniziato altrove, ed al quale il Brioschi aveva già tanto e così ampiamente contribuito coll'esempio e col consiglio.

È inutile dire a lungo dell'opera data, in un senso più universale, a pro della scienza italiana durante la lunga presidenza dell'Accademia dei Lincei. Niuno ignora come primo pensiero del Brioschi sia sempre stato quello di far convergere i maggiori mezzi possibili all'ampliamento delle pubblicazioni accademiche, così da potervi accogliere, come può ora ben dirsi che avvenga, ogni degna manifestazione degli studii nazionali.

Senonchè l'analisi delle varie, per non dire infinite forme sotto cui si estrinsecò l'ardore inestinguibile del Brioschi per tutto ciò che s'attiene agli studii ed agli studiosi del nostro paese, ardore che andò facendosi sempre più largo e comprensivo di ogni sana manifestazione del pensiero scientifico, mentre da un lato condurrebbe troppo lontano e sconfinerebbe dal campo prefisso, riuscirebbe forse dall'altro ad offuscare un cotal poco, specialmente agli occhi di chi non ebbe la ventura di conoscerlo da vicino l'uomo, l'immagine integra e distinta che di lui dobbiamo formarci, e che è bene rimanga scolpita indelebilmente nella storia degli intelletti d'Italia. La quale immagine è quella d'un forte campione della schietta stirpe latina, la cui mente, sovraneamente equilibrata, fu sempre aperta ad ogni più alta aspirazione ideale come ad ogni più intimo bisogno di vertiginosa attività esterna, e che nell'opera sua, di qualunque natura si fosse, recò invariabilmente la benevolenza, la sicurezza, la serenità e, non ultima attrattiva, quell'amabile scioltezza che, nell'esercizio delle discipline e delle cose severe, lascia come spirare un sottile profumo di squisita artisticità.

Ho menzionato per prima la benevolenza fra le nobili caratteristiche dell'azione del Brioschi, e non a caso. Come ben disse l'illustre Ascoli, l'assistenza affettuosa di cui egli ha favorito, con criterii perspicacissimi, un numero sterminato di cultori d'ogni più disparata disciplina, basterebbe alla gloria d'un uomo.

EUGENIO BELTRAMI

Professore all'Università di Roma.

(Dalla "Perseveranza").

SUL CERCHIO DI TAYLOR

NOTA DI GEOMETRIA RECENTE.

1. È noto il seguente


TEOREMA A) — *Proiettando i piedi delle altezze di un triangolo sui lati di questo si hanno sei punti conciclici.*

DEFINIZIONE I. — *Il circolo che passa per questi sei punti è detto circolo di Taylor.*

DEFINIZIONE II. — *L'esagono, che ha per vertici questi stessi punti lo diremo esagono di Taylor.*

Sia il triangolo ABC , H il suo ortocentro, H_a, H_b, H_c i piedi delle sue altezze ed $LMNPQR$ le proiezioni di questi sui lati (v. fig.)

Consideriamo la congiungente i punti R ed N ; questa per la omotetia delle due figure $AH_c H H_b, ARH_a N$ è parallela alla $H_c H_b$; ma questa è antiparallela al lato BC , rispetto all'angolo in A , epperò anche RN è antiparallela al lato BC rispetto all'angolo in A . Analogamente



dicasi delle QN e PM . Di più osserviamo che la RN taglia il lato $H_a H_b$ in V , ed il triangolo $H_c VR$ (essendo $\widehat{VH_c R} = \widehat{VRH_c}$) ha $VH_c = VR$.

Si ha pure $\widehat{VH_a R} = A + B - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - C$, e $\widehat{VRH_a} = \frac{\pi}{2} - C$, epperò $RV = VH_a$, da cui, tenendo conto che $VH_c = RV$, si ha $H_a V = VH_c$.

Osservando che si possono ripetere le analoghe considerazioni per i punti in cui le altre antiparallele tagliano i lati del triangolo ortico, otteniamo il noto

TEOREMA B) — *Congiungendo i punti medi del triangolo ortico di un triangolo, dette congiungenti tagliano i lati del triangolo fondamentale in sei punti che costituiscono l'esagono di Taylor.*

2. Ora osserviamo le tre circonferenze aventi per diametri i lati del triangolo ortico. Relativamente a queste si hanno alcuni teoremi che andiamo ad esporre.

Dalla fig. risulta facilmente che *ciascuna antiparallela è divisa dai centri di due delle notate circonferenze in tre parti che sono rispettivamente i raggi delle tre circonferenze U, V, Z.* In altre parole, poichè ciascuno dei raggi delle tre circonferenze U, V, Z risulta uguale alla metà di un lato del triangolo ortico, possiamo ricavare il seguente

TEOREMA 1°. — *Le antiparallele RN, MQ, PL sono fra loro eguali, ed eguali alla somma dei raggi delle circonferenze U, V, Z (oppure al semiperimetro del triangolo ortico).*

Osservazione. — Considerando il triangolo NRH_a si ricava $\frac{NR}{\sin A} = h_a$ da cui $NR = h_a \sin A$, ed analogamente $MQ = h_b \sin B$, $LP = h_c \sin C$, e per il teorema precedente

$$h_a \sin A = h_b \sin B = h_c \sin C = RN.$$

TEOREMA 2°. — *Gli assi radicali del circolo di Taylor, rispetto ai tre circoli U, V, Z, sono i lati dell'esugono di Taylor, che non sono sui lati del triangolo fondamentale.*

La cosa risulta facilmente dalla semplice ispezione della figura.

TEOREMA 3°. — *Gli assi radicali dei circoli U, V, Z sono le altezze del triangolo ortico del triangolo fondamentale.*

Infatti le circonferenze U, V, Z si tagliano a due a due sui lati del triangolo ortico, ed hanno rispettivamente per diametri i lati di questo; ciò rende evidente il teorema.

TEOREMA 4°. — *Per gli stessi punti in cui i circoli di Taylor dei triangoli BHC, CHA, AHB tagliano i lati di questi, passano le circonferenze U, V, Z.*

Infatti è noto che le antiparallele RN, QM, LR tagliano i lati dei triangoli BHC, CHA, AHB rispettivamente nei loro punti d'intersezione coi circoli di Taylor di questi triangoli; allora basta per esempio dimostrare che l'antiparallela RN è tagliata dal circolo V nel punto in cui questa incontra la $H_c C$; e questo si vede subito, perchè la RV passa per V, l'angolo in H_c è retto, quindi per il punto in cui la $H_c C$ taglia la RV passa anche il circolo V e si può dedurre il teorema.

3. DEFINIZIONE. — *Il triangolo che si ottiene dall'incontro degli assi radicali dei circoli U, T; V, T; Z, T; (con T indichiamo il circolo di Taylor) lo diremo triangolo dei centri radicali.*

Relativamente a questo triangolo si hanno i seguenti teoremi.

TEOREMA 1°. — *Per i vertici del triangolo dei centri radicali passano rispettivamente gli assi radicali dei circoli U, V, Z.*

Infatti consideriamo il vertice A' ; esso è dato dall'intersezione degli assi radicali di V, T ed U, T, evidentemente per A' passerà l'asse radicale di U, V ed analogamente ripetendo per B' , C' , si giunge all'enunciato.

TEOREMA 2°. — *Il centro del circolo circoscritto al triangolo dei centri radicali è l'ortocentro del triangolo ortico del triangolo fondamentale.*

Infatti l'ortocentro del triangolo ortico del triangolo fondamentale è

il centro radicale dei circoli U, V, Z [§ 2, Teor. 3°], ossia il punto d'incontro delle perpendicolari [§ 3, Teor. 1°] abbassate dai vertici del triangolo dei centri radicali sulle antiparallele ai suoi lati. Ricordando allora che « la congiungente il centro del cerchio circoscritto di un triangolo con un vertice, è perpendicolare alla antiparallela al lato opposto, » ed essendo i lati del triangolo ortico antiparalleli ai lati del triangolo dei centri radicali (perchè è noto che i lati PQ, LR, MN dell'esagono di Taylor sono rispettivamente paralleli ai lati del triangolo fondamentale), il teorema resta dimostrato.

TEOREMA 3°. — *Il triangolo dei centri radicali ed il triangolo fondamentale hanno lo stesso punto di Lemoine.*

Il triangolo $A'B'C'$ dei centri radicali ed il triangolo ABC sono omotetici, giacchè sono simili ed hanno i lati paralleli. Indichiamo con K il loro centro di omotetia. Osserviamo per esempio la BB' , essa taglia la QM nel suo punto medio, perchè diagonali entrambe del parallelogrammo $B'QBM$; dunque la BB' è la mediana del lato QM nel triangolo $B'QM$, epperò è simediana del lato $C'A'$ del triangolo $A'B'C'$; lo stesso dicasi della QM considerata come lato del triangolo QBM in relazione col triangolo fondamentale ABC , e poichè la stessa considerazione si può ripetere per le CC', AA' il teorema rimane dimostrato.

TEOREMA 4°. — *La somma dei quadrati delle distanze dei lati dell'esagono di Taylor dal centro di omotetia del triangolo fondamentale e del triangolo dei centri radicali è un minimo.*

Il centro di omotetia, di cui nell'enunciato, è il punto di Lemoine dei triangoli $A'B'C', ABC$ [§ 3, Teor. 5°]. Ricordando allora che la somma dei quadrati delle distanze del punto di Lemoine di un triangolo dai suoi lati è un minimo, si ha subito l'enunciato.

Osservazione. — Le BB', CC', AA' passano anche per i punti U, V, Z , come si vede considerando che ognuno di essi è centro di omotetia, rispettivamente delle coppie di triangoli: $QC'R, MCN$; $NB'P, LBR$; $MA'L, PAQ$. D'altra parte è noto che i punti medi delle QM, PL, RN sono i punti di contatto del cerchio inscritto nel triangolo UVZ ; si viene quindi a concludere:

Le congiungenti di U, V, Z con i punti di contatto del cerchio inscritto nel triangolo U, V, Z sono le simediane del triangolo fondamentale.

Ciò può enunciarsi in maniera più elegante.

TEOREMA. — *Il punto di Gergonne del triangolo mediano (*) di un triangolo ortico, è il punto di Lemoine del triangolo fondamentale.*

LEMMA. — *Se X, Y, Z sono le dis'anse di un punto M qualunque del piano dai vertici di un triangolo in cui trovansi le masse a^n, b^n, c^n la espressione*

$$a^n X^2 + b^n Y^2 + c^n Z^2$$

*è un minimo se il punto M coincide col punto $K^{(n)}$. (**)*

(*) Che ha i vertici nei punti medi di un triangolo.

(**) $K^{(n)}$ è il punto d'incontro delle rette che partendo dai vertici dividono il lato opposto nel rapporto inverso delle potenze n^{ma} dei lati adiacenti.

Si vede intanto facilmente che il baricentro del triangolo ABC nei cui vertici trovansi rispettivamente le masse a^n, b^n, c^n è il punto $K^{(a)}$.

È noto d'altra parte che la somma dei quadrati delle distanze di un punto M dai punti A, A_2, \dots, A_n moltiplicate rispettivamente per le masse m, m_2, \dots, m_n , di cui sono caricati questi punti, è un minimo, quando il punto M coincide col baricentro; epperò il lemma è dimostrato.

Poniamo $e_a = LM, e_b = NP, e_c = QR$, allora risulta facilmente che $A'B' = c + e_c, B'C' = a + e_a, C'A' = b + e_b$.

TEOREMA 6°. — Indicando con $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ le distanze del centro di omotetia dei due triangoli fondamentale e dei centri radicali, dai vertici A, B, C, A', B', C' la espressione

$$a^2 X_1^2 + b^2 X_2^2 + c^2 X_3^2 + (a + e_a)^2 X_4^2 + (b + e_b)^2 X_5^2 + (c + e_c)^2 X_6^2$$

è un minimo.

Il teorema risulta evidente tenendo conto del lemma, e considerando che il centro di omotetia dei due triangoli ABC, A'B'C' è il punto K⁽²⁾ comune [§ 3, Teor. 4°].

Valori di e_a, e_b, e_c . — Si possono facilmente calcolare i valori di e_a, e_b, e_c in funzione degli elementi del triangolo fondamentale.

Infatti si ha che i lati del triangolo ortico sono dati rispettivamente da

$$H_c H_b = \cos A (b \cos B + c \cos C)$$

$$H_b H_c = \cos B (a \cos A + c \cos C)$$

$$H_a H_b = \cos C (b \cos B + a \cos A)$$

e da questi risulta subito

$$e_a = \cos A \cos (B - C) (b \cos B + c \cos C)$$

$$e_b = \cos B \cos (A - C) (a \cos A + c \cos C)$$

$$e_c = \cos C \cos (A - B) (a \cos A + b \cos B).$$

Nota. — Applicando il Lemma, per mezzo di teoremi già noti, si hanno le seguenti proposizioni:

1°. Indicando con m'_a, m'_b, m'_c le distanze del baricentro di un triangolo da' suoi vertici, l'espressione $m'^2_a + m'^2_b + m'^2_c$ è un minimo.

2°. Indicando con $l'_{1a}, l'_{1b}, l'_{1c}$ le distanze dell'incontro delle bisettrici dai vertici di un triangolo, la espressione $l'^2_{1a} a + b l'^2_{1b} + c l'^2_{1c}$ è un minimo.

3°. Indicando con s'_a, s'_b, s'_c le distanze del punto di Lemoine di un triangolo da' suoi vertici, l'espressione $a^2 s'^2_a + b^2 s'^2_b + c^2 s'^2_c$ è un minimo. (*)

4°. Indicando con $\omega'_{1a}, \omega'_{1b}, \omega'_{1c}$ le distanze del punto Q di Brocard dai vertici A, B, C, di un triangolo la espressione $\frac{\omega'^2_{1a}}{b^2} + \frac{\omega'^2_{1b}}{c^2} + \frac{\omega'^2_{1c}}{a^2}$ è un minimo.

(*) Questa proposizione è stata già enunciata (infin mostrata) da Lemoine. (Vedi M. E. LEMOINE, *Mélanges sur la géométrie du triangle, Congrès de Bordeaux (1895) pour l'avancement des sciences*).

5°. Indicando con $\omega'_{2a}, \omega'_{2b}, \omega'_{2c}$ le distanze del coniugato isogonale del punto Ω (secondo punto di Brocard) dai vertici di un triangolo la espressione $\frac{\omega'^2_{2a}}{c^2} + \frac{\omega'^2_{2b}}{a^2} + \frac{\omega'^2_{2c}}{b^2}$ è un minimo.

Una proposizione analoga al lemma enunciato innanzi si ottiene considerando che i punti $K^{(n)}$ e $K^{(-n)}$ sono coniugati isotomici ed è la seguente:

Indicando con $K^{(-n)}$ il coniugato isotomico del punto $K^{(n)}$ e con μ, θ, ξ le distanze di questo punto dai vertici A, B, C del triangolo carichi di masse rispettivamente a^{-n}, b^{-n}, c^{-n} , la espressione

$$\frac{\mu^2}{a^n} + \frac{\theta^2}{b^n} + \frac{\xi^2}{c^n}$$

è un minimo.

E da questa proposizione ne discendono altre analoghe alle precedenti.

Pisa, gennaio 1898.

Dott. G. CANDIDO.

INTORNO AL CALCOLO APPROSSIMATO DELLE RADICI QUADRATE

Indicando le lettere numeri positivi, sia ω un valore approssimato di \sqrt{D} . Si elevi il binomio $\omega + \sqrt{D}$ a esponente intero e positivo m , e si chiami Q_m il coefficiente di \sqrt{D} e P_m la parte razionale della potenza, così da avere

$$(\omega + \sqrt{D})^m = P_m + Q_m \sqrt{D}.$$

Sarà altresì

$$(\omega - \sqrt{D})^m = P_m - Q_m \sqrt{D}.$$

D'onde

$$(1) \quad \frac{P_m}{Q_m} = \sqrt{D} \cdot \frac{(\omega + \sqrt{D})^m + (\omega - \sqrt{D})^m}{(\omega + \sqrt{D})^m - (\omega - \sqrt{D})^m},$$

o anche

$$\frac{P_m}{Q_m} = \sqrt{D} \frac{1 + \left(\frac{\omega - \sqrt{D}}{\omega + \sqrt{D}}\right)^m}{1 - \left(\frac{\omega - \sqrt{D}}{\omega + \sqrt{D}}\right)^m}.$$

Da questa eguaglianza, per essere il valore assoluto del rapporto

$$\frac{\omega - \sqrt{D}}{\omega + \sqrt{D}}$$

minore dell'unità, s'inferisce che

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{P_m}{Q_m} = \sqrt{D}.$$

Quanto al modo di convergere delle frazioni $\frac{P_m}{Q_m}$ al limite \sqrt{D} , esso è diverso, secondochè ω è un valore di \sqrt{D} approssimato in eccesso, oppure in difetto. Nel primo caso, come apparisce dalla (1), le $\frac{P_m}{Q_m}$ tendono al limite decrescendo. Nel secondo caso esse tendono al limite decrescendo, se m assume valori dispari, e crescendo se m assume valori pari. Cosicchè nella serie

$$\frac{\omega}{1}, \frac{P_1}{Q_1}, \frac{P_2}{Q_2}, \frac{P_3}{Q_3}, \dots$$

i termini di posto dispari e quelli di posto pari tendono a un comune limite \sqrt{D} , i primi crescendo e i secondi decrescendo, nello stesso modo che le ridotte di una frazione continua. Didatticamente parlando, questo secondo caso è notevole, come esempio elementarissimo di una quantità che tende al limite oscillando intorno ad esso. Ne segue che, applicato nella scuola alla ricerca del valore di una radice quadrata per successive approssimazioni, permette di valutare ad ogni istante l'errore, mediante la differenza tra due valori approssimati consecutivi.

Debbasi per esempio calcolare $\sqrt{19}$, di cui un valore approssimato in difetto è 4. Moltiplicando $4 + \sqrt{19}$ per $4 + \sqrt{19}$, si avrà

$$(4 + \sqrt{19})(4 + \sqrt{19}) = 35 + 8\sqrt{19}.$$

Un secondo valore di $\sqrt{19}$, approssimato in eccesso, sarà dunque $\frac{35}{8}$. Si moltiplichino ora $35 + 8\sqrt{19}$ per $4 + \sqrt{19}$, e si avrà

$$(35 + 8\sqrt{19})(4 + \sqrt{19}) = 292 + 67\sqrt{19}.$$

D'onde $\frac{292}{67}$, valore di $\sqrt{19}$ approssimato in difetto. Così continuando, si otterranno i seguenti valori di $\sqrt{19}$, alternativamente approssimati in difetto e in eccesso:

$$\frac{4}{1}, \frac{35}{8}, \frac{292}{67}, \frac{2441}{560}, \frac{20404}{4681}, \text{ ecc.}$$

Se si pone

$$\sqrt{19} = \frac{2441}{560},$$

si commette un errore minore di

$$\frac{2441}{560} - \frac{20404}{4681} = \frac{81}{560 \cdot 4681}.$$

Si noti che, mentre nel calcolo di \sqrt{D} mediante le frazioni continue, per conoscere una ridotta, è necessario passare per i valori di tutte le ridotte precedenti, nel nostro caso ciò non occorre. Debbasi per esempio calcolare $\sqrt{3}$, di cui un valore approssimato in difetto è 1. Basterà fare

il quadrato di $1 + \sqrt{3}$, poi il quadrato del quadrato, quindi il quadrato del nuovo quadrato e via dicendo. Si otterrà successivamente

$$2 + \sqrt{3} \text{ (*)} \quad 7 + 4\sqrt{3} \quad 97 + 56\sqrt{3} \quad 18817 + 10864\sqrt{3} \text{ ecc.}$$

La frazione $\frac{18817}{10864}$

sarà dunque un valore di $\sqrt{3}$ approssimato in eccesso. Ora si domandi l'errore, si moltiplicherà $1817 + 10864\sqrt{3}$ per $1 + \sqrt{3}$ a fine di ottenere la frazione susseguente, approssimata in difetto, che è

$$\frac{51409}{29681}$$

E poichè $\frac{18817}{10864} - \frac{51409}{29681} = \frac{1}{10864 \cdot 29681}$,

si avrà

$$\sqrt{3} = \frac{18817}{10864} \text{ a meno di } \frac{1}{10864 \cdot 29681}$$

Applicando l'esposto algoritmo al calcolo di $\sqrt{a^2 + k}$, partendo dal valore a , si ottengono le seguenti frazioni, alternativamente approssimate in difetto e in eccesso:

$$\frac{a}{1} \quad \frac{2a^2 + k}{2a} \quad \frac{4a^2 + 3ak}{4a^2 + k} \quad \frac{8a^2 + 8a^2k + k^2}{8a^2 + 4ak} \quad \frac{16a^2 + 20a^2k + 5ak^2}{16a^2 + 12a^2k + k^2} \dots \text{ (**)}$$

Si può notare che la differenza fra due consecutivi di questi valori approssimati di $\sqrt{a^2 + k}$, è una frazione che ha per numeratore una potenza di k .

G. FRATTINI.

SU UNA FORMOLA D'ANALISI COMBINATORIA

Nella teoria dei determinanti si dimostra che il numero dei termini di un determinante d'ordine n è $n!$ Esso è evidentemente anche il numero dei modi secondo i quali in uno scacchiere quadrato di lato n si possono scegliere dei gruppi di caselle talmente che ogni gruppo ne contenga una sola su ogni linea ad una sola su ogni colonna. In questa nota mi propongo di far conoscere un'espressione di un numero più generale del precedente. Dati quattro numeri positivi interi n, m, h, k tali che $h \leq n, k \leq m$, ed uno scacchiere Δ di dimensioni $n \rightarrow$ ed $\downarrow m$,

(*) Invece di $4 + 2\sqrt{3}$, il che non turba il rapporto fra la parte razionale e il coefficiente di $\sqrt{3}$.
 (**) Sono le ridotte della frazione continua che ha per quozienti incompleti

$$a, \frac{2a}{k}, 2a, \frac{2a}{k}, 2a, \dots$$

e, per $k=1$, le note ridotte di $\sqrt{a^2 + 1}$.

mi propongo di trovare un'espressione del numero dei modi secondo i quali si possono scegliere in Δ dei gruppi di caselle, talmente che ogni linea di Δ ne contenga h di quelle di ciascun gruppo, ed ogni colonna ne contenga k . Incidentalmente dimostro anche una notevole proprietà delle potenze intere e positive del simbolo combinatorio $\binom{m}{k}$.

Si indichi con X_{hk} uno qualunque dei gruppi suddetti e con $(n, h; m, k)$ il loro numero. Se esiste almeno un X_{hk} , le dimensioni di Δ devono essere proporzionali ad h e k . Infatti il numero degli elementi appartenenti ad un X_{hk} si può esprimere con uno dei prodotti nh ed mk , che sono uguali soltanto quando $\frac{n}{m} = \frac{h}{k}$, il che appunto supporremo. Il simbolo $(n, h; m, k)$ soddisfa alla relazione

$$(n, h; m, k) = (n, n - h; m, m - k),$$

che si dimostra osservando che le caselle di Δ non appartenenti ad un X_{hk} appartengono ad un $X_{n-h, m-k}$ e viceversa. Supposto $h = n, k = m$ e ricorrendo alla relazione suddetta, si dà significato al simbolo $(n, 0; m, 0)$, ponendo

$$(n, 0; m, 0) = 1.$$

Consideriamo uno dei gruppi X_{hk} . Esso contiene k caselle sulla 1^a colonna di Δ poste su k linee. Delle caselle del gruppo che sono sulla 2^a colonna ve ne sarà un certo numero r_{21} , al più uguale a k , poste su r_{21} delle k linee di Δ suddette, e le rimanenti $k - r_{21}$ saranno su altre $k - r_{21}$ linee di Δ . Sicchè ponendo $r_{21} = k; r_{23} = m - k; r_{24} = k - r_{22}$, risulta che si possono scegliere k caselle sulla 1^a colonna di Δ e k sulla 2^a, talmente che l'insieme delle $2k$ caselle scelte possa far parte di un qualche gruppo X_{hk} , in $\binom{m}{k} \sum_{r_{21}=0}^{r_{21}=k} \binom{r_{21}}{r_{22}} \binom{r_{23}}{r_{24}}$ modi differenti. Consideriamone uno soltanto.

Noi abbiamo in Δ r_{21} linee ognuna delle quali contiene una delle caselle scelte nella 1^a colonna ed una di quelle scelte nella 2^a; poi altre $2(k - r_{21})$ linee contenenti ciascuna una delle caselle scelte nella 1^a o 2^a colonna; infine $m - 2k + r_{21}$ linee non contenenti alcuna delle caselle scelte. Possiamo associare queste caselle con k caselle della 3^a colonna di Δ , in modo da avere un insieme di $3k$ caselle appartenenti ad un qualche gruppo X_{hk} , prendendone su di essa un certo numero $r_{32} \leq r_{21}$ posta su r_{32} delle r_{21} linee di Δ suddette; poi un certo numero $r_{34} \leq 2(k - r_{21})$ posta su r_{34} delle $2(k - r_{21})$ linee di Δ suddette; infine un certo numero $r_{35} = k - r_{32} - r_{34}$ poste su r_{35} della $m - 2k + r_{21}$ linee di Δ rimanenti. Sicchè ponendo $r_{31} = r_{21}; r_{33} = 2(k - r_{21}); r_{35} = m - 2k + r_{21}$, risulta che possiamo scegliere k caselle sulla 1^a colonna di Δ , k sulla 2^a e k sulla 3^a, in modo da avere un insieme di $3k$ caselle appartenenti ad un qualche X_{hk} , in

$$\binom{m}{k} \sum_{r_{22}=0}^{r_{22}=r_{21}} \sum_{r_{33}=0}^{r_{33}=r_{31}} \sum_{r_{31}=0}^{r_{31}=r_{33}} \binom{r_{31}}{r_{22}} \binom{r_{21}}{r_{34}} \binom{r_{31}}{r_{32}} \binom{r_{33}}{r_{34}} \binom{r_{35}}{r_{30}}$$

modi diversi.

Consideriamone un soltanto. Abbiamo in Δ $r_{41} = r_{32}$ linee contenenti ciascuna una casella scelta sulla 1ª colonna di Δ , una scelta sulla 2ª ed una scelta sulla 3ª; poi altre $r_{43} = r_{22} - r_{32} + r_{34}$ linee, ognuna delle quali contiene due caselle scelte su due delle tre prime colonne, una per colonna; poi altre $r_{45} = 3k - 2r_{22} - 2r_{34} - r_{32}$ linee contenenti ciascuna una delle caselle scelte nella 1ª o 2ª o 3ª colonna, infine $r_{47} = m - 3k + r_{22} + r_{32} + r_{34}$ linee non contenenti alcuna delle caselle scelte. Sul gruppo delle $3k$ caselle scelte si può ragionare come precedentemente su quello di $2k$ e così via. Poniamo ora $r_{11} = m$; $r_{12} = k$ e consideriamo le successioni

$$\begin{matrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & r_{34} & r_{35} & r_{36} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} & r_{44} & r_{45} & r_{46} & r_{47} & r_{48} \end{matrix}$$

Tenuto conto di quanto si è detto, risulta che: 1° l'ultimo numero di ciascuna linea è uguale a k diminuito della somma delle r poste nella stessa linea ed avente il 2° indice pari; 2° ogni r avente il 2° indice dispari è uguale alla differenza tra le r che sono nella linea soprastante e nelle due colonne precedenti, aumentata della r posta nella linea soprastante e nella colonna seguente. Continuando il ragionamento fino qui fatto, si conclude ovviamente che, se date le successioni

$$\begin{matrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{h1} & r_{h2} & \dots & \dots & \dots & \dots & r_{h, 2h-1} \end{matrix}$$

si pone

$$(1) \left. \begin{matrix} r_{11} = m \\ r_{12} = k \\ r_{s, 2s+1} = r_{s-1, 2s-1} - r_{s-1, 2s} + r_{s-1, 2s} + r_{s-1, 2s+2} \\ r_{s, 2s} = k - r_{s2} - r_{s4} - \dots - r_{s, 2s-2} \\ r_{sy} = 0 \text{ per } y > 2s \text{ ed } y \leq 0 \end{matrix} \right\} \begin{matrix} s = 0, 1, \dots, s-1 \\ s = 2, 3, \dots, k \end{matrix}$$

e si calcola l'espressione

$$\sigma = \binom{m}{k} \sum_{r_{p, 2i}=0}^{r_{p, 2i}=r_{p, 2i-1}} \prod_{s=2}^{s=h} \binom{r_{s1}}{r_{s2}} \binom{r_{s3}}{r_{s4}} \dots \binom{r_{s, 2s-1}}{r_{s, 2s}} \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, p-1 \\ p = 2, 3, \dots, h \end{matrix}$$

si ha il numero dei gruppi di hk caselle contenenti k caselle su ognuna delle prime h colonne di Δ scelte per modo che il loro insieme possa far parte di qualche X_{hk} . È a notare che un tal numero non è altro che $\binom{m}{k}^h$, giacchè tutti i suddetti gruppi si possono ottenere prendendo in

tutti i modi possibili una delle combinazioni k a k delle caselle della 1^a colonna di Δ , una di quelle della 2^a, . . . una di quelle della h ma.

Perciò, ponendo nella relazione precedente $\sigma = \binom{m}{k}^h$, si ha per $h \geq 2$:

$$\binom{m}{k}^{h-1} = \sum_{r_{p,2i}=0}^{r_{p,2i}=r_{p,2i-1}} \prod_{s=2}^{s=h} \binom{r_{s1}}{r_{s2}} \cdots \binom{r_{s,2s-1}}{r_{s,2s}}; \quad \begin{matrix} i = s, \dots, p-1 \\ p = 2, \dots, h. \end{matrix}$$

Il ragionamento fatto per le prime h verticali di Δ si può continuare per le rimanenti $n-h$. Si conclude allora che il simbolo $(n, h; m, k)$ può mettersi sotto la forma:

$$(2) \quad (n, h; m, k) = \binom{m}{k} \sum_{r_{p,2i}=0}^{r_{p,2i}=r_{p,2i-1}} \prod_{s=2}^{s=n} \binom{r_{s1}}{r_{s2}} \cdots \binom{r_{s,2s-2}}{r_{s,2s}}; \quad \begin{matrix} i=1, 2, \dots, p-1 \\ p=2, \dots, n \end{matrix}$$

ritenendo $r_{h+\lambda, 2} = r_{h+\lambda, 4} = \dots = r_{h+\lambda, 2\lambda} = 0$, quando $s = h + \lambda$, e supponendo le r assoggettate alle condizioni (1), nelle quali però s possa variare da 2 ad n .

Volendo servirsi della (2) per calcolare $(n, h; m, k)$, dati n, h, m, k , è utile saper esprimere prontamente ogni r avente il 2° indice dispari in funzione di m, k e delle r aventi il 2° indice pari. Cambiando nella 3^a delle (1) s in $s-1, s-2, \dots, 2$ e corrispondentemente z in $z-1, z-2, \dots, z-s+2$, indi sommando e riducendo si ha:

$$r_{s, 2z+1} = r_{1, 2z-2s+3} + \sum_{i=1}^{i=s-1} (r_{s-i, 2(z+2-i)} - r_{s-i, 2(z+1-i)}).$$

Escluso il caso $s < z+1$ per il quale è $r_{s, 2z+1} = 0$, si hanno questi tre altri casi: 1° $s > z+2$; 2° $s = z+2$; 3° $s = z+1$.

Il termine $r_{1, 2z-2s+3}$ è nullo, eccetto quando $2z-2s+3 = 1, 2$; perciò esso è nullo nei primi due casi ed è uguale ad $r_{11} = m$ nel 3°.

Tenute poi conto del fatto che $r_{s-i, 2(z+2-i)} = 0$, quando $2(s-i) < 2(z+2-i)$ e quando $z-2-i \leq 0$ e parimenti che $r_{s-i, 2(z+1-i)} = 0$ quando $2(s-i) < 2(z+1-i)$ e quando $z-1-i \leq 0$, si trovano le formole seguenti:

$$r_{s, 2z+1} = r_{s-s-1, 3} + \sum_{i=1}^{i=s} (r_{s-i, 2(z+2-i)} - r_{s-i, 2(z+1-i)}) \quad \text{se } s > z+2$$

$$r_{s, 2z+1} = k(s-1) - 2r_{22} - \sum_{i=1}^{i=s-1} \left(2r_{s+2-i, 2(z+1-i)} + \sum_{j=1}^{j=s-i} r_{z+2-i, 2j} \right) \quad \text{se } s = z+2$$

$$r_{s, 2z+1} = m - k(s-1) + \sum_{i=1}^{i=s-1} \sum_{j=1}^{j=s-i} r_{z+1-i, 2j} \quad \text{se } s = z+1$$

Dalla definizione del simbolo $(n, h; m, k)$ risulta ch'esso non cambia di valore scambiando n con m ed h con k . Perciò di tale proprietà deve godere anche il 2° membro della (2).

Naturalmente volendola verificare bisogna supporre che anche nelle (1) siansi fatti i suddetti cambiamenti.

Chiedo osservando che i gruppi X_{hk} sono suscettibili di essere rappresentati mediante successioni di elementi, e ciò nel seguente modo. Siano $\alpha_{1,1} \alpha_{1,2} \dots \alpha_{1,k}; \dots; \alpha_{n,1} \alpha_{n,2} \dots \alpha_{n,k}$, n delle combinazioni k a k degli indici $1, 2, \dots, m$, scelto per modo che soltanto h di esse contengano lo stesso indice.

Disponiamole l'una di seguito all'altra in un ordine qualunque, ed affinché resti traccia del posto occupato da ciascuna combinazione, apponiamo agli elementi di quella che occupa il posto i^{mo} l'indice superiore i .

Avremo una successione d'indici del tipo

$$\alpha_{s_1,1}^{(1)} \alpha_{s_1,2}^{(1)} \dots \alpha_{s_1,k}^{(1)} \alpha_{s_2,1}^{(2)} \alpha_{s_2,2}^{(2)} \dots \alpha_{s_2,k}^{(2)} \dots \alpha_{s_n,1}^{(n)} \alpha_{s_n,2}^{(n)} \dots \alpha_{s_n,k}^{(n)},$$

che diremo β . A ciascuna α di β facciamo corrispondere una casella di Δ e precisamente ad $\alpha_{s_i,j}^{(i)}$ la casella posta nella linea $(\alpha_{s_i,j})^{\text{ma}}$ e nella colonna i^{ma} , ossia la colonna indicata dall'indice superiore. È allora chiaro che ad ogni successione β corrisponde un X_{hk} e viceversa, perciò $(n, h; m, k)$ è anche il numero delle β . Notiamo che una β non cambia, o per meglio dire continua sempre a rappresentare lo stesso X_{hk} , comunque si cambi l'ordine delle α in essa contenute, purchè ogni α si ritenga invariabilmente collegata al suo indice superiore. Al contrario da una β rappresentante un dato X_{hk} se ne può avere una rappresentante un X_{hk} diverso dal primo tenendo fissi gli indici superiori e scambiando opportunamente le α munite dei soli indici superiori. Un'operazione a ciò sufficiente sarebbe ad esempio una successione di sostituzioni della forma

$$\begin{pmatrix} \alpha_{s_1} \theta_1 & \alpha_{s_1} \theta_2 & \dots & \alpha_{s_1} \theta_r \\ \alpha_{s_j} \theta_1 & \alpha_{s_j} \theta_2 & \dots & \alpha_{s_j} \theta_r \end{pmatrix},$$

ritenendo ogni α_{s_i} del numeratore diversa da ogni α_{s_j} anche non appartenente al denominatore, ed ogni α_{s_j} del denominatore diversa da ogni α_{s_i} anche non appartenente al numeratore.

Dr. NICOLÒ TRAVERSO.

SULLE QUESTIONI 293, 325

La proposizione contenuta nella quistione 293, da me stesso proposta in questo *Periodico*, e della quale una dimostrazione è apparsa nel 1° fascicolo del corrente anno, può essere dedotta come conseguenza delle equazioni (1), (3), di cui si parla nella quistione 325, allorchè queste equazioni vengano convenientemente interpretate.

In fatti, si assumano $OA \equiv x$, $OB \equiv y$, $OC \equiv z$, come una terna di assi coordinate ortogonali, e, rispetto ad essi, si dicano (ξ, η, ζ) , (ξ', η', ζ') ordinatamente le coordinate di M, M' . — Si dicano poi u, v, w le coordinate plückeriane del piano $ABC \equiv \pi$, rispetto ad OA, OB, OC .

La equazione (1) della quistione 325 dice che il punto medio di MM' è su π , e le equazioni (3) della stessa quistione dicono che MM' è perpendicolare a π ; dunque, il fatto di essere M, M' simmetrici rispetto a π , è tradotto dalle equazioni

$$\begin{aligned} (1) \quad & u(\xi + \xi') + v(\eta + \eta') + w(\zeta + \zeta') + 2 = 0 \\ (2) \quad & \xi - \xi' = \rho u, \quad \eta - \eta' = \rho v, \quad \zeta - \zeta' = \rho w, \end{aligned}$$

ove ρ è il valore comune dei rapporti eguali

$$(3) \quad \xi - \xi' : u = \eta - \eta' : v = \zeta - \zeta' : w.$$

Dalle equazioni (2) deduciamo

$$\xi^2 - \xi'^2 + \eta^2 - \eta'^2 + \zeta^2 - \zeta'^2 = \rho [u(\xi + \xi') + v(\eta + \eta') + w(\zeta - \zeta')];$$

eperò, in forza della (1), pure

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - (\xi'^2 + \eta'^2 + \zeta'^2) = -2\rho;$$

ovvero $\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2 = -2\rho$, d'onde

$$(4) \quad (\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2)^2 = 4\rho^2.$$

Ora dalle (2), quadrando e sommando, abbiamo anche

$$\overline{MM}^2 = \rho^2 (u^2 + v^2 + w^2);$$

dunque abbiamo in fine

$$\frac{4 \overline{MM}^2}{(\overline{OM}^2 - \overline{OM'}^2)^2} = u^2 + v^2 + w^2 = \frac{1}{\overline{OA}^2} + \frac{1}{\overline{OB}^2} + \frac{1}{\overline{OC}^2},$$

tenuto conto del significato di u, v, w .

Alla risoluzione della quistione 325, da me proposta in questo *Periodico*, e della quale una risoluzione (difettosa nel fatto che non lascia subito vedere in qual modo alla eliminata richiesta si possa dare la forma di determinante prescritta nell'enunciato) è apparsa nel 1° fasc. del corrente anno, si può arrivare in una maniera rapidissima come segue.

Introducendo un conveniente fattore di proporzionalità ρ , le equazioni (3) si possono scrivere così:

$$\xi' - \xi - \rho u = 0, \quad \eta' - \eta - \rho v = 0, \quad \zeta' - \zeta - \rho w = 0;$$

dunque, invece di eliminare ξ', η', ζ' fra le (1), (2), (3) proposte, si possono eliminare ξ, η, ζ, ρ fra le equazioni del sistema

$$\begin{aligned} u\xi' + v\eta' + w\zeta' + 0 \cdot \rho + \Delta + 1 &= 0 \\ u'\xi' + v'\eta' + w'\zeta' + 0 \cdot \rho + 1 &= 0 \\ \xi' + 0 \cdot \eta' + 0 \cdot \zeta' - u\rho - \xi &= 0 \\ 0 \cdot \xi' + \eta' + 0 \cdot \zeta' - v\rho - \eta &= 0 \\ 0 \cdot \xi' + 0 \cdot \eta' + \zeta' - w\rho - \zeta &= 0. \end{aligned}$$

Ora, l'eliminata di questo sistema si ottiene eguagliando a zero il determinante

$$\Omega = \begin{vmatrix} u & v & w & 0 & \Delta + 1 \\ u' & v' & w' & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -u & -\xi \\ 0 & 1 & 0 & -v & -\eta \\ 0 & 0 & 1 & -w & -\zeta \end{vmatrix}.$$

Ma moltiplicando per u, v, w ordinatamente gli elementi della 3ª, 4ª, 5ª orizzontale, e sottraendo i prodotti ottenuti dalla 1ª, si ha

$$\Omega = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \varphi & 2\Delta \\ u' & v' & w' & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -u & -\xi \\ 0 & 1 & 0 & -v & -\eta \\ 0 & 0 & 1 & -w & -\zeta \end{vmatrix};$$

dunque, permutando l'ultima con la penultima verticale, e trasportando la seconda orizzontale dopo la quinta, si ha appunto quanto si era proposto.

N. B. La quistione precedente ha un significato geometrico molto importante. Essa si attacca alla quistione dei punti e delle linee brillanti delle superficie considerate in una metrica euclidea. È da un tal punto di vista che io l'ho incontrata nella mia memoria *Ricerche geometriche diverse etc.*, in corso di stampa negli atti della R. Accademia di Modena, della quale memoria una parte, dell'estensione di 80 pagine, è già da parecchi mesi stampata.

A. DEL RE.

PRO FUSIONE

Relazione sulla questione V proposta nel N. 1 (anno I) del Bollettino dell'Associazione Mathesis " Opportunità della fusione della geometria piana con la solida nell'insegnamento ».

Inviarono risposte scritte relative alla questione V i professori: F. FERRARI (I. T. Alessandria), F. PALATINI (I. T. Sondrio), G. RIBONI (I. T. Milano), F. SOLA (L. Carmaguola). Il prof. R. BETTAZZI (L. Torino) come risposta alla stessa questione inviò due suoi articoli pubblicati nei fascicoli IV e V del vol. VI del *Periodico di Matematica*.

Come il lettore vede, la questione V ebbe scarsissime risposte. Dovremo concludere per questo che la questione non abbia destato interesse fra i nostri colleghi? Preferiamo credere che la maggior parte di essi abbia pensato: « *La questione, ormai vecchia, e replicatamente dibattuta e discussa, è così importante che ogni insegnante deve già averla per proprio conto risolta; ciascuno ha dunque preso oramai (per motivi didattici o scientifici, o, più specialmente, soggettivi) una decisione definitiva in proposito; e pertanto sarebbe infruttuoso il ragionarne ancora* ». Anzi fra gli stessi professori che hanno risposto, il RIBONI, dopo di aver detto che non gli era stato concesso di sperimentare in iscuola il metodo della fusione, conchiude appunto: « *Perciò il parlarne a priori, dopo quanto è stato detto pro e contro da chi è assai più di me competente, mi sembra inutile* ». Avremmo tuttavia gradito che ciascuno dei molti nostri colleghi avesse espresso, magari con due sole parole, il proprio parere; ciò, se non altro, avrebbe potuto servire a fare un po' di statistica, a contare cioè e distinguere fra loro i *fusionisti* e i *separatisti*; poichè, è inutile dissimularlo, sul campo della questione V, sono appunto l'uno contro l'altro schierati questi due partiti scientificamente e didatticamente avversi.

Ma passiamo senz'altro a comunicare al lettore il tenore di ciascuna delle poche risposte pervenuteci.

Il prof. BETTAZZI è favorevole alla fusione, così favorevole che in uno degli articoli suddetti scrive: « *Quanto alla fusione della geometria piana con la solida, stimo inutile mostrarne i vantaggi* »; e tanto nello

stesso articolo, che è una recensione degli ottimi *Elementi di Geometria* di LAZZERI e BASSANI — prima edizione (*) —, come nell'altro, che è uno studio sull'insegnamento della Geometria nei Licei, con validissimi argomenti egli domanda che sia resa possibile dai programmi la fusione della geometria piana colla solida in tutte le nostre scuole secondarie, facendo anche osservare i vantaggi che ne risulterebbero pel coordinamento coi programmi delle materie affini.

Il prof. RIBONI, quantunque autore di due pregevoli libri di testo di Geometria, l'uno per le scuole secondarie inferiori e l'altro per le superiori (**), nei quali è praticata la separazione, tuttavia non è contrario alla fusione; difatti nella sua risposta così si esprime: « *Se in un primo insegnamento non mi sembra opportuna la fusione della Planimetria colla Stereometria, ho desiderato di tentarla nell'Istituto per vederne alla prova i risultati, ma dovetti abbandonare l'idea per l'impossibilità di attuarla in quest'Istituto coi corsi suddivisi, tanto più che il Preside ed i colleghi non erano del mio avviso* ».

Il Prof. FERRARI invece scrive: « *Sono partigiano dell'insegnamento separato della geometria piana e solida e questo anche per l'esperienza di 22 anni di insegnamento* ».

Il prof. SOLA si dichiara contrario alla fusione « *a causa del differimento alla 3^a classe di Liceo dello studio delle ragioni delle grandezze e della misura, richiesti in classi anteriori dai programmi di fisica e di cristallografia* ».

Finalmente il prof. PALATINI fa lunghe osservazioni antifusionistiche, che qui raggruppiamo, abbreviandone qualcuna.

1^a. *È certo che vi sono proposizioni di geometria piana la cui dimostrazione mediante considerazioni stereometriche è più semplice delle dimostrazioni fatte senza uscire da concetti di pura planimetria, ma ben inteso delle dimostrazioni fin qui conosciute, giacchè, siccome le vie più semplici sono ordinariamente le più tarde a presentarsi, nulla c'impedisce di ammettere che anche senza uscire dal piano, si possano ottenere dimostrazioni altrettanto semplici.*

2^a. *È pur certo però che tale applicazione della stereometria ha luogo, almeno per quanto si può asserire allo stato attuale delle ricerche di tal genere, in particolare per quelle proposizioni che riguardano proprietà di posizione, le quali nella geometria elementare sono in numero molto ristretto, essendo questa di natura principalmente metrica, e per quanto si desume dagli « *Elementi di Geometria* » del DE PAOLIS, ... si riduce in fondo a qualche rotazione del piano intorno ad un asse (come p. es. per dimostrare che esistono rette perpendicolari), ed a ricavare certi luoghi geometrici piani come casi particolari di luoghi analoghi nello spazio, ... se si faccia astrazione dalla soluzione del problema di costruire un triangolo isoscele che abbia ciascuno dei due angoli eguali doppio dell'altro, ...*

(*) Come nessuno ignora, in questi *Elementi*, pubblicati nel 1891, è stata praticata la fusione, forse, didatticamente almeno, in maniera anche più felice che nell'opera analoga del DE PAOLIS; dei medesimi uscirà quanto prima, con vivo interesse e compiacimento degli studiosi, una nuova edizione; consideriamo tale ristampa ancora come un pratico argomento a favore della fusione.

(**) Bologna, 1892 e 1894; Ed. Zanichelli. Del secondo è ora uscita una nuova edizione (colla data del veniente 1898).

e perciò non è da ammettersi in favore della fusione della geometria elementare piana con la solida la ragione del sussidio che si possa trarre dallo studio di questa per la trattazione di quella.

3^a. Sempre da quanto si desume dal libro del DE PAOLIS, la fusione apparisce più che altro intesa nel senso di alternare gli argomenti di geometria piana con quelli di geometria solida, trattando successivamente quelli che presentano analogie fra loro, le quali però molto facilmente si possono mettere in rilievo quando si tratta la geometria solida, col vantaggio... così di richiamare dimostrazioni già studiate.

4^a. Accettando la fusione, conviene rimandare alla fine del corso tutta la teoria della misura, rinunciando così... per lunghissimo tempo a far esercitare i giovani nel vasto e importantissimo campo delle applicazioni dell'algebra alla geometria.

5^a. Conviene far comprendere agli alunni che i principi sui quali si fonda la planimetria sono sufficienti per se stessi a svolgere senza aiuti esterni tutte le proprietà ad essa inerenti.

6^a. Che si debba procurare di dimostrare ogni proposizione della geometria elementare senza ricorrere a quelle teorie dalle quali essa non dipende necessariamente è principio sostenuto dai fautori stessi della fusione, e l'esempio sopra riferito del DE PAOLIS valga a provarlo. Questo autore stesso si mostra propugnatore di tal principio anche con l'osservazione che fa nella nota XXII, che egli dimostra il teorema fondamentale sulla perpendicolarità fra retta e piano fondandosi soltanto sulle proprietà più semplici degli angoli e dei diedri, senza ricorrere all'eguaglianza dei triangoli. Non capisco perciò come chi è tanto tenero della distinzione fra le proprietà che appartengono alle diverse teorie della planimetria voglia asservire, dirò così, questa alla stereometria. È certo però che i principi si modificano a seconda dei casi e in conformità dei propri intenti; tant'è vero che in contraddizione con quanto abbiamo ora osservato l'autore stesso nella nota XXVII dice: « Riconosciuta la necessità di domandare il postulato delle parallele, è meglio concederlo subito e trarne le principali conseguenze ecc. »

Esaminiamo ora ad una ad una le risposte medesime. Quanto ai due articoli del prof. BETTAZZI, mentre preghiamo i nostri colleghi di rileggerli e discuterli, è debito nostro dichiarare che, nella parte specialmente che si riferisce alla questione V, li approviamo pienamente, e desidereremmo vivamente che fossero letti, segnatamente il secondo, anche da coloro ai quali pare che attualmente sia affidata una radicale riforma dei programmi didattici governativi, in occasione della fusione delle scuole destinate a costituire la futura Scuola secondaria inferiore unica, cioè la Scuola media da tanto tempo desiderata e promessa (*).

(*) Nella Scuola media dovrebbero a parer nostro essere riunite non solo le scuole Ginnasiali o Teoniche, ma anche le così dette Complementari (cioè preparatorie alle Normali); e gli attuali programmi di queste tre scuole dovrebbero, coordinati e riuniti, ma sfrondata del superfluo, costituire il programma della Scuola media. Unico titolo per l'ammissione a questa scuola dovrebbe essere la licenza elementare. La Scuola media dovrebbe essere di quattro anni, con tasse complessivamente uguali alle attuali del Ginnasio, dalle quali si potessero però esentare quegli alunni appartenenti a disagiate famiglie i quali dessero prova non dubbia di eccellenti doti intellettuali. Ben inteso, oltre la Scuola media, vi dovrebbe essere una Scuola popolare, con intendimenti veramente pratici e con inse-

Ed in sostegno delle considerazioni che il prof. BETTAZZI svolge in favore della fusione della Geometria piana con la solida, crediamo opportuno ricordare che il chiarissimo professore di Geometria superiore dell'Ateneo genovese, GINO LORIA, nell'importante suo studio storico e didattico « *Della varia fortuna di Euclide in relazione con i problemi dell'insegnamento geometrico elementare* », (*) dopo aver dimostrata la necessità che l'insegnamento della geometria elementare prepari allo studio della geometria che si espone nelle Università, conclude: « *Ora per raggiungere tale intento, non potendosi pensare ad aggravare i programmi delle scuole secondarie,...* (**) *fa d'uopo riordinare completamente il piano degli elementi. Bisogna anzitutto togliere la vieta separazione della planimetria dalla stereometria, al che non si oppone nessuna seria difficoltà scientifica, nè (come l'esperienza dimostra) didattica, e potrebbe essere generalmente adottato purchè i programmi governativi avessero una elasticità sufficiente* ». E questa elasticità dei programmi governativi, desiderata dal BETTAZZI (1891) e dal LORIA (1893), è stata anche recentemente invocata nelle adunanze, promosse dalla *Associazione Mathesis*, tenute quest'anno a Torino, a Palermo e a Firenze, e presiedute rispettivamente dai professori D'OVIDIO, TORELLI e LAZZERI, facendosi voto dai numerosi convenuti che sia resa possibile ai professori la scelta, nell'insegnamento della Geometria, fra il metodo della separazione e quello della fusione; e lo stesso voto, che manifestamente suona adesione a quest'ultimo metodo, è stato comunicato a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione nel *Memoriale* — Torino, 13 maggio 1897 — presentatogli dal Comitato dell'Associazione medesima. Aggiungiamo che anche reputatissimi autori di libri di testo di Geometria elementare, nei quali la fusione non è ancora adottata, si esprimono tuttavia in modo favorevole alla fusione medesima. Così per es. il prof. GIUDICE, in una nota alla fine della prima edizione della sua *Geometria piana* (Palermo, 1890), non manca di avvertire che lo studio contemporaneo delle Geometrie piana e solida è da ritenersi conveniente, sia per far rilevare subito un gran numero di proposizioni correlative per indirizzare di buon'ora al fecondo importantissimo principio di dualità, sia per poter sviluppar meglio alcune teorie, per es. la similitudine, sia per altre ragioni; e se nella seconda edizione (Brescia, 1897) egli non si è ancora deciso ad adottare la fusione, a noi consta che se ne deve ricercare la causa nei programmi tuttora restrittivi del Ministero della Pubblica Istruzione. (***)

gnamenti di arti e mestieri, totalmente gratuita. La licenza della *Scuola media* dovrebbe essere l'unico titolo di ammissione alle *Scuole secondarie* successive, e cioè al Liceo, all'Istituto Tecnico e alla *Scuola Normale*, le quali, conservando presso a poco gli attuali programmi rispettivi, che dovrebbero però svolgersi in maniera piuttosto intensiva che estensiva, dovrebbero essere portate tutte e tre a quattro anni di studio; e per tutte e tre dovrebbero assegnarsi tasse eguali (corrispondenti alle attuali del Liceo), condonabili anche queste agli alunni di molto ingegno e di insufficienti fortune.

(*) *Periodico di Matematica*, 1893, vol. VIII, pag. 81-113.

(**) Per quanto riguarda la matematica attualmente assegnata agli Istituti Tecnici, con un programma comune per tutte le Sezioni nel 1° biennio e con programmi speciali per le sezioni di Agrimensura e Fisico-matematica nel 2° biennio, crediamo anzi che si debba piuttosto pensare ad alleggerire che non ad aggravare.

(***) Cfr. colla prefazione dei precitati *Elementi* di LAZZERI e BASSANI, pag. XI; ivi è per fatto

Lo stesso prof. GIUDICE nella *Rivista di Matematica*, Torino, 1891, a proposito dei precitati *Elementi* di LAZZERI e BASSANI, esprime il parere che lo studio contemporaneo della Geometria piana e solida *giovvi sia per migliorare o semplificare dimostrazioni o anche intere teorie, sia per scolpire i varii concetti in modo più completo ed esatto nelle menti degli scolari.*

Il prof. TESTI nella prefazione alla sua Geometria elementare (per le Scuole secondarie superiori, Livorno, 1896) scrive: « Sono stato lungamente in dubbio se dovevo separare la geometria piana dalla solida oppur no, e confesso che per opinione mia volentieri avrei abbandonata questa separazione; ma il desiderio di uniformarmi più che è possibile ai programmi vigenti nelle nostre scuole, mi ha deciso a conservarla. (*) Però... non ci sarebbe inconveniente nessuno a far seguire allo studio del primo libro (Le figure piane), quello del terzo (Le figure solide) e passare poi agli altri due (Equivalenza, similitudine e misura delle figure piane, Libro secondo, e solide, Libro quarto): anzi così facendo si avrebbe il vantaggio di avere distinte tutte le proprietà di forma da quelle di grandezza e ravvicinate teorie che hanno tra loro così intimi legami ». Analogamente negli ottimi *Elementi di Geometria* di SANNIA e D'OVIDIO (che per la maggior parte dei meno anziani professori che oggi insegnano matematica nelle Scuole italiane sono stati la pietra angolare sulla quale ciascuno ha fondato le proprie cognizioni geometriche) in una delle prime pagine della sesta edizione (Napoli, 1886) è scritto: « Nulla vieta di alternare i quattro Libri di Stereometria coi quattro di Planimetria, eccetto qualche punto speciale » (**), e nella prefazione alla

notare che già da anni la separazione della geometria piana dalla solida è *soppressa nelle scuole lusesi* (ove l'insegnamento geometrico raggiunge un livello di considerevole altezza, come dice il LOEYER nello scritto precitato).

(*) In altri termini si ripete l'antico motto « *Videò meliora, proboque; deteriora sequor* »; e perchè? Per seguire i programmi. Si facciano invece ancora nuovi libri di testo di geometria in cui la fusione sia coraggiosamente adottata, traendone tutto l'utile didattico-scientifico possibile, e si facciano appunto dai più reputati nostri autori, e specialmente (*quod est in votis*) da quei Maestri medesimi ai quali l'Italia deve già le migliori geometrie elementari nelle quali l'intera Planimetria precede la Stereometria e che sono state scritte (le prime edizioni almeno) quando di qua dall'Alpi di fusione ancora non si parlava, cosicchè la maggior parte degli insegnanti, almeno i più volenterosi, siano disposti ad adottarli; saranno allora i compilatori dei programmi che seguiranno i nuovi testi, e, se non prescriveranno, almeno permetteranno la fusione; poichè non bisogna dimenticare che non pochi programmi si redigono sulla orma, o sull'indice, di qualche testo (non sempre scelto fra i preferibili; si confrontino ad esempio i programmi di geometria per l'ammissione alla Scuola Militare di Modena e il *Trattato di Geometria elementare* di A. AMOT, versione del Novi).

(**) Anche il prof. M. GRAMSCI, quantunque separatista (si vedano i suoi *Elementi di Geometria ad uso delle scuole professionali e tecniche*; Firenze: Vol. I, *Planimetria*, 1896; Vol. II, *Stereometria, ad uso anche della terza classe liceale*, 1897), tuttavia, a pag. 69 del Vol. III della *Rivista di Matematica* (Torino, 1893), scrive: « Non si creda però che combattendo la fusione delle due Geometrie, io voglia tenerle nettamente separate, perocchè penso che sarebbe molto utile l'alternarne convenientemente le parti. E vedrei anzi di buon grado cangiati i programmi ministeriali dei Licei in modo che, dopo i primi quattro libri d'Euclide, si potessero esporre le proprietà di posizione delle rette e dei piani dello spazio; di guisa che i giovani, avanti di accingersi allo studio delle proporzioni, avessero ad un tempo e maggiore cultura matematica e più familiarità colle questioni geometriche ».

Per quanto, piuttosto affermando che provando, fu scritto dallo stesso prof. GRAMSCI contrariamente alla fusione, rimandiamo i lettori agli articoli che egli ed il prof. LAZZERI hanno pubblicato nella già citata *Rivista di Matematica* (1892 fasc. 11°, 1893 fasc. 4°-5° o fasc. 8°, 1894 fasc. 2°), nonchè alla *Prefazione alla seconda edizione del Libro primo degli Elementi di Euclide* (Firenze, 1893), ed alla prefazione al vol. I degli *Elementi di Geometria* sopracitati.

stessa ed. 6^a la *fusione della Geometria piana colla solida* è considerata come uno dei titoli di merito pei quali molto si raccomandano gli *Elementi* del DE PAOLIS. E analogamente ancora nella 6^a edizione degli *Elementi di Geometria* del prof. A. FAIFOFER, alla fine del IV capitolo della Planimetria (la quale consta di quattordici capitoli) si legge: « *A tal punto si può passare alla lettura dei tre primi capitoli della Stereometria* ». Finalmente il chiariss. prof. VERONESE, nei suoi recentissimi *Elementi di Geometria* (Padova, 1897), quantunque per certe ragioni scientifiche ritenga opportuno distinguere nel principio del suo testo non solo la *Planimetria* dalla *Stereometria*, ma anche la *Rettimetria* da entrambe, tuttavia ad un certo punto, per altre ragioni scientifiche, ma specialmente per ragioni didattiche, fonde nella loro esposizione queste tre geometrie; emancipa egli pure (seguendo il DE PAOLIS) la costruzione del pentagono regolare dalle teorie dell'equivalenza e delle proporzioni, e nella prefazione del suo libro scrive: « *Per parte mia ritengo che nel primo insegnamento della Geometria sia di regola più utile procedere dal particolare al generale e dal semplice al composto. Ciò che però riesce senza dubbio utile anche didatticamente è la trattazione simultanea delle teorie speciali (dopo aver premesse le proprietà generali della retta, del piano e dello spazio), cioè le teorie della congruenza e simmetria, dell'equivalenza, delle proporzioni, delle figure simili e della misura; raccogliendo così in un solo capitolo le proprietà della retta, del piano e dello spazio che dipendono dagli stessi principi. In tal modo non solo si consegue nell'insegnamento un notevole risparmio di tempo, ma, ciò che più importa, lo scolaro comprende meglio le relazioni che sussistono fra le figure piane e solide raccolte nello stesso capitolo e s'accorge di leggeri che molte dimostrazioni date per le seconde sono una facile estensione di quelle date per le prime. Con ciò è possibile ovviare all'inconveniente da alcuni lamentato, che cioè, al contrario di quanto avviene nell'Istituto tecnico, nel Liceo non si svolgono alla fine della classe 1^a o in principio della classe 2^a le proposizioni delle figure solide utili ad alcune parti della Fisica e della Cristallografia* ».

Da tutto questo si ricava che la fusione, specialmente se intesa come trattazione contemporanea degli argomenti affini di Planimetria e Stereometria che come sistematico sussidio di questa a quella, non può essere seriamente osteggiata da alcuno; e pertanto affermiamo nuovamente che le idee del prof. BETTAZZI favorevoli alla fusione meritano approvazione pienissima.

Veniamo a quanto dice il prof. RIBONI. Egli pure, come il VERONESE, ritiene che in un primo insegnamento della geometria la fusione non sia opportuna. Giova peraltro osservare che il prof. RIBONI allude qui in particolar modo alle Scuole Tecniche; e conveniamo con lui, poichè crediamo che i giovanetti che le frequentano siano ancora in troppo tenera età per possedere la così detta fantasia geometrica, o intuizione spaziale, in grado sufficiente alle concezioni stereometriche (tanto più che per le misere risorse finanziarie delle scuole medesime, anche la stereometria viene ad essi insegnata, non già come si dovrebbe, e cioè con appositi modelli solidi, ma sulla lavagna, e perciò in prospettiva, senza che essi possano aver già alcuna idea delle proiezioni piane di

una figura non piana). Però nell'Istituto tecnico il prof. RIBONI avrebbe desiderato tentare la fusione; è cosa per noi veramente spiacevole che le circostanze alle quali egli accenna glielo abbiano impedito; poichè siamo certi che anche l'esperimento del prof. RIBONI, nell'importante Istituto tecnico di Milano, sarebbe riuscito favorevole alla fusione, e in questa certezza ne induce non tanto la personale esperienza che della proficua superiorità di tal metodo abbiamo potuto fare nell'Istituto tecnico di Alessandria, quanto piuttosto il sapere che da circa dodici anni il metodo della fusione è adottato con ottimi risultati nella Regia Accademia Navale di Livorno. È inoltre a nostra cognizione che lo stesso metodo è praticato attualmente in diversi Licei ed Istituti tecnici d'Italia, e da per tutto con risultati assai migliori di quelli che solitamente si ricavano coll'antico metodo della separazione, prescritta dai vigenti programmi.

I ventidue anni d'insegnamento separato della geometria piana dalla solida, pei quali il prof. FERRARI si dichiara partigiano del metodo della separazione, diventano ventidue secoli di esperienza generale del metodo medesimo, se pensiamo che la separazione è stata seguita per lo meno da Euclide ad ora; ma neppure questi ventidue secoli potrebbero essere citati come argomento a sostegno del detto metodo; l'equità vorrebbe che il prof. FERRARI facesse altri ventidue anni di insegnamento (e come antichi suoi colleghi glielo auguriamo di cuore) e il mondo matematico altri ventidue secoli di esperienza, adottando invece il metodo della fusione; allora solamente, confrontando i risultati, il nostro buon collega dell'Istituto tecnico di Alessandria e i matematici del secolo XLII potranno citare tali prove a favore dell'uno oppure dell'altro metodo: per ora, se si vuole essere imparziali, l'anzianità di servizio del metodo della separazione non deve essere considerata nè come titolo di preferenza, nè come motivo di collocamento a riposo.

Mentre il prof. BETTAZZI e il VERONESE (brano citato, ultimo periodo) giustamente osservano che la fusione permetterebbe nel Liceo di anticipare cognizioni stereometriche a profitto della Fisica e della Cristallografia, il prof. SOLA invece asserisce precisamente il contrario, e cioè che la fusione sarebbe causa di differimento di altre cognizioni geometriche, proporzioni e misure, richieste nelle classi anteriori dalla Fisica e dalla Cristallografia. È il caso di dire: « *Tot capita, tot sententiae?* » No, poichè la contraddizione non è che apparente, ed infatti lo stesso prof. BETTAZZI, prevenendo fin dal 1891 l'obiezione del professor SOLA, nel secondo dei suoi articoli precitati aveva già scritto: « *Se si pensa allo sconcio notato nella predetta prefazione (della 1^a ed. degli *Elem. di Geom.* di LAZZERI e BASSANI), che cioè i giovani del Liceo arrivano al terzo anno senz'averne nessuna nozione di geometria solida, mentre assai prima il professore di fisica e quello di scienze naturali hanno bisogno di presupporre tali nozioni specialmente nella cosmografia e nella cristallografia, si vede che, adottando nei licei la fusione delle due geometrie col mantenere la divisione dell'insegnamento in tre anni di studio, si scanserebbe il guaio accennato, per cadere forse nell'altro di vedere trattate le teorie delle proporzioni, della similitudine e della misura in terzo corso, mentre oc-*

corrono certamente prima al professore di fisica ». Giova però osservare che la Fisica e la Cristallografia hanno bisogno delle proporzioni, della similitudine e della misura, non soltanto nel piano, ma anche (e precipuamente) nello spazio; la separazione adunque della geometria piana dalla solida, mentre non recherebbe a quelle due scienze i vantaggi che loro porterebbe la fusione, e ai quali accennano i professori LAZZERI e BASSANI, BETTAZZI e VERONESE, non ovierebbe nemmeno agli inconvenienti ora lamentati dal prof. SOLA e già previsti dal BETTAZZI relativamente alla fusione.

È indubitato che il coordinamento dei programmi di materie affini è questione spesso ardua a risolversi; tuttavia nel caso attuale vi si potrebbe acconciamente provvedere esaurendo nelle prime due classi liceali, come già ebbe a proporre il prof. BETTAZZI nello scritto ora citato, l'insegnamento della matematica (considerata come materia di coltura generale e ridotta al puro necessario, purchè sufficiente per l'indispensabile sussidio alle materie affini, da svolgersi, queste, nella 3^a classe, nelle loro parti dipendenti dalla matematica); è naturale poi che adottando questo provvedimento (*) rimarrebbe impregiudicata la questione se si debba svolgere l'intero programma di geometria col metodo della fusione o con quello della separazione, al qual proposito ripetiamo che le disposizioni governative dovrebbero lasciare libera scelta all'insegnante (sia nei primi due anni di Liceo, come nel primo biennio nell'Istituto tecnico), anche perchè all'atto pratico la preferenza che ciascun insegnante è indotto a dare all'uno piuttosto che all'altro metodo deriva ben sovente, come abbiamo accennato in principio, da motivi specialmente soggettivi, sui quali non è possibile discutere.

E veniamo finalmente alle obiezioni che il prof. PALATINI, decisamente separatista, muove contro i fusionisti. Quanto alla 1^a è intanto da osservare che in essa egli non può fare a meno di concedere che vi sono proposizioni planimetriche la cui dimostrazione è più semplice se ci si aiuta con considerazioni stereometriche; e ciò è ben naturale: come molte volte avviene che una cosa si veda meglio se ci si ponga a riguardarla dal di fuori piuttosto che rimanendo e addentrandoci in essa, così può accadere che certe proprietà del piano meglio si chiariscano osservandole in certo qual modo da un punto esterno, cioè da un punto che non sia sul piano, o in altri termini servendosi della geometria solida; e come il famoso *punctum ubi consistam*, situato fuori della Terra, sarebbe bastato ad Archimede per sollevarla (**), così la Stereometria, cioè l'ammettere la esistenza di un punto fuori di un piano, può fornire in certa qual maniera al geometra il punto d'ap-

(*) Che presenta anche altri vantaggi, pel quali rimandiamo il lettore allo stesso articolo del prof. BETTAZZI. Si veda anche lo scritto presente a pag. 64.

(**) La scoperta del principio della leva, comunemente attribuita ad ARCHIMEDE (298 a. G. C.), è certamente anteriore, poichè questo principio si trova già enunciato nel libro sulle *Questioni meccaniche* di ARISTOTELE (384 a. G. C.); « ciò che tanto ERONE come PATTO attribuiscono ad ARCHIMEDE è la dimostrazione di tale principio e il suo ricollegimento a una teoria generale dei centri di gravità ». Si veda in proposito la interessantissima nota del Dott. G. VALLATI: *Del concetto di centro di gravità nella Statica di Archimede* (Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Adunanza del 9 Maggio 1897).

poggio per una dimostrazione relativa a quel piano. E gli esempi, che in geometria proiettiva abbondano (vedi p. es. i teoremi di DESARGUES sui triangoli omologici, dimostrazione BALTZER-CREMONA, e i teoremi di PASCAL e BRIANCHON, dimostrazione FARJON), anche se ci si limita al campo strettamente elementare, non mancano, e sono tutti importanti poichè servono quasi sempre a completare una teoria. Così, per citare ancora una volta l'esempio più noto, la teoria delle antiche sezioni del giro, o, ciò che è poi lo stesso, la costruzione dei poligoni regolari di 3, 4, 5, 6, 10, 15 lati, che una volta non poteva essere esposta interamente se non che dopo la teoria delle proporzioni, ed al più dopo quella dell'equivalenza, le quali, direttamente almeno, non sono collegate coll'argomento, può adesso, col metodo dovuto al DE PAOLIS (ed al quale si sono attenuti non solamente i professori LAZZERI e BASSANI, ma anche il VERONESE), relativo al pentagono ed al decagono, precedere invece entrambe queste teorie, con progresso nell'ordine logico, scientifico e didattico; ed a questo proposito giova notare che nel programma di geometria assegnata alla 1^a classe dell'Istituto tecnico, *quantunque questo programma escluda la fusione*, la teoria dei poligoni regolari precede appunto le teorie della equivalenza e delle proporzioni. Indipendentemente da queste stesse teorie, si può, ricorrendo ad una sfera, dimostrare semplicissimamente il teorema relativo all'uguaglianza delle distanze tangenziali di due cerchi segantesi da uno stesso punto della retta contenente i loro punti d'intersezione; anche quest'esempio dell'efficacia della stereometria riguardo a questioni planimetriche, che altrimenti esigerebbero l'uso di teorie non direttamente collegate coll'argomento, è dovuto al DE PAOLIS; (*) così questo teorema può prendere il suo posto naturale, subito dopo a quello relativo alla uguaglianza dei segmenti condotti da un punto tangenzialmente ad un circolo o ad una sfera. E, per considerare anche un esempio che non è dovuto al DE PAOLIS, si pensi che la divisione di un segmento in parti eguali, che occorre prestissimo, è al solito basata sul teorema « *A segmenti uguali d'una trasversale d'un fascio di rette parallele corrispondono segmenti uguali d'un'altra trasversale qualunque* »; se non altro l'analogia e l'ordine logico vorrebbero che a questo teorema si accompagnasse immediatamente il seguente « *A segmenti uguali di una trasversale di un fascio di rette qualunque corrispondono segmenti uguali d'un'altra trasversale parallela* », tanto più che anche sul secondo potrebbe basarsi la suddetta divisione dei segmenti (anzi, dal punto di vista grafico, meglio sul secondo che sul primo, specialmente se trattasi di piccoli segmenti); ma se non si vuole uscire dal piano, il secondo teorema non si sa dimostrare, e perciò il secondo metodo di divisione non si può esporre (e si noti che gli alunni dell'Istituto Tecnico già lo conoscono dal Disegno lineare), fino a che esplicitamente o implicita-

(*) V. G. FRATTINI: *Una bella osservazione del DE PAOLIS* "Periodico di Matematica 1896". Invece di ricorrere ad una sola sfera (passante pel due cerchi, dopo di averne fatto rotolare uno attorno alla retta che ne contiene i punti di intersezione di tal guisa che la figura cessi di essere piana), si potrebbe, lasciando piana la figura data e schivando il movimento, ricorrere a due sfere uguali (vedi LAZZERI e BASSANI, op. cit., art. 215), ma la dimostrazione riuscirebbe meno semplice.

mente non si sia parlato di rapporti o di proporzioni o almeno dell'equivalenza dei triangoli, e pertanto, fino ad allora, la trattazione della predetta questione rimane incompiuta; cerchiamo al contrario un punto d'appoggio nello spazio (al quale ad ogni modo, anche per proposizioni planimetriche preliminari — data l'ordinaria definizione di uguaglianza — è giuocoforza ricorrere), e anche il secondo teorema sarà subito esponibile, e per farne la dimostrazione basteranno in sostanza *due piani paralleli tagliati da un terzo* (V. pag. 67). A tutti è poi noto l'ingegnoso e semplicissimo procedimento col quale recentemente (26 agosto 1896) il prof. GIUDICE ha mostrato come dalla proposizione « *La sfera è finita* » si possa dedurre « *Il cerchio è finito* » e quindi « *Il segmento è finito* » (postulato d'Archimede), e come conseguentemente la suddetta proposizione possa esser posta a base dell'ordinaria teoria dell'equivalenza (ricavandone come teorema il noto postulato che DE PAOLIS ha formulato sopra una proposizione del DE ZOLT). E finalmente tutti sanno con quanta semplicità ed eleganza col sussidio della geometria solida si venga ad emancipare dalla teoria delle proporzioni la teoria dell'equivalenza (cfr. DE PAOLIS), e da entrambe queste teorie quella degli assi radicali, come può vedersi nell'opera precitata di LAZZERI e BASSANI. Anzi questi due autori, sempre col possente aiuto dello spazio, sono riusciti ad ottenere *senza proporzioni e rapporti* una mirabile trattazione della teoria delle figure omotetiche; cosicchè, basandosi su tale trattazione e dicendo *simili* due figure *se si possono disporre in modo che siano omotetiche* (*), o in altri termini *se una di esse è uguale ad una delle omotetiche all'altra* (**), si potrebbe pervenire al risultato notevole

(*) Questa definizione, basata sull'altra « *Si dice che due figure sono omotetiche se i loro punti si corrispondono in modo che le rette individuate da coppie di punti corrispondenti formano un fascio ed ogni retta individuata da due punti di una figura sia parallela a quella individuata dai loro corrispondenti dell'altra* », può vedersi nella *Geometria piana* di F. GIUDICE (Brescia 1897, p. 282 e 278). Salvo la forma, la stessa definizione di similitudine era già stata data dal GIUDICE nella prima edizione della sua *Geometria piana* (Palermo 1890, pag. 20 e 196) e nella sua *Geometria solida* (Palermo 1891, pag. 64).

(**) Così si esprime il prof. MORENO nei suoi *Elementi di Geometria* (Napoli 1871, pag. 96), adoperando pertanto una maniera di dire che permetterebbe di adottare questa definizione anche a chi, esplicitamente almeno, volesse *schivare l'idea di movimento*. Si noti che nella definizione di figure omotetiche (op. cit., pag. 90) il MORENO, uniformandosi all'uso più comune, introduce il concetto di proporzionalità e rapporto; la definizione di similitudine dovuta al prof. GIUDICE (V. annotazione precedente) non coincide adunque con quella adottata dal MORENO; quest'ultima appartiene, sostanzialmente, a DUBANEL, il quale nella sua opera *Des méthodes dans les sciences de raisonnement* (1867) mise innanzi appunto la nuova definizione « *Due sistemi di punti diconsi simili se è possibile situarli in modo che le congiungenti le coppie di punti omologhi passino per uno stesso punto il quale abbia da due punti corrispondenti qualunque distanza aventi un rapporto costante* », seguita poi anche dal Dr. F. HOEVAR nel 1888 (cfr. lo scritto precitato del LONIA, pag. 87 e 98). La definizione del GIUDICE ha fra gli altri vantaggi anche quello di mettere immediatamente davanti il carattere più intuitivo della similitudine; ed infatti chi fosse anche totalmente digiuno di teorie geometriche, per vedere se sono veramente simili due figure che altri avesse già riscontrato per tali e che tali a lui le dicesse (e converrebbe piuttosto dirgli che *quelle figure si assomigliano, hanno la medesima forma*) si porrebbe a riguardarle da ogni parte, per ogni verso, ma sempre, se sono materiali e spostabili, disponendole, inconsciamente, *in modo che siano omotetiche fra loro* nel senso inteso appunto dal GIUDICE (e da LAZZERI e BASSANI), riferendosi cioè istintivamente ai concetti intuitivi di rette concorrenti e di rette parallele: egli non andrebbe certamente a pensare a proporzioni fra segmenti e all'uguaglianza di rapporti e di angoli. E del resto quando, ad esempio, per esporre ai discenti la dimostrazione di una proposizione relativa alla similitudine di due poligoni, arbitrariamente situa-

di dare una teoria della similitudine indipendentemente da proporzioni e rapporti. Non per nulla, insomma, il prof. A. FAIFOFER, quantunque per ora separatista, esprimendosi ne' suoi *Elementi di Geometria* (Ed. 10^a pag. 38) intorno alla relativa divisione in *piana e solida*, parla di *pretesti* per separare e *ragioni* per unire.

Nella stessa obiezione 1^a il prof. PALATINI osserva però che anche di quelle proposizioni planimetriche, la cui dimostrazione egli concede

bili, li si disegnano sulla lavagna o altrove, non si è soliti forse a tracciarli, appunto perchè riescano simili, in modo che risultino omotetici, anche se all'omotetia in quel momento non si pensa? L'omotetia, giova notarlo, basata sui soli concetti di concorrimiento e parallelismo, ed esponente coll'aiuto della geometria solida indipendentemente dalle proporzioni, viene ad essere in sostanza una teoria più semplice dell'ordinaria teoria della similitudine dei poligoni colle annesse proporzioni fra grandezze, quantunque la prima, dovuta specialmente a CHASLES, sia relativamente recente, e la seconda risalga, se non fino a TALETE, almeno a EUCLIDE, e quantunque i programmi governativi di matematica per gli Istituti tecnici assegnino la prima al terzo corso e alla sola sezione fisico-matematica e la seconda al primo corso e perciò a tutte le sezioni. È tuttora comune, e pur troppo si manifesta anche nella distribuzione della materia dei suddetti programmi e di altri ancora, l'inveterato e nocivo pregiudizio del ritenere tanto più elementare, tanto più facile e tanto più necessaria una teoria, quanto più essa è notoriamente antica, e tanto più elevata, tanto più difficile e tanto più necessaria, quanto più essa è moderna. Così per esempio le non facili nozioni sui numeri irrazionali e sulle operazioni a esse relative costituiscono uno dei primi argomenti del programma di matematica assegnato alla 2^a classe o a tutte le sezioni dell'Istituto tecnico; e si tratta appunto di argomento noto perfino agli antichi: ma conviene peraltro ritenere che questi lo reputassero ben arduo, dappoichè il COMMANDINO (nel suo *Euclide*, Urbino, 1575) lasciò scritto "... narrano i Pitagorici... che colui, il quale prima avrà di palesare la contemplazione delle quantità irrazionali, in mare annegò... dicono ancora, che se per avventura alcuno hauendo appreso qualche cosa delle quantità irrazionali, la pubblicasse, subitamente è mandato nel luogo del profondo, et quivi perpetualmente è tormentato". Le nozioni invece relative alle disposizioni, permutazioni, e combinazioni, così semplici e così utili in tante elementarissime questioni di enumerazione, ma i cui germi risalgono solamente al secolo XVI, sono tuttora considerate nei programmi come una difficile novità e perciò relegate al quarto corso della sola sezione fisico-matematica. Le nozioni sulla divisione armonica delle rette, tramandateci è vero dai Greci (*Nicomaco*, *Apollonio*, ecc.), ma in uno studio elementare indubitatamente necessaria, sono per la 1^a classe e per tutte le sezioni; mentre invece quelle sulle figure simmetriche, dovute specialmente al LEGENDRE, sono per la 3^a classe e per la sola sezione fisico-matematica, quantunque siano assolutamente indispensabili per completare il concetto fondamentale della uguaglianza geometrica. Le sottili teorie aritmetiche dei numeri primi, della divisibilità dei numeri interi e del massimo divisore e minimo multiplo di due o più numeri (vale a dire l'introduzione alla teoria dei numeri), che ben a ragione si possono qui dire accessorie, poichè la loro omissione non sarebbe di ostacolo allo svolgimento dei successivi programmi di *aritmetica generale* o di *algebra*, e che spesso danno luogo a dimostrazioni che l'esperienza ha provato non facili ad essere generalmente bene intese e ritenute, sono assegnate alla 1^a classe, probabilmente esse pure perchè trattate dai Greci (EUCLIDE, I. VII, VIII, IX); la formazione dei coefficienti binomiali, incomparabilmente più semplice, ma avvertita soltanto nel 1534 da STIVEL e per completare la quale ci volle il sommo NEWTON, è naturalmente giudicata nei programmi come cosa ben difficile, e come tale, assegnata alla 4^a classe fisico-matematica, a meno che sia considerata come cosa accessoria, il che non eradiamo, poichè, se l'insegnante non vi si intrattiene fin dalla prima classe, vi è il grave pericolo, comprovato dall'esperienza, di veder scrivere alla lavagna $(a + b)^m = a^m + b^m$, e cose simili, ecc. Ma, poichè ci siamo, chi saprebbe dirci perchè le proporzioni fra grandezze (EUCLIDE, I. V) siano per la 1^a classe o quella fra numeri (EUCLIDE, I. VII) per la 2^a? Perchè il volume del segmento sferico è assegnato alla 2^a classe e quello dello specchio sferico alla 4^a? Il lettore vorrà perdonarci la non breve digressione.

P. S. Durante la stampa dello scritto presente il chiaris. prof. V. RETALI, nostro collega nel Comitato direttivo dell'*Associazione Matthesis*, gentilmente ci fa sapere che la definizione di similitudine che abbiamo riportato al principio di questa annotazione, o che il LORIA (l. c.) attribuisce a DUHAMEL, " fu enunciata prima dall'OLIVIER (1826, G. di GRELLE, vol. I, pag. 247-248) e sviluppata ampiamente dal GRELLE stesso in una memoria letta il 13 Marzo 1828 alla R. Accad. della Scienze di Berlino ».

essere più semplice se si fa uso di considerazioni stereometriche, nulla impedisce di ammettere che si possano trovare nuove dimostrazioni planimetriche altrettanto semplici: si vede però facilmente che tale ammissione, certamente possibile, è peraltro assolutamente inverosimile se si pensa che è già da oltre due millenni che si studiano e si perfezionano tali dimostrazioni planimetriche; all'opposto invece, poichè l'applicazione sistematica e generale della stereometria alla planimetria, specialmente in geometria elementare, data solamente, almeno per quanto è noto, da ben pochi anni, è ragionevole cosa il credere piuttosto che quando tale applicazione diventerà più comune, e sarà generalmente adottata nell'insegnamento, allora si semplificheranno anche maggiormente quelle dimostrazioni nelle quali si fa uso di questa applicazione, e il loro numero crescerà rapidamente, poichè, come già avvertì il DE PAOLIS, *se molti di questi esempi finora non si sono presentati, nella Geometria elementare, è proprio l'antica e costante divisione che ha impedito di scoprirli.*

Che questo numero sia almeno per ora, *molto ristretto*, specialmente perchè la geometria elementare è *di natura principalmente metrica*, è cosa asserita, nella sua obbiezione 2^a, dal prof. PALATINI, il quale pertanto ritiene doversene concludere *che non possa ammettersi in favore della fusione della geometria piana colla solida la ragione del sussidio che si possa trarre dallo studio di questa per la trattazione di quella.* In questo apprezzamento il prof. PALATINI è in pieno accordo col VERONESE, il quale nella prefazione precitata scrive pure « ... *la Geometria euclidea elementare è principalmente di natura metrica, a base della quale sta il concetto dell'eguaglianza.... Nei miei lavori geometrici io sono stato fautore non solo della fusione della geometria dello spazio ordinario con quella del piano, ma eziandio di quella degli spazi superiori con gli inferiori, perchè appunto lo studio delle proprietà proiettive di questi trova per mezzo di quelli la sua più completa e più alta estrinsecazione, tuttavia non posso non riconoscere che la Geometria solida è in questo senso di poco aiuto alla Geometria elementare del piano e della retta, perchè questa, come dissi, è per sua natura metrica* ». Ed in appoggio dell'asserito numero ristretto dei casi in cui si può utilmente applicare la geometria solida alla piana il prof. PALATINI, nella stessa obbiezione 2^a, cita pure in proposito le applicazioni che si possono vedere negli *Elementi* del DE PAOLIS; ma non tutte; infatti il PALATINI ommette di citare in proposito proposizioni importantissime, quali p. es. il postulato della reversibilità dell'angolo (p. 17), il teorema dell'uguaglianza degli angoli opposti al vertice (p. 20), i due teoremi reciproci sul triangolo isoscele (p. 80), i teoremi sui triangoli uguali (da p. 82 a p. 87, vedi specialmente quello del num. 106) e conseguentemente la bisezione del segmento e dell'angolo (p. 95 e 96), l'uguaglianza dei segmenti obliqui condotti da un punto ad una retta ed aventi su questa proiezioni uguali (p. 98), la uguaglianza dei poligoni (p. 118 e 119) e conseguentemente l'equivalenza dei poligoni (da p. 292 a p. 310) e segnatamente i due teoremi reciproci sui triangoli fra loro equiangoli, esposti nella prima parte del numero 362 e per la dimostrazione dei quali il DE PAOLIS

fa nuovamente uso della stessa proposizione *stereometrica* (*) che gli ha servito a costruire il triangolo isoscele con ciascun angolo alla base doppio dell'angolo al vertice indipendentemente dalle teorie dell'equivalenza e delle proporzioni. Ben è vero che, fatta eccezione solamente per questi due ultimi teoremi, in tutte queste proposizioni, come in questa relativa all'esistenza di rette perpendicolari, citata dal PALATINI, in tanto solamente si ricorre allo spazio in quanto che per le dimostrazioni adottate occorre, o può occorrere, di dover scambiare fra loro le due *pagine* di una figura piana; ma, in tutte queste dimostrazioni, allo spazio, sia pure per un semplice movimento in esso di una figura piana, si ricorre. E ciò avviene non solamente nel testo del DE PAOLIS; ciò, più o meno esplicitamente, ma ad ogni modo inevitabilmente per quasi tutte le proposizioni suddette, avviene in tutti i testi, tanto fusionisti che separatisti (nel senso usuale di queste denominazioni), nei quali si espone l'ordinaria geometria euclidea elementare, a base della quale sta il concetto dell'uguaglianza, intesa come sovrapposibilità mediante movimento eseguito se occorre eziandio nello spazio (sia cioè che, per verificare la possibilità di sovrapporre due figure, supposte movibili, di uno stesso piano, supposto immobile, basti spostare una di esse in questo piano, ovvero occorra prima rivoltarla e perciò farla uscire dal piano facendola poi ricadere, così rivoltata, sul piano, eseguendo pertanto un movimento nello spazio, movimento che sarebbe assolutamente vietato, anzi, inconcepibile, per un geometra piano: (**)) poichè bisogna aver presente che anche la Geometria piana di EUCLIDE, come quella del SANNIA e D'OVIDIO, del FAIFOER, del BALTZER, del GIUDICE, del TESTI, del RIBONI, ecc. ecc., non è assolutamente tale nel senso rigorosamente scientifico, dal momento che, seguendo il metodo tradizionale e comune, in essa si fa uso (indispensabile, una volta intesa la uguaglianza nel significato predetto) del concetto di spazio; tale invece è quella esposta nel libro II dei precitati *Elementi* del VERONESE, basati però su una definizione di uguaglianza, diversa da quella fino ad ora universalmente adottata: bisogna insomma che i segnaci della scolastica divisione si convincano che essi pure, se adottano la comune definizione di uguaglianza e se non vogliono rinunciare a buona parte delle proposizioni fondamentali della Geometria piana, (nel senso tradizionale di questa denominazione), sono necessariamente, dal punto di vista scientifico, fusionisti: infatti, data quella definizione, essi, se per evitare per davvero l'abborrita fusione s'imporranno coscientemente l'indispensabile vincolo di non uscire dal piano, non solamente

(*) " Se due triangoli sono prospettivi e due lati dell'uno sono paralleli ai corrispondenti dell'altro, anche i due lati rimanenti sono paralleli ". Questa proposizione, com'è noto, può considerarsi come un caso particolare del teorema di DESARGUES sui triangoli omologici; e non è qui fuor di luogo l'avvertire che " Il teorema dei triangoli omologici, nel piano, ... è un teorema di Geometria solida "; questa notevole osservazione è dovuta al PEANO (*Sui fondamenti della Geometria*, Rivista di Matematica, 1894, p. 73); egli prova il suo asserto col dimostrare che questo teorema è conseguenza del postulato " Dato un piano, si può segnare un punto fuori di esso ", senza del quale la proposizione sui triangoli omologici può non sussistere, pur essendo verificati tutti i postulati precedenti.

(**) Un geometra a due dimensioni non potrebbe almeno rivoltar la frittata! Il lettore voglia permetterci questo scherzo, gastronomicamente efficace.

non potranno neppur parlare delle due *pagine* di un piano, e perciò nemmeno della *reversibilità* di certe figure piane, quali ad esempio il cerchio, il triangolo isoscele, e particolarmente l'angolo, ma non potranno neanche dimostrare p. es. l'esistenza della bisettrice di un angolo, nè quella di rette perpendicolari, nè tampoco l'uguaglianza degli angoli opposti al vertice, a meno che non introducano appositi ed ulteriori postulati, (*) senza dire che essi dovranno necessariamente restringere la teoria delle figure uguali al caso dell'uguaglianza diretta e conseguentemente lasciare incompleta eziandio la teoria dell'equivalenza; e pertanto i geometri separatisti, o superficiali, o piani che dire si debbano, se, rifuggendo dal rinunciare al loro misoneismo, non s'indurranno ad accettare *la novità della fusione*, si troveranno poi costretti, per essere separatisti sul serio, ad accettare il sovraccennato metodo del VERONESE, cioè una *novità* molto maggiore e veramente essenziale (poichè il VERONESE, modificando in conformità dei proprii intenti la definizione di uguaglianza, viene in sostanza a *mutare le ipotesi fondamentali della Geometria ordinaria*); ma nessuna novità è tollerata da coloro « *qui se montrent fort désobligés quand on les invite à réfléchir* » (**).

E ritornando ora all'obiezione 2^a del prof. PALATINI ci sia lecito domandare: Perchè egli, tanto in questa come nella 3^a e 5^a, sia per giudicare della maggiore o minor portata del metodo della fusione, come per investigarne il sostanziale indirizzo nonchè *i principii sostenuti dai fautori stessi della fusione*, si riferisce sempre ed esclusivamente al libro del DE PAOLIS?

Non vi sono forse (per tacer d'altri testi, d'Italia e fuori, nei quali la fusione è praticata) gli ottimi *Elementi* di LAZZERI e BASSANI, ormai

(*) L'ordinaria dimostrazione dell'uguaglianza degli angoli opposti al vertice, basata sulla nozione di *angolo conseguente ad un altro* (l'angolo ω'' si dice conseguente all'angolo ω' se ha rispettivamente per lato-origine e per lato-termini il lato-termini di ω' e la semiretta opposta al lato-origine di ω') e sul teorema " Se α, β, γ sono angoli, e se α è conseguente a β , e β è conseguente a γ , sarà α uguale a γ " (per la cui dimostrazione si ricorre, come è noto, alla *reversibilità dell'angolo*, eseguendo un movimento nello spazio), può essere sostituita da un'altra, per la quale non occorre se non che un movimento nel piano, purchè si ammettano i due seguenti postulati: I. " Se s' e s'' sono due semirette uscenti da un punto P e costituenti una retta s, e se α' e α'' sono due semipiani uscenti dalla retta s e costituenti un piano α , questo può muoversi di tal guisa che, al termine del movimento, P, s' , s'' vengano rispettivamente a coincidere con le situazioni primitive di P, s' , s'' ". II. " Dati tre punti non collineari A, B, C, se il piano ABC si muove di tal guisa che, al termine del movimento, il punto A, la semiretta uscente da A e passante per B, e il semipiano uscente dalla retta AB e passante per C vengano rispettivamente a coincidere con le loro situazioni primitive, altrettanto avverrà per ogni punto del piano ABC "; di qui infatti, coll'aiuto delle note proposizioni " Due punti individuano una retta " e " Se α' e α'' sono due semipiani uscenti da una retta s e costituenti un piano α , e se Q' e Q'' sono due punti (situati entrambi fuori di s) l'uno su α' e l'altro su α'' le due rette s e Q' Q'' avranno un punto a comune ", si deduce che mediante il movimento di cui si parla nel postulato I (che può concepirsi come uno strisciamento di α su se stesso - rotazione piana di α attorno a P di 180° -) ogni punto Q di α vien condotto sulla semiretta opposta alla situazione primitiva della semiretta uscente da P e passante per Q'; per la dimostrazione basta eseguire due volte il movimento suddetto; collo stesso movimento si prova allora immediatamente l'uguaglianza degli angoli opposti al vertice (supposti situati su α). Si veda in proposito la precitata nota *Sui fondamenti della Geometria* del prof. PEARO, la quale non sarà mai abbastanza meditata da chiunque voglia esporre razionalmente i principii della Geometria elementare.

(**) Parole di LAURENT TAILHADE a proposito di certi critici di LASENE; le quali, ben inteso, qui non vogliono riferire se non che a coloro che, deliberatamente e sempre, opponendo una cieca forza d'inerzia intellettuale a qualsiasi novità scientifica o didattica che li obblighi a pensare, non per altro le si dichiarano contrari che per scansare il disturbo di averla a studiare.

giunti in breve tempo, ad una nuova edizione, nei quali la fusione è anche più intima, le applicazioni del nuovo metodo sono più numerose e relative ad intere teorie, e la trattazione apparisce dal punto di vista pratico meglio rispondente in generale alle esigenze didattiche?

Forse che pel prof. PALATINI *Fusione* e *De Paolis* sono tutta una cosa, come già pel GIUSTI *Granduca* e *Tedeschi*? (*)

Come si è visto più sopra, il BETTAZZI, il GIUDICE, il TESTI, il GREMIGNI (V. nota a pag. 53), e il VERONESE specialmente, fanno osservare i vantaggi che derivano dalla trattazione simultanea, o alternazione, degli argomenti analoghi di planimetria e stereometria, sia pel notevole risparmio di tempo che così si consegue, sia per far meglio comprendere allo scolaro le relazioni fra le corrispondenti figure piane e solide, sia per altre ragioni; ma in questo mondo ogni medaglia ha il suo rovescio (anche per i geometri piani, pare impossibile!): infatti nella obbiezione 3^a il prof. PALATINI afferma al contrario che con la separazione si ha il vantaggio, quando si tratta la geometria solida, di richiamare dimostrazioni già studiate in geometria piana, cioè di ripeterle. Ma ciò non è al certo possibile p. es. negli Istituti tecnici, ove l'intero insegnamento della matematica razionale elementare — *Aritmetica, Algebra, Geometria* — deve essere impartito in due anni — 1^o biennio — (**) assolutamente insufficienti per un coscienzioso svolgimento di così vasto programma richiedente esercitazioni numerose, ed ove pertanto non si può certamente far gettito di tempo in ripetizioni, per quanto utilissime (***) .

Quanto alla 4^a obbiezione potremmo osservare che dal lato strettamente scientifico *l'applicazione dell'Algebra alla Geometria* (ben inteso dal punto di vista puramente elementare, e quindi astraendo completamente dalla Geometrica analitica) è piuttosto argomento di *Algebra che di Geometria* (non ostante che solitamente lo si esponga come *Appendice alla seconda*, anziché alla prima), e quindi il ritardo di tale applicazione, portato dalla fusione non è a rigor di termini, da considerarsi come

(*)

* Ma l'uso in oggi alla voce *Tedeschi*
Sposò talmente la voce *Granduca*,
Che *Tedeschi* significa *Granduca*,
E *Granduca* significa *Tedeschi* .

Le poesie di G. Giusti, Firenze. Barbera, 1860, p. 372.

Della scherzevole forma di quest'ultima domanda, relativa al prof. PALATINI, chiediamo a lui venia ed al lettore; non senza ricordare, a nostro discarico, le note parole di BIAGIO PASCAL: "*Les méthodes de géométrie sont si sérieuses d'elles mêmes, qu'il est avantageux qu'il s'offre quelque occasion pour les rendre un peu divertissantes* ."

(**) Nel 1^o biennio degli Istituti tecnici, che, per l'età degli alunni e pel numero degli anni dedicati a studi precedenti, corrisponde ora alle classi 4^a e 5^a ginnasiali, è attualmente prescritto di svolgere (salvo l'omeopatica *trigonometria senza triangoli obliquangoli* ora assegnata alla 3^a classe Liceale) quello stesso programma di matematica che nelle scuole classiche si svolge invece in cinque anni (due di Ginnasio superiore e tre di Liceo) ad alunni generalmente meglio disposti ad apprendere per molteplici ragioni sociologiche (specialmente atavistiche). Si veggia in proposito il precitato *Memoriale a S. E. al Ministro* (p. 68).

(***) Si è invece costretti a fare la massima economia possibile di tempo; e poichè nessuno potrà negare che la fusione arrechi appunto siffatta economia, si ha così, almeno per gli Istituti tecnici, un nuovo argomento didattico a favore della fusione. Soltanto lo stesso punto di vista giova pure negli Istituti tecnici fondere insieme l'insegnamento di una parte dell'aritmetica razionale con quello dell'aritmetica generale, introducendo cioè i numeri negativi appena si parla della sottrazione, ecc.

ragione contraria alla fusione, in sè, la quale è questione di *Geometria* e non di *Algebra*; ma preferiamo far notare, tanto più che l'obbiezione è didattica, che di tale applicazione conviene piuttosto essere parchi nell'insegnamento, se si vuole evitare che gli alunni, sedotti dalla speditezza dei metodi algebrici, che non affaticano il pensiero, attutiscano in breve il loro delicato senso geometrico, abituandosi troppo presto a preferire la comodità di lasciarsi guidare dal calcolo al profittevole cimento contro la difficoltà e sottigliezza delle investigazioni puramente geometriche; il ritardo nell'applicare i procedimenti algebrici alla Geometria è dunque a ritenersi più utile che dannoso; e ad ogni modo poi, negli Istituti tecnici, per gli alunni a cui interessano, tali applicazioni, sulle quali vertono con singolare costanza i temi (*) proposti dal Ministero per l'esame scritto di matematica per i licenziandi della sezione, fisico-matematica, possono essere fatte in seguito, e con miglior profitto, nel 2° biennio; nel Liceo si possono fare nella 3ª classe, sia coi programmi attuali, sia, e allora meglio ancora, adottando la proposta del prof. BETTAZZI, e già riferita in parte a pagina 55, di esaurire cioè nei primi due anni di Liceo l'insegnamento della matematica elementare, ridotta alle sue parti assolutamente indispensabili per tutti gli alunni, riserbandone le parti complementari al terzo anno, per quei soli alunni che fossero destinati alle facoltà scientifiche dell'Università (**).

Come si è veduto più addietro, senza uscire dal piano non è possibile trattare tutta l'ordinaria geometria piana euclidea elementare; nè varrebbe addurre in contrario l'esempio di quanto fa il VERONESE nei suoi *Elementi*, poichè la *Geometria del piano* ivi trattata, nel precitato libro II, cambiate le premesse fondamentali perchè intesa l'uguaglianza in senso nuovo (***), non è più l'ordinaria Geometria piana euclidea ele-

(*) Tolti le più volte, da qualche anno a questa parte, da pubblicazioni francesi.

(**) Ai quali così si potrebbero completare gli insegnamenti propri dei corsi secondari, preparandoli a seguire con frutto le lezioni universitarie: il che non è possibile con l'attuale ordinamento, com'è universale lagnanza. (BETTAZZI, l. c.)

(***) Non solamente nuovo, ma in disaccordo coll'ordinario e perciò col principio che lo stesso VERONESE enuncia nell'*Appendice* ai suoi *Elementi* "didatticamente in un trattato elementare non conviene mutare senza necessità l'uso di parole accettate comunemente da secoli" (p. 25); nè crediamo che la mutazione del tradizionale significato dell'uguaglianza geometrica risponda ad una vera necessità scientifica o, tanto meno, didattica; poichè non sappiamo ancora che la scienza abbia veramente dimostrato che l'ordinaria determinazione del concetto dell'uguaglianza delle figure geometriche sia logicamente errata, e tanto meno riusciamo a vedere che effettivamente sia ormai incontestabile che in essa si riscontri una petizione di principio (cfr. VERONESE: l. c. pag. VII; *Elementi di Geometria* pag. VII; L. CERRO, *Sull'equivalenza*, *Bollettino dell'Associazione Mathesis*, 1897-98, pag. 17): siamo invece convinti che per trattare rigorosamente la geometria metrica, nella quale appunto compare il concetto di figure uguali, non sia affatto necessario mutare l'ordinaria definizione relativa, e chiunque potrà persuadersene leggendo la seconda parte della precitata nota del PEANO (da p. 75 a p. 80). Per convincersi poi che il nuovo senso nel quale il VERONESE intende l'uguaglianza geometrica è in disaccordo coll'ordinario basta pensare a due triedri o angoloidi opposti al vertice, ovvero a due poliedri simmetrici, o a due figure solide qualunque fra loro simmetriche; tali figure non sono in generale sovrapponibili mediante movimento, nel nostro spazio ordinario a tre dimensioni, e perciò non sono uguali nel senso ordinario; invece nel senso adottato dal VERONESE sono uguali. Ma in questa circostanza, e in questo disaccordo specialmente, consiste appunto l'ingegnosità e la seducente genialità di questo modo di vedere del VERONESE, mediante il quale non solamente si evita in certo qual modo un movimento in uno spazio lineare a quattro dimensioni, ma si viene poi ad essere in accordo colla intuizione naturale, la quale (contrariamente all'ordinario concetto geometrico dell'uguaglianza), talora, non volendo, ci fa dire che qualunque corpo è uguale alla propria

mentare (*), a base della quale, giova ripeterlo, sta *la nozione comune di uguaglianza*, cioè l'uguaglianza non altrimenti intesa e non come sovrapposibilità mediante movimento eseguito occorrendo *anche nello spazio*; e perciò, una volta adottato il metodo ordinario, il far comprendere agli alunni, come vorrebbe il prof. PALATINI nella sua obiezione 5^a, che senza aiuti esterni si possono svolgere tutte le proprietà inerenti alla planimetria è assolutamente impossibile

« Per la contraddizione che nol consente ».

Si dovrà dunque *pur di non uscire dal piano* abbandonare il metodo ordinario? Non lo crediamo. D'altra parte, perchè questo *errore dello spazio*? Perchè affaticarsi a compiere questa difficile opera contro natura (poichè lo spazio fisico esiste, e non così il piano) di impedire almeno per un anno che gli alunni pensino lo spazio, di ridurli intellettualmente ad animali piatti, schiacciando sulla tavola nera ogni loro concezione geometrica? (**). Perchè infine condannare il giovane ingegnere a strisciare sul piano, tarpandone le ali, limitandone le forze? (***)

Astrarre dall'inevitabile concetto di spazio è altrettanto difficile sia per guidare il pensiero al di fuori di questo, nei campi ideali dell'*ambiente assoluto*, come per costringerlo nelle angustie di un'unica retta o di un unico piano; curare in ogni caso di evitare locuzioni le quali a tale astrazione perfettamente non corrispondano può riuscire malagevole non solamente ai discenti, ma eziandio ai Maestri. Il pensiero umano,

immagine, ottenuta mediante uno specchio piano. La definizione dovuta al VERONESE ha dunque il vantaggio di *allargare*, per le figure solide e nello spazio ordinario, il concetto di *uguaglianza*, ed anche per le figure piane se ci si impongono il vincolo di non uscire dal piano; ma non per questo è giusto il dire che la definizione antica avesse il difetto di *restringere* tale concetto a quello della congruenza (cfr. colla prefazione dei precitati *Elementi di Geometria* del VERONESE, pag. VII, e colla relativa recensione del prof. BORDIGA, *Periodico di mat.*, 1897, pag. 135); se una nuova convenzione allarga certi confini, ciò non vuol dire che la convenzione primitiva li abbia ristretti. La nuova definizione ha inoltre il vantaggio di ridurre l'uguaglianza di due figure qualunque al concetto più semplice dell'uguaglianza dei segmenti (il quale però, così come è posto nell'opera del VERONESE mediante il relativo postulato II, rimane alquanto vago o indeterminato, poichè nel postulato medesimo non si dà nessun criterio per decidere in ogni caso se dati due segmenti a e b , abbia o non abbia luogo il fatto che si vuol esprimere dicendo " b è uguale ad a "). Per queste e per altre ragioni il metodo del VERONESE e l'intero suo testo, cui la novità di vedute distinguono subito da qualsiasi altro consimile, non possono mancare dall'interessare favorevolmente tutti quegli insegnanti ai quali sta a cuore il progresso scientifico e didattico della geometria elementare: e le stesse difficoltà che in questo testo s'incontrano possono essere non ultima circostanza la quale induca alcuni dei più volenterosi fra essi ad adottarlo nei Licei e negli Istituti tecnici. Tale adozione gioverà non poco alla fusione della geometria piana colla solida, poichè il VERONESE pratica siffatta fusione appena terminato il precitato libro II, e cioè *in tutti i rimanenti sette libri dei suoi Elementi*, secondo quanto abbiamo già detto a p. 57.

(*) Inoltre nel precitato libro II non è trattata che una prima parte della Geometria piana; le parti rimanenti sono svolte, simultaneamente ad corrispondenti argomenti stereometrici, nei libri V, VI, VII, VIII e IX, dopo trattata nel libro III la prima parte della Geometria solida, e dopo introdotti nel libro IV i concetti di congruenza, simmetria e movimento delle figure, nel piano e nello spazio.

(**) Salvo poi, naturalmente, a guardarsi bene dallo *schiacciare* gli alunni stessi agli esami, anche se daranno prova di non aver saputo ricavare verun costrutto da così scientifica e anaturata astrazione (alla quale ad ogni modo, studiando poi Geometria solida, convien pur rinunciare!).

(***) « *Obbligandoci a cercare la proprietà di una linea o di una superficie, senza poter utilizzare gli enti geometrici posti fuori della linea o della superficie stessa, limitiamo le forze di cui possiamo disporre* ». (DE PAOLIS, l. c. pag. III).

obbediente ad ineluttabili leggi speciali, quali a facoltà intellettuale di esseri a tre dimensioni si convengono, mal s'accocchia alla tirannia di un raziocinio geometrico rigidamente astratto che voglia adattarlo a comportarsi come pensiero di geometri dotati di un minore o maggior numero di dimensioni; ed è appunto per questo che tal'una volta trattando la *Geometria del piano* come geometri piani, e cioè senza ammettere l'esistenza di punti fuori del piano, anzi per intanto escludendola, avviene che si trascuri tuttavia di evitare parole accennanti a siffatti punti (*); tal'altra invece, trattando prima la *Geometria dello spazio* come geometri a quattro o più dimensioni, accennando implicitamente alla possibilità di spazi distinti a tre dimensioni col dimostrare p. es. che: « Se un piano α ha in comune con lo spazio $O\pi$ tre punti non collineari, il piano α stesso apparterrà allo spazio anzidetto » e che « Dati quattro punti qualsivogliano non complanari, il piano determinato da tre di essi e il quarto punto determinano lo spazio a cui appartengono i quattro punti » (**), accade poi che, quantunque scientificamente non si sia esclusa l'esistenza di punti fuori dello spazio che si considera, si dica p. es. senz'altro « Per qualsiasi punto del piano o fuori del piano si può condurre una sola retta perpendicolare al piano » (***) omettendo di preporre le parole « Nello spazio » o meglio « In un dato spazio » (mentre invece, se si suppone p. es. di essere in un S_4 , di tali perpendicolari, quando il punto è sul piano dato, esistono infinite, e cioè una in ciascuno degli S_3 passanti per quel piano e giacenti in quell' S_4), e adoperando ancora le locuzioni *del piano* e *al piano* dopo aver considerato eziandio piani distinti (****).

E veniamo finalmente alla 6^a e ultima obbiezione. È certamente ottimo principio (possibilmente seguito non solo dai fusionisti in geometria, ma da chiunque si occupi di scienze di natura specialmente deduttiva) che ogni proposizione sia dimostrata senza ricorrere a teorie dalle quali essa non dipende necessariamente (*****); consideriamo anzi come progresso logico e scientifico non indifferente lo svincolare la dimostra-

(*) VERONESE, *El. di geom.*: p. 37 « Un piano è determinato da una retta e da un punto qualsiasi di esso, ecc. »; p. 38 « Due rette parallele, o che s'incontrano, determinano un piano »; p. 54 « ... se i due angoli non sono situati nello stesso piano »; p. 55 « Se due rette di un piano sono rispettivamente perpendicolari a due altre rette di esso ecc. »

(**) Loc. cit. p. 109 e 111. Proposizioni cosiffatte costituiscono certamente un efficace avviamento alla teoria degli iperspazi « gloria tutta italiana »; tuttavia ci domandiamo: È veramente opportuno introdurle nell'insegnamento della Geometria assegnata alle scuole secondarie? Se si pensa che fino a pochi anni or sono di tale teoria non si teneva parola nemmeno nei corsi universitari, che anche nelle Università illustri matematiche (quali ad esempio GIUSEPPE BATTAGLINI) furono avversi all'introduzione di questo nuovo genere di studi (V. il cenno necrologico dettato da E. PASCAL nella *Rivista di Matematica* del 1894), e finalmente che la *Geometria non è una scienza di puro ragionamento* (DE PAOLIS, l. c. p. 475) e conseguentemente affinché una teoria matematica meriti il nome di *Geometria* bisogna che le sue ipotesi o postulati esprimano il risultato delle osservazioni più semplici ed elementari delle figure fisiche (PEANO, l. c., p. 75), o in altri termini soddisfacciano al principio che tutti i postulati sono tratti direttamente da oggetti sensibili (VERONESE, l. c., p. XI), la risposta non può essere dubbia. Vedi anche la precitata *Appendice: Nota XIII*, da p. 30 a p. 34, e p. 87.

(***) Loc. cit. p. 119. Vedi anche, nella precitata *Appendice*, l'annotazione a p. 87 e 88.

(****) Loc. cit. p. 107 corollario; p. 113 teor. IV e V; p. 115 teor. I; e § 2 del Libro III.

(*****) In omaggio a questo medesimo principio il chiar.^{mo} e compianto prof. A. LUZZI, fra le varie condizioni alle quali deve soddisfare un libro di aritmetica rigorosa includeva appunto che ciascuna

zione sia pure di un solo teorema da teorie alle quali esso non appartiene. E appunto nel suddetto principio, e nel desiderio del conseguimento di siffatto progresso, è forse a ricercarsi la genesi o il primo incentivo del metodo della fusione.

Siano ad esempio a, b, c semirette complanari uscenti da uno stesso punto O (fig. 1) ed incontranti rispettivamente due rette parallele nei




Fig. 1.

AB e BC uguali e la stessa altezza; i triangoli $A'AB$ e $C'BC'$ parimenti; dunque anche i triangoli OBA' e OBC' sono equivalenti; ma questi hanno la stessa base OB , dunque saranno uguali le loro corrispondenti altezze; e poi chè queste sono pure altezze dei triangoli $A'BB'$ e $C'BB'$, questi, avendo inoltre la stessa base BB' , saranno equivalenti; ma essi possono anche considerarsi come aventi le basi $A'B'$ e $B'C'$ e corrispondentemente la medesima altezza, e pertanto queste basi dovranno essere uguali; cioè $A'B' = B'C'$, c. d. d. Ma che ha che fare l'equivalenza colla questione trattata?

Ricorriamo allo spazio: facciamo rotare l'angolo \widehat{bc} attorno a b per meno di 180° ; congiungiamo poi (fig. 2) A con C , e A' con C' ; poichè $BA \parallel B'A'$, e $BC \parallel B'C'$, sarà il piano ABC parallelo al piano $A'B'C'$, e perciò le intersezioni AC e $A'C'$ di essi col piano dell'angolo \widehat{ac} saranno parallele; quindi $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}$, e $\widehat{ACB} = \widehat{A'C'B'}$; ma $AB = BC$ e perciò $\widehat{BAC} = \widehat{ACB}$, dunque $\widehat{B'A'C'} = \widehat{A'C'B'}$; di qui $A'B' = B'C'$, c. d. d.

E con questa dimostrazione, come con quelle che accenniamo qui in

punti A e A' , B e B' , C e C' , di tal guisa che $AB = BC$, e si voglia dimostrare che $A'B' = B'C'$. Il procedimento comune è questo: si ha $A'B' : AB :: OB' : OB :: B'C' : BC$; di qui $A'B' : AB :: B'C' : BC$; ma $AB = BC$, dunque $A'B' = B'C'$, c. d. d. Ma che cosa ha che fare la complessa teoria delle proporzioni col teorema considerato, il quale nella sua ipotesi e nella sua tesi, non è che una delle più semplici proposizioni che costituiscono il nesso fra la teoria del parallelismo e quella dell'uguaglianza?

Potremmo dire: i triangoli OAB e OBC sono equivalenti, perchè hanno le basi




Fig. 2.

teoria per essere stabilita senza eccezione non dovrebbe intarsi di dati estranei alla propria natura (° Periodico di Matematica, 1893, p. 199).

nota, (*) si esce, è vero, dal piano, ma non si esce dalla teoria del parallelismo e della eguaglianza, alle quali la questione appartiene; e questo

(*) Chi volesse lasciar piana la figura data, e schivare il movimento, potrebbe condurre per AC e per A'C' (fig. 3) i piani paralleli α e α' , e prendere su α e fuori della retta AB un punto E tale che $BE = AB$; la semiretta OE incontrerà α' in un punto E' tale che $A'B' = B'E'$, e $B'E' = C'D'$ (dimostrazione precedente); dunque $A'B' = C'D'$, e. d. d. — Se si volesse considerare anche il caso




Fig. 3.




Fig. 4.

di quattro semirette complanari a, b, c, d uscenti da O (fig. 4) ed incontranti rispettivamente due parallele r, r' nei punti A e A', B e B', C e C', D e D', di tal guisa che $AB = CD$, e si volesse dimostrare che $A'B' = C'D'$, basterebbe appoggiarsi al caso precedente, poichè, detto M il centro di BC e M' il punto in cui la semiretta OM incontra la retta r' , si avrebbe $BM = MC$ e perciò $B'M' = M'C'$, si avrebbe inoltre $AM = MC$ e perciò $A'M' = M'C'$, e conseguentemente $A'B' = C'D'$, e. d. d. — Oppure: condotti per AO e per A'C' (fig. 5) i piani paralleli α e α' e preso su α e fuori della retta AC un segmento UV equipollente ad AE, siano U' e V' i punti in cui le semirette OU e OV incontrano α' ; si avrà




Fig. 5.

$AU \parallel EV$, $AU \parallel A'U'$, $EV \parallel E'V'$, e quindi $A'U' \parallel E'V'$; inoltre $AE \parallel UV$, $AE \parallel A'E'$, $UV \parallel U'V'$, e quindi $A'E' \parallel U'V'$; dunque $A'E' = U'V'$; parimenti $F'C' = U'V'$; conseguentemente $A'E' = F'C'$, e. d. d. — La stessa dimostrazione potrebbe farsi anche per il primo caso. Un'altra dimostrazione, basata su una semplice proprietà del tetraedro, può vedersi a p. 114 dei precitati *Elementi* di LAZZERI e BASSANI. Su questa stessa proprietà « La sezione di un tetraedro ottenuta mediante un piano parallelo a due spigoli opposti è un parallelogramma », che può anche enunciarsi « Un piano parallelo alle diagonali di un quadrilatero gobbo taglia i lati nei vertici di un parallelogramma », e che è conseguenza quasi immediata del concetto di parallelismo, i medesimi Autori hanno pure basato una semplicissima ed elegante dimostrazione della notevole proposizione stereometrica « Le sezioni di piramidi aventi basi ed altezze uguali, ottenute mediante piani paralleli ai piani delle basi ed equidistanti da questi, sono poligoni uguali », e di qui come semplice corollario hanno dedotto l'importante teorema

dal punto di vista logico è l'essenziale, ed anche dal punto di vista didattico, tanto più poi per chi la geometria solida deve pur studiare; e altrettanto si dica per questioni analoghe ed in particolare per la già ricordata costruzione del triangolo isoscele relativo al pentagono e al decagono regolari, ottenuta dal DE PAOLIS indipendentemente dalle proporzioni e dall'equivalenza. E tutto questo è non solamente in armonia coll'ottimo principio suddetto, ma anche in pieno accordo, anzichè in contraddizione come vorrebbe il PALATINI, coll'altro principio (didatticamente inoppugnabile) adottato dal DE PAOLIS nei suoi *Elementi* ed esposto, riguardo al postulato delle parallele, nella precitata nota XXVII, che, riguardo all'impiego della stereometria nella planimetria, potrebbe enunciarsi analogamente così « *Riconosciuta la necessità di domandare il postulato della esistenza dello spazio (che è fuor di dubbio il più evidentemente fondato sulla osservazione) è meglio concederlo subito e trarne le principali conseguenze. Si potranno poi (in uno studio complementare o superiore) utilmente distinguere le proprietà che esisterebbero anche se il postulato non fosse ammesso* ». E non è certamente a RICCARDO DE PAOLIS, la cui immatura perdita non sarà mai abbastanza compianta, che si possono riferire le dure parole del prof. PALATINI « *È certo però che i principî si modificano a seconda dei casi e in conformità dei propri intenti* ». È però debito nostro avvertire che lo stesso prof. Palatini, quasi pentito di averle scritte, dà termine alle sue considerazioni dichiarando di non aver inteso con le obbiezioni mosse ad alcune asserzioni del DE PAOLIS di menomare il merito dell'illustre geometra, le cui coscienziose ricerche sulla geometria elementare hanno prodotto un testo che va sempre annoverato fra i migliori.

E finalmente non crediamo neppur giusto il dire, come fa il PALATINI, che chi della Geometria solida si serve a prò di proposizioni appartenenti alla Planimetria voglia asservire questa alla Stereometria.

Stereometria e Planimetria, figlie entrambe del concetto di forma e dell'idea di estensione, sono scienze naturalmente congiunte, destinate a contraccambiarsi continuamente reciproco appoggio; a seconda dei casi, specialmente dal punto di vista didattico, può convenire che la prima, sorella più robusta e gagliarda, aiuti la seconda, più delicata e sottile, o la seconda aiuti alla sua volta la prima. Chi, facendo opera contraria alla loro intima essenza, nell'insegnamento elementare le vuole disgiunte, fa loro violenza e reca danno ad entrambe; al pari, del resto, di chi vuole rendere l'una serva e l'altra signora. E coll'antico metodo di trattazione della Stereometria col quale si fa quasi tutto a furia di triangoli, si viene appunto a far dipendere la Stereometria dal beneplacito della Planimetria. (Vedi per esempio il teorema fondamentale sulla perpendicolarità fra retta e piano — dimostrazioni di EUCLIDE, di CRELLE (*), di LEGENDRE (**), — quello sul parallelismo di rette perpen-

* Se due piramidi hanno basi equivalenti e altezze uguali, due loro sezioni qualunque parallele alle basi e da esse equidistanti sono pure equivalenti, dimostrandolo così per la prima volta indipendentemente dalle proporzioni (op. c., p. 113 e 284).

(*) La dimostrazione di CRELLE è quella adottata ordinariamente (V. p. es. *Elementi* di SANZIA e D'OVINDO, ed. 5^a, p. 345).

(**) La dimostrazione di LEGENDRE è basata sopra equivalenze relative a quadrati di lati di triangoli.

dicolari ad uno stesso piano — dimostrazioni di EUCLIDE e di BALTZER —, quello *delle tre perpendicolari* — dimostrazione di FAIFOFER — (*), quelli relativi agli angoli a lati paralleli e alla somma delle faccie di un angoloide convesso — dimostrazioni di EUCLIDE —, quello sull'equivalenza dei poligoni ottenuti sezionando piramidi aventi uguali altezze e basi equivalenti mediante piani paralleli ai piani delle basi ed equidistanti da questi — dimostrazioni di LEGENDRE (**), e di BETTI e BRIO-SCHI — (***) , ecc., e confronta tutte queste dimostrazioni, non sempre semplici e spesso indubitatamente artificiose, colle corrispondenti dimostrazioni naturali e facili che si possono vedere invece nelle opere precipitate di DE PAOLIS e di LAZZERI e BASSANI).

Crediamo così di aver risposto alle obiezioni del prof. PALATINI e dei professori SOLA e FERRARI.

Ma vi è un'altra obiezione, che non può essere passata sotto silenzio; ci fu fatta, alcuni anni or sono dal prof. ing. F. RAMPONE, Preside del R. Istituto Tecnico di Alessandria, e può formularsi così « *La separazione è un progresso, dunque la fusione è un regresso* ». L'obiezione, non si può dissimularlo, nella sua espressiva brevità, colpisce e pare inconfutabile.

Con essa si vuol dire: « *In questa questione della fusione è corso un equivoco. Chi la vagheggia come l'ultimo e il più sapiente prodotto dell'arte dell'insegnamento geometrico, esamini più attentamente la questione e troverà che la fusione ne è invece il primo rudimento. Infatti il primo concetto geometrico è stato indubitatamente per l'uomo (ente ragionevole a tre dimensioni) quello dello spazio, esistente in natura; il concetto di piano, risultato di una proficua ma artificiale astrazione, ha dovuto dunque essere posteriore; e pertanto in principio, la Geometria doveva necessariamente essere una sola; solamente più tardi (le vie più semplici sono ordinariamente le più tarde a presentarsi (****)), perfezionata la facoltà di astrarre ed affinato il senso geometrico, per comodità di studio e per la facilità del tracciamento di segni per esempio sul limo delle sponde del Nilo o sulle arene delle spiagge mediterranee, si è trovato esser cosa più opportuna, più perfezionata, più semplice, separare la geometria piana dalla solida e quella porre a fondamento di questa. Dunque chi cerca la fusione invece d'andare avanti, vuole tornare indietro: e questo è quanto molti amanti della fusione non avevano forse mai avvertito. « NIHIL NOVI SUB LUNA ».*

Noti il lettore: tutte le parole scritte in corsivo nel capoverso precedente sono di MASSIMO D'AZEGLIO e si possono leggere in un suo opuscolo dal titolo QUESTIONI URGENTI, pubblicato coi tipi del Barbéra a Firenze nel 1861; ben inteso egli non parla di fusione e separazione di Stereometria e Planimetria, ma di . . . Repubblica e Monarchia. È forse questa la prima volta che una questione matematica può trattarsi colle stesse parole relative ad una questione politica, e perciò solamente

(*) *Elementi di Geometria*, ed. 10^a, n. 581 e 582.

(**) *Éléments de Géométrie*. Paris chez F. Didot, 1823, p. 183, 184.

(***) *Appendice agli Elementi di Euclide*. Firenze, 1868, p. 415.

(****) Aforisma citato anche dal prof. PALATINI nella sua 1^a obiezione.

ci è piaciuto riportarle testualmente; non si spaventi pertanto il lettore *purus mathematicus* senza quel che segue; quantunque l'obbiezione D'AZEGLIO sia della stessa forma e natura dell'obbiezione RAMPONE, non vogliamo qui discentere la prima, ma bensì la seconda.

Ed anche rispetto a questa, pur riconoscendo la gravità che essa può avere, ci limitiamo a domandare: Ma è proprio vero che la Geometria, in principio, fosse una sola, e la separazione sia venuta più tardi? Se, come abbiamo detto più sopra, delle due scienze sorelle, Planimetria e Stereometria, la seconda è dal punto di vista naturale e scientifico la più gagliarda e robusta, dal punto di vista cronologico non è forse a ritenersi che essa sia pure la sorella più giovane, cosicchè il vanto di essere primogenita debba spettare alla Planimetria? E noi proverebbero forse l'etimologia dello stesso nome « *Geometria* », e la nota osservazione, che con questa etimologia si collega, che la necessità di operazioni catastali-topografiche fu il primo incentivo alle ricerche geometriche? (*) Confessiamo tuttavia che non siamo in possesso di dati storici sufficienti per risolvere con sicurezza questa questione « *In geometria è più antico il metodo della fusione o quello della separazione?* ». Qualora si pervenisse a provare che l'opinione, per la quale propendiamo, della minore antichità, anzi della quasi attualità della fusione (che probabilmente, scientificamente almeno, non risale più addietro del MONGE) è realmente conforme al vero, l'argomentazione antifusionistica del prof. RAMPONE cadrebbe immediatamente e percuoterebbe di rimbalzo i separatisti medesimi. Ma del resto, dato anche che la fusione, o per dir meglio la *non separazione*, fosse il metodo iniziale e primitivo, forsechè ogni ritorno all'antico è da considerarsi come un regresso? Forsechè i *laudatores temporis acti* hanno sempre ad essere dalla parte del torto? Per conto nostro dichiariamo che l'intima convinzione che abbiamo nella preferibilità del metodo adottato da DE PAOLIS non scemerebbe in alcun modo, anche se i separatisti, scuola certamente antica perchè anteriore a PLATONE (**), riuscissero tuttavia a provare che i perfezionatori, i progressisti, i novatori sono essi, o per lo meno lo furono, e che per conseguenza i retrogradi, i rudimentali, i neòfobi sono precisamente i seguaci della *primordiale fusione*.

E con questa dichiarazione poniam termine alla presente relazione, seppure il benigno lettore permette ancora che relazione si dica questo scritto, al quale noi stessi abbiamo ritenuto conveniente preporre un titolo di battaglia « *PRO FUSIONE* » (***).

(*) *La parola Geometria, misura della terra, accenna ad uno scopo primitivo, ad una serie di ricerche, da cui poi è sorta la scienza dell'estensione* (DE PAOLIS, o. c. pag. 461).

(**) *Gli antichi separarono la cognizione de piani della scienza de solidi, perciocchè quella chiamavano Geometria, come nostra PLATONE ne i libri politici, et questa stereometria. Ma li moderni, perchè la cognizione dell'una, et dell'altra scienza consiste intorno alle grandezze, etiam con un nome comune l'hanno chiamata Geometria, congiungendo quelle insieme, et facendone una sola* (COMMANDINO, o. c. retro pag. 205).

(***) E la battaglia non sarà perduta se varrà ad indurre qualche nostro collega, fuori separatista, a sperimentare la fusione; in questo caso *provare provvisoriamente* vorrà dire, potendo, *adottare definitivamente*, poichè di questo siamo certi « *TRA GLI AVVEDDARI DELLA FUSIONE NON VE NE È UNO CHE TALE SIA DIVENTATO PER AVERNE FATTO UNA CONVENIENTE E SFAVOREVOLE ESPERIENZA* ». Ed è

Come relatori avremmo dovuto limitarci, dopo riassunte le risposte alla questione V, a porre sotto agli occhi dei fusionisti e dei separatisti le seguenti parole « *Un cambiamento spesso non è un progresso, come dice una parte degli uomini, nè un regresso, come dice l'altra, non un vantaggio nè una rovina, ma un cambiamento. Null'altro* ». (*)

Brescia 14 Novembre 1897.

E. DE AMICIS.

appunto nella speranza di poter in qualche modo contribuire a far sì che del metodo della fusione siano fatte in pratica più ampie e numerose prove, che allo scritto presente abbiamo dato un'estensione maggiore di quella che sarebbe convenuta ad una semplice relazione sulle poche risposte pervenute al Comitato dell'Associazione *Mathesis* intorno alla *Questione della fusione della geometria piana colla solida*. Ma, non ostante siffatta estensione preghiamo il lettore di non voler considerare questo articolo come una relazione intorno a quanto fu scritto su questo dibattuto argomento e tanto meno poi come uno studio scientifico-didattico apposito e completo sulla predetta *Questione*. In un tale studio, che avrebbe dovuto esser fatto da chi avesse voluto dare esauriente risposta alla *Questione* medesima (e che ci auguriamo sia fatto in seguito, al più presto) converrebbe anzitutto che fossero nettamente separate due cose:

1^o. — La possibilità scientifica di separare certe cose da altre, e la necessità scientifica di riunirle; poichè è necessario che ogni teorema sia enunciato dopo i postulati di cui ha bisogno nella dimostrazione.

2^o. — La convenienza didattica di riunire o di separare.

Il primo punto specialmente è di massima importanza, perchè ad esso è subordinato il secondo, e perchè, come lo studio che si è fatto in questo secolo sulla teoria delle parallele, o *Geometria assoluta*, non è che l'analisi di un postulato, così lo studio che attualmente si va facendo sulla fusione o separazione delle geometrie piana e solida, sotto l'aspetto scientifico è l'analisi di un altro postulato, il quale la richiede anche più acuta o più vasta o profonda.

(*) ALAN-RENÉ LE SAGE, *Turcaret*, versione italiana con prefazione di GALLO MARCUCCI. Roma, 1881, p. 13.

(Estratto dal *Bollettino dell'Associazione Mathesis*).

RISOLUZIONI DELLE QUISTIONI

379 380 382 385 389 390 391 393 394 395 396

379. Se $A, A'; B, B'; C, C'; D, D'$ sono quattro coppie di elementi coniugati in una involuzione quadratica I , i coniugati di A', B', C' rispettivamente nelle involuzioni $(B, C; D, D')$, $(C, A; D, D')$, $(A, B; D, D')$ sono un medesimo elemento E ; e i coniugati rispettivi di A, B, C nelle involuzioni $(B', C'; D, D')$, $(C', A'; D, D')$, $(A', B'; D, D')$ coincidono nell'elemento E' coniugato ad E nella I .

REYALI.

Risoluzione geometrica del Prof. S. Catania e del sig. Guido Fubini.

Siano P, Q, R i coniugati di A', B, C' rispettivamente nelle involuzioni indicate nell'enunciato. Dalla prima involuzione si ha

$$(1) \quad DD'BA' \bar{\wedge} D'DCP;$$

dalla seconda

$$(2) \quad DD'AB' \bar{\wedge} D'DCQ,$$

e dalla I

$$DDBA' \bar{\wedge} DDB'A.$$

Ma $D'DB'A \bar{\wedge} DD'AB'$, quindi $DD'BA' \bar{\wedge} DD'AB'$, e perciò dalle (1) e (2) si deduce

$$D'DCP \bar{\wedge} D'DCQ,$$

e quindi $P \equiv Q$.

Dalla 2^a e 3^a involuzione si hanno nello stesso modo:

$$D'CB' \bar{\wedge} D'DDAQ, \quad D'DC'B \bar{\wedge} DDRA, \quad \text{da cui } D'DAQ \bar{\wedge} DD'RA \bar{\wedge} D'DAR,$$

e perciò $Q \equiv R$.

Si dica E il punto in cui coincidono P, Q, R .

Si dimostra similmente che in un medesimo punto E' coincidono i coniugati rispettivi di A, B, C nelle altre tre involuzioni indicate nell'enunciato.

Dalle due involuzioni

$$(B, C; D, D'; A', E), \quad (B', C'; D, D'; A, E')$$

si trae $BDCA' \bar{\wedge} CD'BE, B'D'C'A \bar{\wedge} C'DB'E'$. I primi membri sono proiettivi a causa dell'involuzione I ; lo saranno perciò i secondi, cioè

$$CD'BE \bar{\wedge} C'DB'E',$$

il quale risultato mostra che E ed E' sono coniugati nella I .

Risoluzione analitica del Prof. A. Barozzini di Mirandola.

Sia il caso d'una involuzione di punti; le ascisse di A, A', B, \dots siano a, a', b, \dots sarà allora

$$aa' = bb' = cc' = dd' = r^2.$$

L'involuzione $(B, C; D, D')$ ha per equazione

$$\begin{vmatrix} xy & x+y & 1 \\ bc & b+c & 1 \\ r^2 & d+d' & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

e il coniugato di A' ha un'ascissa x data dall'equazione

$$(1) \quad \begin{vmatrix} r^2 x & ax + r^2 & a \\ bc & b + c & 1 \\ r^2 & d + d' & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Così i coniugati di B', C' nelle $(C, A; D, D')$, $(A, B; D, D')$ hanno per ascisse rispettive quelle date dalle equazioni

$$(2) \quad \begin{vmatrix} r^2 x & bx + r^2 & b \\ ca & c + a & 1 \\ r^2 & d + d' & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (3) \quad \begin{vmatrix} r^2 x & cx + r^2 & c \\ ab & a + b & 1 \\ r^2 & d + d' & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Addizionando le (1), (2), (3) ho un'equazione che dà

$$(4) \quad x = \frac{r^4 - r^2(bc + ca + ab) + abc(d + d')}{r^2 [d + d' - (a + b + c)] + abc}.$$

Si può verificare che tale valore soddisfa le equazioni (1), (2), (3) e dà l'ascissa del punto E . Quella del punto E' si ha mutando nella (4) le a, b, c , nelle $a' b' c'$ o nelle $\frac{r^2}{a}, \frac{r^2}{b}, \frac{r^2}{c}$, e si ha

$$x' = \frac{r^2}{x}.$$

Quindi E, E' sono coniugati nella $L. c. d. d.$

In modo analogo, si procederebbe, se si trattasse d'una involuzione di raggi o d'una involuzione di piani.

380. *Determinare lo involuppo d'un cerchio, il cui centro percorre una parabola data, e che tocca una retta parallela alla direttrice. Trovare il punto di contatto del cerchio mobile col suo involuppo, e dimostrare che quest'ultimo è pure lo involuppo delle rette simmetriche della retta data rispetto alle tangenti della parabola.*

RETALI.

Risoluzione del Prof. A. Barozzini di Mirandola.

Siano tracciate una parabola, la sua direttrice d , una retta r parallela alla direttrice, un cerchio col centro M sulla parabola e tangente alla retta r ; conduco per M una parallela all'asse della parabola sino ad incontrare le rette d, r rispettivamente in D, R . Se unisco il fuoco F della parabola con M , e P è il punto d'incontro del cerchio colla retta FM , è facile vedere che è

$$FP = DR,$$

perchè M dista ugualmente dal fuoco e dalla direttrice. Il cerchio M è dunque sempre tangente ad un cerchio di centro F e raggio DR (distanza della direttrice dalla parallela r data). Tale involuppo passa anche pei punti (reali o immaginari) in cui r taglia la parabola.

Se conduco la perpendicolare a FP in P fino ad incontrare in L la r , dai due triangoli uguali LMP, LMR deduco che PL è simmetrica ad r rispetto ad LM ; che LM è tangente alla parabola, perchè passa per M e vi biseca l'angolo formato dal raggio focale colla parallela all'asse e quindi il cerchio di centro F e raggio FP è pure involuppo delle rette PL *c. d. d.*

Altre risoluzioni del sig. G. Fubini e del Dott. G. Cardoso-Laynes.

382. *Luogo dei fuochi delle parabole che toccano una parabola data ed hanno per direttrice una medesima retta, parallela alla direttrice della parabola data.*

REALI.

Risoluzione del Prof. Giulio Cardoso-Laynes di Livorno.

Conservando le notazioni adottate nella risoluzione della questione 380, supponendo che la parabola data sia quella di cui si parla nella detta questione e la retta data sia la r , osserviamo che dall'eguaglianza dei triangoli LMP e LMR segue che ML è bisettrice dell'angolo PMR. Perciò, se immaginiamo che una parabola tangente in M alla parabola data, cioè avente per tangente ML, abbia per direttrice r , il suo fuoco dovrà trovarsi su MP per il noto teorema " la tangente in un punto M di una parabola è la bisettrice dell'angolo formato dal raggio focale passante per M con la parallela condotta da M all'asse ". E poichè inoltre è MR = MP il punto P sarà il fuoco della parabola variabile. Ma quando M scorre sulla parabola data, P si muove sul circolo che ha per centro il fuoco F e per raggio la distanza DR delle rette d, r , perciò questo circolo è il luogo cercato.

Altra risoluzione analitica del medesimo ed altra geometrica del sig. G. Fubini.

385. *Dimostrare l'eguaglianza*

$$\sqrt[7]{29 + 13\sqrt{5}} + \sqrt[7]{29 - 13\sqrt{5}} = \sqrt[7]{2}.$$

GÉLIN.

Risoluzione del sig. Giuseppe Cavacchioli.

Si ha identicamente sviluppando

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{5})^7 &= 1 + 7\sqrt{5} + 105 + 175\sqrt{5} + 875 + 525\sqrt{5} + 875 + 125\sqrt{5} \\ &= 1856 + 892\sqrt{5} = 64(29 + 13\sqrt{5}) = \frac{2^7}{2}(29 + 13\sqrt{5}), \end{aligned}$$

$$(1 - \sqrt{5})^7 = \frac{2^7}{2}(29 - 13\sqrt{5}),$$

quindi

$$29 + 13\sqrt{5} = \frac{2(1 + \sqrt{5})^7}{2^7}; \quad 29 - 13\sqrt{5} = \frac{2(1 - \sqrt{5})^7}{2^7};$$

e perciò

$$\sqrt[7]{29 + 13\sqrt{5}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \sqrt[7]{2},$$

$$\sqrt[7]{29 - 13\sqrt{5}} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \sqrt[7]{2};$$

d'onde

$$\sqrt[7]{29 + 13\sqrt{5}} + \sqrt[7]{29 - 13\sqrt{5}} = \sqrt[7]{2}.$$

Altra risoluzione del Prof. Sarozzini.

389. Se N e k sono numeri interi ed $r > 1$, si ha $N^{6k+r} \equiv N^r \pmod{9}$.

BONOLIS.

Risoluzione del sig. Attilio Crepas.

Si ha

$$(1) \quad N^{6k+r} - N^r = N^r(N^{6k} - 1).$$

Distinguiamo due casi:

1°. Sia N della forma $3X$. Allora N^r , purchè sia $r > 1$, è divisibile per 9, e quindi la (1) è divisibile per 9, e perciò, in tal caso, si ha

$$N^{6k+r} \equiv N^r \pmod{9}.$$

2°. Sia N primo con 9. Sarà allora N^k primo con 9, e quindi (V. questione 372) la sesta potenza di N^k è congrua ad 1 rispetto al modulo 9, e perciò, anche in tal caso, è

$$N^{6k+r} \equiv N^r \pmod{9}.$$

390. La quinta potenza d'ogni numero intero è congrua a 0, o a ± 1 rispetto al modulo 11.

BONOLIS.

Risoluzione del sig. Attilio Crepas.

Qualsiasi numero N o è divisibile per 11 o è primo con 11.

Nel 1° caso abbiamo

$$N^5 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Nel 2° caso, pel teorema di Fermat, si ha

$$N^{10} \equiv 1 \pmod{11};$$

e quindi

$$N^5 \equiv \pm 1 \pmod{11}.$$

391. 1°. Se una conica, inscritta nel triangolo ABC , ha un fuoco nel punto H d'incontro delle altezze, ha l'altro nel centro del cerchio circoscritto ad ABC .

2°. Se una conica, inscritta nel triangolo ABC , ha un fuoco nel centro D del cerchio inscritto ad ABC , è un cerchio.

3°. Se una conica, inscritta in ABC , ha un fuoco nel baricentro G di ABC , vuolsi sapere quale è il rapporto delle distanze di due vertici di ABC dalla retta che unisce il terzo vertice al secondo fuoco della conica.

FUBINI.

Risoluzione del sig. Prof. Retali.

I teoremi 1° e 2° sono evidenti, perchè i fuochi di una conica centrale inscritta nel triangolo ABC son coniugati isogonali rispetto al triangolo e; 1° il coniugato isogonale dell'ortocentro è il centro del cerchio circoscritto; 2° il centro del cerchio inscritto è coniugato isogonale a se stesso. Quanto al 3° basta osservare che il coniugato isogonale del baricentro G è il punto di Lemoine L del triangolo ABC : ne segue che il rapporto p. es. delle distanze dei vertici A e B dalla retta CL è $b^2 : a^2$.

Altra risoluzione del sig. Radolfe.

Risoluzione e generalizzazione delle questioni 393, 394 del sig. Eugenio Strocchi.

Col simbolo $X_{m,k,r}$ indicheremo il numero delle disposizioni a k a k di m elementi a_1, a_2, \dots, a_m , nelle quali nei primi r posti non vi è nessun elemento che occupi il posto dato dal proprio indice; qualche volta col simbolo stesso indicheremo per brevità le medesime disposizioni.

Si prendano gli $m-1$ elementi $a_1 a_2 \dots a_{r-1} a_{r+1} \dots a_m$, e se ne considerino le disposizioni a $k-1$ a $k-1$, in numero di $X_{m-1, k-1, r-1}$, nelle quali nei primi $r-1$ posti nessun elemento occupa il posto dato dal proprio indice; in ognuna di queste si ponga a_r all' r ° posto; in tal modo si hanno tutte le disposizioni di m elementi a k a k in cui nei primi $r-1$ posti nessun elemento occupa il posto dato dal proprio indice, mentre a_r è all' r ° posto.

Per avere le $X_{m,k,r}$ bisogna evidentemente escludere dalle $X_{m,k,r-1}$, quelle che contengono a_r all' r ° posto; ma si è visto che queste sono in numero di $X_{m-1, k-1, r-1}$, quindi si ha

$$(1) \quad X_{m,k,r} = X_{m,k,r-1} - X_{m-1, k-1, r-1},$$

dove si suppone evidentemente $m \geq k \geq r$.

È facile persuadersi che è:

$$\begin{aligned} X_{m,k,1} &= D_{m,k} - D_{m-1, k-1} \text{ se } k > 1 \\ X_{m,k,1} &= D_{m,k} - 1 \quad \text{se } k = 1. \end{aligned}$$

Avremo dunque, mediante la (1),

$$\begin{aligned} X_{m,k,2} &= D_{m,k} - D_{m-1, k-1} - (D_{m-1, k-1} - D_{m-2, k-2}) = \\ &= \binom{2}{0} D_{m,k} - \binom{2}{1} D_{m-1, k-1} + \binom{2}{2} D_{m-2, k-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_{m,k,2} &= D_{m,k} - D_{m-1, k-1} - (D_{m-1, k-1} - 1) = \\ &= \binom{2}{0} D_{m,k} - \binom{2}{1} D_{m-1, k-1} + \binom{2}{2} \cdot 1 \end{aligned}$$

a seconda che è k maggiore od eguale a 2.

Così procedendo, con un calcolo molto facile si giunge alle seguenti formole generali:

$$X_{m,k,h} = \binom{h}{0} D_{m,k} - \binom{h}{1} D_{m-1, k-1} + \binom{h}{2} D_{m-2, k-2} \dots + (-1)^h \binom{h}{h} D_{m-h, k-h}$$

$$X_{m,k,h} = \binom{h}{0} D_{m,k} - \binom{h}{1} D_{m-1, k-1} + \binom{h}{2} D_{m-2, k-2} \dots + (-1)^h \binom{h}{h} \cdot 1$$

a seconda che è $k > h$ oppure $k = h$.

Queste due formole possono unirsi in una sola ponendo $D_{s,0} = 1$, qualunque sia s .

Possiamo dunque enunciare il seguente

TEOREMA. — Il numero delle disposizioni a k a k di m elementi $a_1 \dots a_m$, nelle quali nei primi h posti nessun elemento occupa il posto dato dal proprio indice è

$$\sum_{r=0}^{r=h} (-1)^r \binom{h}{r} D_{m-r, k-r}.$$

Nella dimostrazione di questo teorema è inclusa quella del

COROLLARIO 1°. — Il numero delle disposizioni di m elementi $a_1 \dots a_m$, a k a k , nelle quali nessun elemento occupa il posto designato dal proprio indice è:

$$\sum_{r=0}^{r=k} (-1)^r \binom{k}{r} D_{m-r, k-r}.$$

Si ha poi finalmente, facendo $h = k = m$, il

COROLLARIO 2°. — Il numero delle permutazioni di m elementi $a_1 \dots a_m$, nelle quali nessun elemento occupa il posto designato dal proprio indice, è

$$m! \sum_{r=0}^{r=m} (-1)^r \frac{1}{r!}$$

Ora siamo in grado di risolvere la seguente quistione:

Entro un'urna sono m palle numerate $P_1, P_2 \dots P_m$, e se ne estraggono k , una alla volta. Probabilità che una almeno sorta nell'ordine dato dal proprio numero.

Estraendo k palle, e tenendosi conto dell'ordine, noi potremo formare egualmente una qualunque delle disposizioni a k a k delle m palle, cosicchè i casi possibili sono in numero di $D_{m,k}$. Sono favorevoli quei casi, in cui almeno una palla sorta nell'ordine dato dal proprio numero; tali casi sono (1° Cor.) in numero di

$$D_{m,k} - \sum_{r=0}^{r=k} (-1)^r \binom{k}{r} D_{m-r, k-r}$$

La probabilità cercata è dunque

$$\frac{D_{m,k} - \sum_{r=0}^{r=k} (-1)^r \binom{k}{r} D_{m-r, k-r}}{D_{m,k}} =$$

$$= \frac{k}{m} - \frac{k(k-1)}{m(m-1)} \frac{1}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)}{m(m-1)(m-2)} \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{k(k-1)\dots[k-(k-1)]}{m(m-1)\dots[m-(m-1)]} \frac{1}{k!}.$$

Se si fa $k = m$, la probabilità diventa

$$\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{m+1} \frac{1}{m!}.$$

A questo risultato si poteva giungere applicando direttamente il 2° corollario.

Si noti che se nell'ultimo risultato si cambia m in $m+1$ la probabilità aumenta o diminuisce secondo che m è dispari o pari; cosicchè aumentando m successivamente di una unità, la probabilità oscilla, ossia subisce degli aumenti e delle diminuzioni.

Se si fa $m = \infty$, la probabilità è data dalla somma s della serie

$$\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots$$

Tale serie è [Cesàro, *Analisi Alg.* pag. 128, § 9] convergente, ed ha per somma

$$1 = 1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e} = \frac{1,718281828459045\dots}{2,718281828459045\dots}$$

Si può trovare questo valore di s , anche osservando che essa è il limite comune delle due serie

$$\left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!}\right) + \dots$$

$$\frac{1}{1!} - \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) - \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}\right) - \dots$$

I termini della 1ª serie sono tutti positivi, quelli tra parentesi della 2ª sono pure positivi, dunque la probabilità per $m = \infty$ è compresa tra 0 e 1; non solo, ma è sempre compresa tra la somma di un numero qualunque di termini della 1ª serie e la somma di quanti si vogliono termini della 2ª.

La somma dei primi 4 termini della 1ª serie è $\frac{25447}{40920} = 0,631125\dots$

„ „ 5 „ „ 2ª „ $\frac{229024}{362880} = 0,631128\dots$

Cosicchè la probabilità è compresa tra 0,631125 e 0,631129 e si può prendere eguale a 0,631125 coll'approssimazione di $\frac{4}{10^7}$ per difetto.

Abbiamo così risolto la seguente quistione proposta dal Periodico:

393. Entro un'urna sono n palle numerate (P_1, P_2, \dots, P_n) e si estraggono tutte ad una alla volta. Probabilità che una almeno sortita nell'ordine dato dal proprio indice. Caso di $n = \infty$.

BAROZZINI.

Possiamo ancora risolvere la seguente quistione:

Date due urne contenenti ciascuna m palle numerate, se ne estraggono due alla volta, una per ciascuna urna. Probabilità di estrarre insieme due palle collo stesso numero.

Quando avremo levato tutte le palle, avremo formato tanto con quelle di un'urna, quanto con quelle dell'altra, una permutazione delle m palle. È dunque possibile di associare fra loro due permutazioni qualunque delle m palle; quindi il numero dei casi possibili è $(m!)^2$.

Si prenda una permutazione qualunque delle m palle della 1ª urna, e sia a_1, a_2, \dots, a_m ; tale permutazione potrà unirsi ad una qualunque delle permutazioni delle m palle date, ossia delle stesse palle a_1, a_2, \dots, a_m .

Si avrà un caso favorevole ogni volta che alla permutazione presa ne associeremo una che contenga qualche elemento nel posto dato dal proprio indice:

ora tali permutazioni sono in numero di $m! - m! \sum_{r=0}^{r=m} (-1)^r \frac{1}{r!}$. Cosicchè il numero totale dei casi favorevoli è

$$\frac{(m!)^2 \left[1 - \sum_{r=0}^{r=m} (-1)^r \frac{1}{r!} \right]}{(m!)^2} = 1 - \sum_{r=0}^{r=m} (-1)^r \frac{1}{r!} = \sum_{r=1}^{r=m} (-1)^{r+1} \frac{1}{r!}$$

Le probabilità domandate dalle questioni ultima e penultima sono dunque eguali.

Se nell'ultima probabilità trovata si fa $m = 40$, si ha la soluzione della quistione seguente proposta dal Periodico:

394. Dati due mazzi di carte, se ne estraggono due alla volta, una per ogni mazzo. Probabilità che sortano insieme due carte uguali.

BAROZZINI.

Altre risoluzioni del sig. D'Ormea.

395. Siano c e c' due cerchi posti nello stesso piano, che abbiano per centri rispettivamente C e C' , e s' incontrino in due punti H, K . Immaginando un triangolo variabile MNP , tale che i lati MN, MP, NP passino rispettivamente per H, C, C' ed i vertici M, N siano rispettivamente su c e c' , dimostrare che il luogo del terzo vertice P è il circolo che passa per C, C' e K .

CARDOSO-LAYNES.

Risoluzione del sig. Eugenio Strocchi.

I diametri di c e c' passanti per K incontrino i due cerchi rispettivamente in M', N' ; gli angoli KHM', KHN' essendo retti, le corde $M'H, HN'$ sono per diritto, ossia K è un punto del luogo.

Consideriamo una posizione qualunque di P e distinguiamo due casi, a seconda che P cade o no dalla stessa parte di K rispetto alla retta CC' .

Nel 1° caso sia Q il punto d'incontro dei segmenti $M'K, NP$ (o a seconda del caso $N'K, MP$).

Si ha evidentemente

$$\widehat{MHM'} = \widehat{NHN'}, \\ \widehat{MCM'} = 2 \cdot \widehat{MHM'}, \quad \widehat{NCN'} = 2 \cdot \widehat{NHN'}.$$

Quindi

$$\widehat{PCQ} = \widehat{MCM'} = \widehat{NCN'} = \widehat{KC'Q}.$$

Ed essendo $\widehat{CQP} = \widehat{C'QK}$, risulta

$$\widehat{MPN} = \widehat{M'KN'},$$

ossia P si trova sul circolo dei tre punti C, C', K .

Nel 2° caso, l'angolo $\widehat{NCN'}$ è eguale al doppio del supplemento di $\widehat{NHN'}$, ossia al doppio di $\widehat{MHM'}$.

Ma anche $\widehat{MCM'}$ è doppio di $\widehat{MHM'}$, dunque

$$\widehat{NCN'} = \widehat{MCM'} = \widehat{PCK}.$$

Dunque gli angoli $\widehat{PCK}, \widehat{PC'K}$ sono supplementari, quindi sono supplementari anche gli altri $\widehat{CPC'}, \widehat{CKC'}$; ossia P è un punto del cerchio passante per C, C', K .

Altre risoluzioni della signora Dott. Ersilia Bisson e dei sigg. E. Stretti, F. Celestri, L. D'Ormea, Radolfe e M. Bello.

396. Sia data la parabola $x^2 + 2hy(1 + \cos 2\alpha) - 2hx \sin 2\alpha = 0$, che ha l'asse di figura parallelo all'asse delle y . Dimostrare, essendo gli assi ortogonali,

1° che α è l'angolo che la tangente alla parabola nell'origine forma con l'asse positivo delle x ;

2° che staccando sull'asse delle y , a partire dall'origine, un segmento $OA = h$, la parallela all'asse delle x condotta da A è la direttrice della parabola;

3° descrivendo su di OA come diametro una semicirconferenza che incontri in B la tangente alla curva nell'origine, la parallela condotta da B all'asse delle x è la tangente alla parabola nel suo vertice;

4° se questa tangente incontra in O l'asse delle y , prendendo il segmento BD uguale ed opposto a BC , sarà D il vertice della parabola;

5° congiungendo A con B e prolungando questo segmento AB di altrettanto in F , sarà F il fuoco della parabola;

6° il luogo dei vertici di tutte le parabole, che si ottengono dall'equazione data lasciando inalterato h e facendo variare α con legge di continuità, è una ellisse che ha per asse minore il segmento $OA = h$, e l'asse maggiore uguale a $2h$;

7° in questa stessa ipotesi di α variabile ed h costante il luogo dei fuochi di tutte le parabole è un circolo di centro O e raggio h ;

8° nella stessa ipotesi l'involuppo di tutte le parabole è un'altra parabola avente il vertice in A ed il fuoco in O ;

9° il luogo dei vertici di tutte le parabole, che si ottengono dalla equazione data lasciando invariata α e facendo variare h con legge di continuità, è una retta che passa per l'origine e divide per metà le ordinate della tangente alla parabola nell'origine;

10° nella stessa ipotesi il luogo dei fuochi di tutte le parabole è una retta che passa per l'origine ed è perpendicolare alla retta che forma un angolo uguale a 2α con l'asse positivo delle x ;

11° nella stessa ipotesi l'involuppo di tutte le parabole è la retta che passa per l'origine e forma un angolo uguale ad α con l'asse positivo delle x .

BOLOGNA.

Risoluzione del Prof. Giulio Cardoso-Laynes.

I. La tangente nell'origine delle coordinate ad una conica

$$(1) \quad a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y = 0$$

è

$$a_{13}x + a_{23}y = 0,$$

quindi nel nostro caso, essendo

$$(2) \quad x^2 + 2hy(1 + \cos 2\alpha) - 2hx \sin 2\alpha = 0$$

l'equazione della conica, quella della tangente nell'origine sarà:

$$y(1 + \cos 2\alpha) - x \sin 2\alpha = 0$$

cioè

$$(3) \quad y = x \operatorname{tg} \alpha,$$

ciò che prova la 1ª parte della questione.

II. La direttrice della (1) è data da

$$A_{13}x + A_{23}y = \frac{A_{11} + A_{22}}{2},$$

dove con A_r s'indicano gli elementi reciproci di a_{rs} nel discriminante della (1), perciò nel nostro caso essendo

$$A_{11} = -h^2(1 + \cos 2\alpha)^2, \quad A_{22} = -h^2 \sin^2 2\alpha, \quad A_{13} = 0, \quad A_{23} = -h(1 + \cos 2\alpha),$$

avremo

$$y = \frac{h \{(1 + \cos 2\alpha)^2 + \sin^2 2\alpha\}}{2(1 + \cos 2\alpha)} \quad \text{cioè} \quad y = h$$

dunque la direttrice della (2) è la parallela condotta dal punto $A \equiv (0, h)$ all'asse delle x .

III. Il circolo che ha per diametro OA , ha per equazione

$$(4) \quad x^2 + y^2 - hy = 0.$$

Questo incontra la retta (3) nei punti le cui ascisse son radici dell'equazione

$$x^2(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) = h \operatorname{tg} \alpha,$$

cioè $x_1 = 0$ e $x_2 = h \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$

e perciò le ordinate corrispondenti sono

$$y_1 = 0 \quad \text{e} \quad y_2 = h \operatorname{sen}^2 \alpha.$$

Dunque il circolo (4) e la retta (3), oltre che nell'origine, s'incontrano nel punto B che ha per coordinate

$$(5) \quad x = h \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha, \quad y = h \operatorname{sen}^2 \alpha.$$

Ora osserviamo che l'asse della parabola (1) è dato da

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13} + \frac{A_{13}}{a_{11} + a_{22}} = 0$$

cioè nel nostro caso,

$$(6) \quad x = h \operatorname{sen} 2\alpha,$$

e perciò, dovendo il vertice D essere il punto d'incontro (a distanza finita) della (6) con la (2), avrà per coordinate

$$(7) \quad x = h \operatorname{sen} 2\alpha, \quad y = h \operatorname{sen}^2 \alpha;$$

ed allora facilmente si vede che la tangente nel vertice D è la

$$y = h \operatorname{sen}^2 \alpha$$

la quale, come si vede dalla (5) è la parallela condotta da B all'asse delle x .

IV. La tangente nel vertice incontra l'asse delle y nel punto $C \equiv (0, h \operatorname{sen}^2 \alpha)$. Dalle (5) (7) è evidente che B è il punto medio di CD.

V. Sia $F \equiv (x_0, y_0)$ il fuoco della parabola. Poichè il vertice D ha per coordinate le (7), ed il punto d'incontro dell'asse della parabola con la direttrice $y = h$ ha per coordinate $(h \operatorname{sen} 2\alpha, h)$ avremo

$$(8) \quad x_0 = h \operatorname{sen} 2\alpha,$$

e y_0 deve essere tale che sia $h \operatorname{sen}^2 \alpha = \frac{h + y_0}{2}$, cioè

$$(8') \quad y_0 = -h \cos 2\alpha.$$

Le coordinate dei fuochi possono anche trovarsi direttamente per mezzo delle note equazioni

$$\left(\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = (a_{11} - a_{22})f(x, y), \quad \left(\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial y}\right) = a_{12}f(x, y)$$

che nel nostro caso divengono rispettivamente

$$(x - h \operatorname{sen} 2\alpha)^2 - h^2 (1 + \cos 2\alpha)^2 = x^2 + 2hy(1 + \cos 2\alpha) - 2hx \operatorname{sen} 2\alpha$$

e

$$(x - h \operatorname{sen} 2\alpha)(1 + \cos 2\alpha)h^2 = 0.$$

La seconda infatti dà subito $x = h \operatorname{sen} 2\alpha$, e la 1^a che per la 2^a può facilmente ridursi alla forma

$$2y(1 + \cos 2\alpha) - h \operatorname{sen}^2 2\alpha + h(1 + \cos 2\alpha)^2 = 0$$

dà

$$y = -h \cos 2\alpha.$$

Ora osserviamo che essendo $A \equiv (0, h)$ e $F \equiv (h \operatorname{sen} 2\alpha, -h \cos 2\alpha)$ il punto B le cui coordinate son date dalla (5) è evidentemente il punto medio di AF.

VI. Eliminando α dalle (7) si ha

$$\frac{x^2}{h^2} = \frac{4y(h - y)}{h^2}$$

cioè

$$x^2 + 4y^2 - 4hy = 0$$

la quale equazione rappresenta un'ellisse di centro $(0, \frac{h}{2})$. Trasportando l'origine degli assi in questo punto con una semplice traslazione, l'equazione precedente diviene

$$\frac{x^2}{h^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{h}{2}\right)^2} = 1,$$

dalla quale si vede chiaramente che le lunghezze degli assi sono rispettivamente $2h$ e h .

VII. Eliminando invece α dalle (8), (8') che danno le coordinate dei fuochi, si ha

$$x^2 + y^2 = h^2$$

cioè l'equazione del circolo di raggio h , che ha il centro nell'origine.

VIII. Vediamo ora qual'è l'involuppo delle parabole al variare di α .

Dalla (2) si ha

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = -4hy \operatorname{sen} 2\alpha - 4hx \operatorname{cos} 2\alpha.$$

L'equazione $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 0$ dà $\operatorname{tg} 2\alpha = -\frac{x}{y}$

e quindi

$$\operatorname{cos} 2\alpha = \pm \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \operatorname{sen} 2\alpha = \mp \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

e sostituendo questi valori nella (2) si ha

$$x^2 + 2hy \pm 2h \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

cioè

$$x^4 + 4hx^2y - 4h^2x^2 = 0$$

la quale si scinde nelle due segmenti

$$\begin{aligned} x^2 &= 0 \\ x^2 + 4hy - 4h^2 &= 0. \end{aligned}$$

Quest'ultima rappresenta una parabola. Trasportando con una traslazione l'origine in $(0, h)$ la precedente equazione diviene

$$x^2 = -4hy$$

la quale ci mostra che A è il vertice della parabola e che, il parametro essendo $2h$, il fuoco sarà alla distanza h dal vertice, e poichè tale distanza va contata nel senso negativo delle ordinate, il fuoco sarà in O .

IX. Dalle (7) eliminando h si ha $\frac{x}{\operatorname{sen} 2\alpha} = \frac{y}{\operatorname{sen}^2 \alpha}$ cioè $x \operatorname{sen} \alpha - 2y \operatorname{cos} \alpha = 0$, da cui

$$y = \frac{1}{2} \operatorname{tg} \alpha x.$$

X. Dalle (8), (8') eliminando h , si ha invece $\frac{x}{\operatorname{sen} 2\alpha} + \frac{y}{\operatorname{cos} 2\alpha} = 0$ cioè

$$y = -\frac{1}{\operatorname{tg} 2\alpha} x.$$

XI. Finalmente dalla (2) si ha

$$\frac{\partial f}{\partial h} = 2y(1 + \operatorname{cos} 2\alpha) - 2x \operatorname{sen} 2\alpha$$

e perciò la $\frac{\partial f}{\partial h} = 0$ ci dà

$$y = x \frac{\operatorname{sen} 2\alpha}{1 + \operatorname{cos} 2\alpha} = x \operatorname{tg} \alpha.$$

Altra risoluzione del sig. Radolfe.

QUISTIONI PROPOSTE

354. (*) Dati in un piano due cerchi, la conica k^2 avente per fuochi i loro centri, e inscritta nel quadrilatero delle tangenti nei punti al finito comuni, è bitangente al cerchio radicale dei cerchi dati: il luogo dei punti di mezzo delle corde (reali o ideali), che le tangenti di k^2 staccano nei due cerchi, è il cerchio radicale.

381. (*) Due parabole omofocali hanno le direttrici parallele, ed r è la bisettrice della striscia formata da queste direttrici: dimostrare che lo involuppo delle rette simmetriche di r rispetto a una tangente variabile dell'una o dell'altra parabola è un medesimo cerchio

V. RETALI.

397. Un determinante D_n di ordine n , in cui un termine qualunque $a_{r,s}$ è nullo, se r ed s differiscono tra loro per più che un'unità, diventa $(-1)^n D_n$, se si cambiano di segno gli elementi della diagonale principale. Se n è dispari ed i termini principali sono anch'essi nulli, il determinante D_n è nullo.

G. FUBINI.

398. Se A, B, C sono i punti di fuga di 3 rette 2 a 2 ortogonali sopra un piano σ d'una rappresentazione prospettiva, e sono rispettivamente O, R il centro ed il raggio del cerchio di distanza, si ha identicamente

$$\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} = \left(\frac{1}{R}\right)^2.$$

In che senso questa quistione si può considerare come un corollario della quistione 293?

A. DEL RE.

399. Un punto A percorre una curva $f(x, y) = 0$; un altro punto B si muove in modo che restino costanti la distanza BA e l'angolo che il raggio vettore BA fa colla tangente della traiettoria di B .

Si domanda in qual modo si può determinare 1° l'equazione della traiettoria di B , 2° il rapporto delle velocità di B ed A .

Si studi particolarmente il caso in cui A percorre una retta con moto uniforme.

(Questo problema si presenta nel caso che una nave voglia inseguirne un'altra, mantenendosi a distanza determinata da essa e rilevandola sotto un angolo determinato).

400. Un punto A percorre una curva $f(x, y) = 0$ con velocità V . Un punto B percorre con velocità V' una curva tale che in ogni istante la tangente in B passi per il punto A . Si domanda come si possa trovare l'equazione della traiettoria di B . Si studi il caso particolare in cui A percorre una retta o altri casi particolari.

G. LAZZERI.

(*) Il prof. Barozzini scrisse alla Direzione, notando che gli enunciati delle quistioni 354, 381 erano inesatti; contemporaneamente l'autore delle medesime prof. Retali inviò gli enunciati rettificati, che qui pubblichiamo.

(Nota del Direttore).

401. Determinare lo involuppo di un cerchio, il cui centro percorre una curva piana C , e che tocca una retta fissa r del suo piano: trovare il punto di contatto del cerchio mobile col suo involuppo; e dimostrare che quest'ultimo è pure lo involuppo delle rette simmetriche di r rispetto alle tangenti di C . Esaminare il caso particolare in cui C è una conica.

V. RETALI.

402. Il luogo geometrico del vertice di un triangolo, di cui la base rimane fissa e nel quale gli angoli ad essa adiacenti differiscano costantemente di 90° , è una iperbole equilatera.

E. PICCIOLI.

403. Sieno c e c' due cerchi posti nello stesso piano, che s'incontrino in due punti H e K .

Considerando un triangolo variabile AMB , il cui lato AB passi per H e gli altri due lati AM, BM sieno tangenti rispettivamente ai cerchi c e c' nei punti A e B , dimostrare che il luogo del terzo vertice M è una *cardioide* che ha per regresso il punto K .

404. Il luogo dei fuochi di tutte le iperbole equilatera di un piano, concentriche in O e passanti per uno stesso punto M è la *lemniscata di Bernoulli* che ha il centro in O e un fuoco in M .

G. CARDOSO-LAYNES.

BIBLIOGRAFIA

A. SOCCI e G. TOLOMEI. — *Gli elementi di Euclide*. — Firenze, Succ. Le Monnier, 1897.

Pensando che taluni professori continuano tuttora a tener per guida nell'insegnamento gli "Elementi di Euclide", e'è da domandarsi, e con ragione, se in tanti secoli la Geometria non abbia affatto progredito e se nessun trattato moderno sia scientificamente e didatticamente pregevole. Che il testo euclideo puro e semplice abbia molte lacune e molti difetti è fuori di dubbio: va dunque ampliato e corretto per adattarlo alle nostre scuole, ma allora di Euclide che cosa resta?... Questo ho voluto notare perchè mi sembra giusto; ma siccome vi son sempre in Italia molti insegnanti, che stimano conveniente adottare il testo euclideo, era davvero sentito il bisogno di una nuova edizione dell'opera del grande geometra greco; perciò non fuori di proposito è uscita dalla casa editrice Le Monnier di Firenze una nuova edizione degli elementi di Euclide, per cura dei professori Socci e Tolomei.

Questa, per certi riguardi è superiore alle altre precedentemente pubblicate. In essa infatti gli autori non hanno conservato il testo secondo la traduzione del Viviani, ma l'hanno migliorato assai stilisticamente, hanno cambiato alcune denominazioni che più non si confacevano all'uso moderno, come ad es. *retta per segmento, figure eguali per equivalenti* ecc.; hanno aggiunto quei postulati che in Euclide erano ammessi tacitamente e così pure molti teoremi e corollari che mancavano nel testo, e le dimostrazioni di questi sono condotte, in generale, con rigore

scientifico. È stata aggiunta ancora un'appendice sulla " *Misura* ", e riordinate e collegate le proposizioni di Geometria solida, colmandone le lacune.

Certamente il libro dei prof. Socci e Tolomei non è privo di mende, che spero vedere tolte in una prossima edizione. Accennerò alla poca precisione nel dare alcune definizioni come, ad es., quella di rette parallele: (L. I, pag. 70) *Due rette si dicono parallele, quando... cioè PROLUNGATE INDEFINITAMENTE... non s'incontrano e quest'altra: (pag. 10) un punto O si dice esterno (ad un segmento) quando si trova sul prolungamento del segmento.* Noterò ancora che a pag. 1 e 2 è detto: " *il limite... che separa due parti di uno stesso corpo si chiama SUPERFICIE* ", e " *il limite che separa due parti di una superficie... si chiama LINEA* ". Queste definizioni, quantunque si trovino in quasi tutti i trattati di geometria, non mi sembrano esatte: per esse infatti, ad es., ciò che separa le due falde di una superficie conica sarebbe una linea o ciò che separa i due solidi corrispondenti sarebbe una superficie, mentre è chiaro che in questo caso, tanto le due parti contigue di superficie, quanto le due parti contigue di solido sono separate da un punto; analogamente si potrebbero citare altri esempi.

Così pure alcuni enunciati di teoremi sono inesatti, come ad es. quello della Prop. A del 1° libro: 3) *di due segmenti obliqui, DISEGUALMENTE DISTANTI dal piede della perpendicolare, il più LONTANO è il maggiore:* anche ammettendo che in Geometria la frase " *segmento più o meno LONTANO da un punto* ", abbia un significato non sarebbe certo quello che le danno gli A.

Un errore assai grave trovasi a pag. 27 dove è detto: "... *una retta è individuata da due sole condizioni...* ": ciò non è vero sempre; analiticamente parlando sarà vero quando le condizioni date sieno traducibili in relazioni lineari fra le due indeterminate dell'equazione di una retta, ma soltanto allora; del resto, in Geometria elementare quella proposizione, anche se fosse vera, come potrebbe giustificarsi?

Tralasciando di notare altre mende che ho riscontrato, come conclusione dirò che, secondo il mio debole parere, nelle scuole classiche possono con più profitto usarsi dei buoni trattati moderni di Geometria, ma volendo adottare un rifacimento più o meno fedele degli " *Elementi di Euclide* ", il libro dei Prof. Socci e Tolomei è certo il più indicabile.

Dott. G. CARDOSO-LAYNES.

DA GIORNALI E RIVISTE

Dal *Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.*

Il problema delle 3 bisettrici.

Nel fascicolo 8 (Heft 8. Dez. 1896) del " *Zeitschrift etc...* " il Prof. Heymann invitava i colleghi a studiare la questione di *determinare i 3 lati a, b, c, di un triangolo, conoscendo di grandezza le 3 bisettrici w_a, w_b, w_c .*

Questa stessa questione era stata posta nella " *Rivista matematica* ", di Peano Vol. II, pag. 34 sotto la forma seguente:

Costruire il triangolo avente per bisettrici interne tre segmenti dati, usando soltanto di rette e circoli. In caso d'impossibilità provarla.

Nella successiva annata del " *Zeitschrift etc.* [1897] sono comparsi due articoli riguardanti la questione enunciata che credo utile riassumere.

Dr. A. KORSZELT, LÜBAN [Zeitschrift etc., Heft 2, Marzo 1897]. *Un triangolo non può in generale esser costruito geometricamente date le 3 bisettrici.*

In questo articolo l'A. parte dalla nota formula

$$w_a^2 = \frac{4bc s(s-a)}{(b+c)^2},$$

ove s è il semiperimetro, e calcola $w_a^2 - w_b^2$, deducendo dalla espressione trovata, che se $w_a \geq w_b$, deve essere corrispondentemente $b \geq a$, e inversamente.

Considera poi il caso particolare in cui $w_a = w_b = w$, ponendo $\frac{w_c}{w} = \frac{1}{2} m$ $\frac{a}{c} = \frac{x-1}{2}$, e trova così: $\left(\frac{w_c}{w}\right)^2 = \frac{(x+1)^2(x-2)}{8(x-1)} = \frac{m^2}{4}$ da cui si ricava l'equazione di 3° grado

$$(1) \quad x^3 - (2m^2 + 3)x + 2m^2 - 2 = 0.$$

Dimostra poi che ogni radice della equazione del 3° grado trovata si può esprimere razionalmente per mezzo di una delle altre, ed osserva che per valori generali di m la (1) è irriducibile, e che quindi una radice qualunque della (1) non potendo esprimersi per soli radicali quadratici, si può concludere della irrisolvibilità geometrica del problema per mezzo di sole rette e circonferenze.

L'autore fa osservare infine che se m ha la forma

$$m = \frac{n(3-n^2)}{2-n^2},$$

ove $n = 2 \sqrt{\frac{x-2}{2(x-1)}}$, la x si può costruire geometricamente, e quindi per questo solo valore di m il problema delle 3 bisettrici, nel caso del triangolo isoscele è geometricamente risolubile

Dr. W. HEYMANN. *Il problema delle 3 bisettrici.*

L'A. divide l'articolo in 8 paragrafi.

Nel 1°, parte dalle formole:

$$\begin{aligned} w_1^2 (x_2 + x_3)^2 &= x_2 x_3 (x_1 + x_2 + x_3) (-x_1 + x_2 + x_3), \\ w_2^2 (x_3 + x_1)^2 &= x_3 x_1 (x_1 + x_2 + x_3) (x_1 - x_2 + x_3), \\ w_3^2 (x_1 + x_2)^2 &= x_1 x_2 (x_1 + x_2 + x_3) (x_1 + x_2 - x_3), \end{aligned}$$

e le analoghe per le bisettrici esterne $w_1'^2, w_2'^2, w_3'^2$ nelle quali x_1, x_2, x_3 indicano le lunghezze dei lati e suddivide il problema nei 3 gruppi di problemi seguenti, variando i dati.

I gruppo:

$$a) w_1 w_2 w_3, \quad b) w_1 w_2' w_3', \quad c) w_1' w_2 w_3', \quad d) w_1' w_2' w_3.$$

II gruppo:

$$a) w_1' w_2' w_3', \quad b) w_1' w_2 w_3, \quad c) w_1 w_2' w_3, \quad d) w_1 w_2 w_3'.$$

III gruppo in cui i dati sono le 12 combinazioni ancora mancanti delle sei quantità $w_1 w_2 w_3 w_1' w_2' w_3'$ prese 3 a 3.

Fa vedere poi che i problemi di ciascun gruppo possono ridursi l'uno all'altro,

e che quindi, trovata la soluzione di uno dei problemi del gruppo, gli altri sono in conseguenza risolti.

Osserva che i Problemi del I e III gruppo non sono fino ad oggi risolti poichè secondo le più recenti ricerche il calcolo conduce ad equazioni del 10° grado. Al contrario quelli del gruppo II possono essere algebricamente risolti mediante equazioni quadratiche e cubiche.

Nei successivi §§ l'A. passa al calcolo effettivo delle formole che risolvono il problema del 2° gruppo, calcoli che sarebbe qui troppo lungo riassumere.

AROLDÒ MARTINI ZUCCAGNI.

VARIETÀ

La biblioteca Boncompagni. — Sta per cominciare, se già non è incominciata, l'asta pubblica per la vendita alla spicciolata delle opere che compongono questa magnifica e famosa biblioteca. Così la più grande e preziosa raccolta privata di opere matematiche, che esista, messa insieme in un mezzo secolo dal principe Baldassare Boncompagni con ingenti spese, continui studi ed accurate indagini andrà dispersa ai quattro venti, e in gran parte fuori d'Italia.

È doloroso che il Governo, il Municipio di Roma, gl'Istituti nazionali non abbiano voluto impedire che tanto lavoro andasse perduto, ed assistano indifferenti allo smembramento di una collezione così preziosa.

Bollettino di Bibliografia e storia delle scienze matematiche pubblicato per cura di G. Loria. — Questo bollettino nacque lo scorso anno, sotto forma di appendice del giornale di Battaglini. D'ora in avanti, staccato completamente da questo giornale, verrà pubblicato dall'editore Clausen in fascicoli di 32 pagine (quattro per anno), e conterrà principalmente articoli relativi alla storia della matematica, recensioni, programmi e riassunti di corsi universitari necrologie, notizie scientifiche.

È noto con quanto ardore e altezza d'ingegno il Prof. G. Loria, il giovane e valente di professore di geometria superiore dell'Università di Genova, si è dedicato agli studi di storia e bibliografia matematica, e per conseguenza è certo che sarà da lui ben diretto il nuovo *Bollettino*, al quale inviamo i più sinceri auguri.

Premio Lobatchefsky. (1° concorso - 1897). — L'Accademia Scientifica di Kasan per onorare la memoria di Lobatchefsky, ha istituito questo premio di 500 rubli, da conferirsi ogni tre anni, alla migliore fra le opere relative alla geometria, e di preferenza alla geometria non-euclidea, pubblicate nei sei anni precedenti al giudizio della società.

Il primo di questi premi è stato conferito a S. Lie per la sua *Theorie der Transformations-gruppen. Band III* (Leipzig, 1893). Vennero poi conferite le seguenti menzioni onorevoli:

1° al sig. L. Gérard di Lione per la sua *Thèse sur la géométrie non-euclidienne* (Paris, 1892).

2° al Prof. E. Cesaro dell'Università di Napoli per le sue *Lezioni di geometria intrinseca* (Napoli, 1896).

3° al sig. E. Fontené del collegio Rollin per la sua opera *L'hyperspace a n-1 dimensions* (Paris, 1893).

La Società ha conferito una medaglia d'oro a F. Klein per la sua interessantissima relazione intorno al risultato del concorso, che è stata pubblicata per cura della stessa società col titolo *Zur ersten Verteilung des Lobatchefsky Preises*.

Il 2° premio sarà conferito il 3 novembre 1900. Le opere destinate al concorso devono essere dirette alla *Société Physico-mathématique de Kasan* prima del 3 novembre 1900.

GIULIO LAZZERI — Direttore-responsabile

Finito di stampare il 27 Febbraio 1898.

SULLA TEORIA DELLA DIVISIONE E DELL'ESTRAZIONE DI RADICE

DI

OTTO STOLZ

DELL'UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK

Le note regole che servono per eseguire sui numeri interi e frazionari la divisione e l'estrazione di radice si possono formulare con esattezza non solo, ma anche rigorosamente dimostrare in modo sistematico e semplicissimo come ora vedremo.

Nelle dimostrazioni che seguono ci limiteremo ai numeri del sistema decimale. Se si volessero estendere i teoremi ad un sistema a base $e > 1$ basterebbe porre e in luogo di 10 e ricordare che allora i numeri da introdursi come cifre sono $0, 1, 2, \dots, e - 1$.

I. — Divisione dei numeri interi.

Innanzitutto determineremo il numero delle cifre del quoziente completo o incompleto di due numeri naturali.

1. LEMMA. — Se b è un numero di n cifre, q un numero di k cifre ed r è 0 o un numero naturale minore di b , il numero $bq + r$ ha $n+k-1$ o $n+k$ cifre.

Dalle ipotesi fatte risulta immediatamente

$$\begin{aligned} 10^{n-1} &\leq b \leq 10^n - 1, \\ 10^{k-1} &\leq q \leq 10^k - 1, \\ 0 &\leq r < 10^n; \end{aligned}$$

dunque

$$10^{n+k-2} \leq bq + r < (10^n - 1)(10^k - 1) + 10^n < 10^{n+k},$$

la quale dimostra la proposizione enunciata.

2. TEOREMA. — Sia a un numero intero di m cifre, b un altro numero intero di n cifre e precisamente $a > b$, dunque $m \geq n$ e sia inoltre

$$(1) \quad a = bq + r \quad 0 \leq r < b.$$

Il quoziente q ha $m-n$ o $m-n+1$ cifre, secondo che le prime n cifre del dividendo formano un numero minore o non minore di b .

Secondo il lemma precedente, se k indica il numero incognito delle cifre del numero q deve essere $m = n + k$, ovvero $m = n + k - 1$ quindi $k = m - n$ o $k = m - n + 1$.

Per vedere quando si verifica l'uno o l'altro di questi casi, si procede nel modo seguente.

Come conseguenza immediata della (1) si ha

$$(2) \quad bq \leq a < b(q + 1).$$

Se s' indica con a' il numero formato dalle prime n cifre di a , avremo

$$(3) \quad a = a' 10^{m-n} + a'', \quad 0 \leq a'' < 10^{m-n},$$

da cui

$$(4) \quad a' 10^{m-n} \leq a < (a' + 1) 10^{m-n}.$$

Dalle relazioni (2) e (4) si deduce quanto segue.

Se $a' < b$ e quindi $a' + 1 \leq b$, per le relazioni citate si ha

$$bq \leq a < b 10^{m-n},$$

e conseguentemente

$$q < 10^{m-n}.$$

In questo caso q non può avere $m - n + 1$ cifre e ne avrà perciò $m - n$.

Se è invece $a' \geq b$, si ha analogamente

$$b 10^{m-n} \leq a < b(q + 1),$$

da cui segue

$$10^{m-n} < q + 1,$$

cioè

$$10^{m-n} \leq q;$$

q dovrà dunque avere almeno $m - n + 1$ cifre, e siccome abbiamo visto che non può averne più di questo numero si può concludere che ha $m - n + 1$ cifre.

II. — Divisione dei numeri decimali finiti.

TEOREMA. — Sia α un numero decimale con m cifre significative e 10^p ($p \geq 0$) rappresenti l'ordine della 1^a cifra significativa a sinistra,

sia β un altro numero decimale con n cifre significative e 10^q ($q \geq 0$) rappresenti l'ordine della prima cifra significativa a sinistra. Inoltre sia a' il numero formato con le prime n cifre di α , completato con zeri scritti alla destra nel caso che fosse $m < n$.

Il quoziente $\alpha : \beta$ comincia con unità il cui ordine è rappresentato da 10^{p-q-1} oppure da 10^{p-q} , secondo che a' è minore o non minore del numero intero formato con le n cifre di β .

Questo teorema, di cui la proposizione 2 del § precedente è un caso particolare, si dimostra facilmente, ponendo:

$$\alpha = 10^{p-m+1} a \quad \beta = 10^{q-n+1} b$$

ove a, b sono numeri interi, il primo con m cifre, il secondo con n cifre. (*)

III. — Estrazione della radice m^{esima} .

1. Se la prima cifra significativa a sinistra di un numero decimale β è dell'ordine 10^q ($q \begin{smallmatrix} \geq \\ < \end{smallmatrix} 0$) i limiti fra cui è compreso l'ordine della prima cifra significativa a sinistra in β^m sono

$$mq, \quad mq + m - 1. (**)$$

Ciò posto indichiamo con k l'ordine incognito della prima cifra significativa a sinistra della radice m^{esima} del numero decimale

$$\alpha = a_0 10^p + a_1 10^{p-1} + \dots \quad (p \begin{smallmatrix} \geq \\ < \end{smallmatrix} 0);$$

per quanto si è detto precedentemente dovremo avere

$$mk \leq p \leq mk + m - 1 < m(k + 1);$$

e questo dimostra che k è il quoziente di p per m nel senso ordinario, cioè quel numero intero per cui si ha

$$p = mk + r, \quad k \begin{smallmatrix} \geq \\ < \end{smallmatrix} 0, \quad 0 \leq r < m.$$

(*) Si ha infatti eseguendo il quoziente:

$$\alpha : \beta = 10^{p-q-(m-n)} \frac{a}{b}$$

Se ora indichiamo con a' il numero formato con le prime n cifre di a , completato con zeri se $m < n$, la prima cifra del quoziente di $a : b$ sarà dell'ordine:

$$m - n - 1 \quad 0 \quad m - n$$

secondo che a' è minore o non minore di b .

L'ordine della prima cifra di $\alpha : \beta$ sarà dunque dato da:

$$p - q - (m - n) + m - n - 1 = p - q - 1,$$

se è $a' < b$; e invece da:

$$p - q - (m - n) + m - n = p - q,$$

se è a' non minore di b .

(**) Si ha infatti:

$$10^{q+1} > \beta \geq 10^q,$$

quindi:

$$10^{mq+m} > \beta^m \geq 10^{mq},$$

L'ordine della prima cifra di β^m dovrà dunque essere al minimo mq ed al massimo $mq + m - 1$.

(Note del tradut. A. Martini-Zaccagni).

La radice cercata potrà allora scriversi

$$\sqrt[m]{\alpha} = c_0 10^k + c_1 10^{k-1} + \dots + c_r 10^{k-r} + \dots$$

ed avremo allora

$$(5) \quad c_0 10^k \leq \sqrt[m]{\alpha} < (c_0 + 1) 10^k.$$

2. Si scomponga in classi di m cifre ognuna la parte intera di α , andando da destra a sinistra, e la parte decimale andando invece da sinistra a destra, dimodochè il numero α sia ridotto alla forma:

$$(6) \quad \alpha = C_0 10^{mk} + C_1 10^{m(k-1)} + \dots + C_r 10^{m(k-r)} + \dots$$

in cui C_0, C_1, \dots sono numeri interi al più di m cifre.

Determiniamo allora la prima cifra c_0 di $\sqrt[m]{\alpha}$.

Se C_0 è la m^{esima} potenza di uno dei numeri naturali $1, 2, 3, \dots, 9$ questo numero sarà appunto la cifra cercata c_0 . Altrimenti per c_0 si prende quello fra i detti numeri la cui m^{esima} potenza è più approssimata per difetto a C_0 . Sarà cioè

$$c_0^m = C_0,$$

oppure

$$c_0^m < C_0 < (c_0 + 1)^m.$$

Infatti dalle (5) e (6) risultano le relazioni

$$c_0^m 10^{mk} \leq \alpha < (c_0 + 1)^m 10^{mk},$$

$$C_0 10^{mk} \leq \alpha < (C_0 + 1) 10^{mk},$$

quindi

$$c_0^m 10^{mk} < (C_0 + 1) 10^{mk}, \quad C_0 10^{mk} < (c_0 + 1)^m 10^{mk},$$

ovvero

$$c_0^m < C_0 + 1, \quad C_0 < (c_0 + 1)^m,$$

e quindi sarà

$$c_0^m \leq C_0 < (c_0 + 1)^m.$$

3. La determinazione delle cifre successive di $\sqrt[m]{\alpha}$ si fonda sul noto teorema che, se A è un numero positivo la cui m^{esima} potenza è $< \alpha$, e si pone

$$\sqrt[m]{\alpha} = A + x,$$

è allora

$$(7) \quad 0 < x < \frac{\alpha - A^m}{mA^{m-1}}.$$

“ Supponiamo ora di conoscere già le prime r cifre

$$c_0, c_1, c_2, \dots, c_{r-1}$$

di $\sqrt[m]{\alpha}$, e poniamo

$$A = c_0 10^k + c_1 10^{k-1} + \dots + c_r 10^{k-r+1},$$

se alla frazione $\frac{\alpha - A^m}{mA^{m-1}}$ diamo la forma

$$(8) \quad \frac{\alpha - A^m}{mA^{m-1}} = g_r 10^{k-r} + R,$$

in cui g_r è un numero intero ed R soddisfa alla relazione

$$(9) \quad 0 \leq R < 10^{k-r}$$

avremo allora

$$(10) \quad c_r \leq g_r.$$

Se si pone infatti

$$(11) \quad x = c_r 10^{k-r} + c_{r+1} 10^{k-r-1} + \dots$$

avremo

$$c_r 10^{k-r} \leq x,$$

e per le relazioni (7), ..., (9)

$$x < (g_r + 1) 10^{k-r},$$

quindi

$$c_r < g_r + 1, \text{ cioè } c_r \leq g_r.$$

Abbiamo così un limite superiore per c_r e si determina allora per tentativi la cifra c_r , per cui si ha

$$(A + c_r 10^{k-r})^m \leq \alpha < (A + (c_r + 1) 10^{k-r})^m.$$

Questa ricerca si può facilitare, determinando anche il limite inferiore di c_r .

4. Un tal limite si determina con l'aiuto della relazione

$$(12) \quad B - \frac{m-1}{2A} B^2 < x \quad (*)$$

(*) Se ω è un numero positivo < 1 e μ è pure un numero positivo < 1 nello sviluppo $(1+\omega)^\mu$ i termini successivi al 2° sono alternativamente negativi e positivi e siccome sono continuamente decrescenti, avremo la relazione:

$$1 + \mu\omega > (1 + \omega)^\mu > 1 + \mu\omega + \frac{\mu(\mu-1)}{1 \cdot 2} \omega^2,$$

e quindi:

$$0 < 1 + \mu\omega - (1 + \omega)^\mu < \frac{\mu(1-\mu)}{1 \cdot 2} \omega^2,$$

la quale vale del resto anche se $\omega > 1$, com'è facile dimostrare considerando lo sviluppo di

$$\left(1 - \frac{\omega}{1+\omega}\right)^\mu \text{ per } \omega > 1.$$

Facendo in questa:

$$\mu = \frac{1}{m}, \quad \omega = \frac{\alpha - A^m}{A^m} < 1,$$

abbiamo:

$$1 + \frac{\alpha - A^m}{mA^m} - \left(\frac{\alpha}{A^m}\right)^{\frac{1}{m}} < \frac{m-1}{2m^2} \left(\frac{\alpha - A^m}{A^m}\right)^2.$$

Ponendo in questa:

$$B = \frac{\alpha - A^m}{mA^{m-1}},$$

e moltiplicando i due membri per A :

$$A + B - \sqrt[m]{\alpha} < \frac{m-1}{2A} B^2,$$

da cui immediatamente:

$$B - \frac{m-1}{2A} B^2 < \alpha.$$

(Nota del Traduttore).

in cui è posto

$$B = \frac{\alpha - A^m}{mA^{m-1}}.$$

Dalla (8), abbiamo

$$g_r \cdot 10^{k-r} \leq B < (g_r + 1) 10^{k-r},$$

e poichè $A > c_0 10^r$, da questa relazione si ricava

$$(13) \quad g_r \cdot 10^{k-r} - \frac{m-1}{2c_0} (g_r + 1)^2 10^{k-2r} < B - \frac{m-1}{2A} B^2.$$

Osservando ora che per la (11) è $x < (c_r + 1) 10^{k-r}$, dalle (12) e (13), dopo averle moltiplicate per 10^{r-k} , si ha

$$(14) \quad g_r - \frac{m-1}{2c_0} \frac{(g_r + 1)^2}{10^r} < c_r + 1.$$

Se è

$$\frac{m-1}{2c_0} \frac{(g_r + 1)^2}{10^r} < 1$$

dalla (14), essendo g_r intero, si deduce

$$g_r - 1 \leq c_r.$$

Da questa e dalla (12) si deduce che in questo caso deve essere c_r uguale a g_r o $g_r - 1$.

N. B. Più abituale del precedente uso della disuguaglianza (12) è il seguente.

Si calcoli il quoziente $\frac{\alpha - A^m}{mA^{m-1}}$ a meno di unità di ordine di $r - 2$ volte più grande, cosicchè in luogo della (8) si ha la formola

$$B = h 10^{k-2r+2} + R', \quad 0 \leq R' < 10^{k-2r+2}$$

in cui h è un numero intero. Allora con ragionamenti analoghi a quelli del § 4, si perviene alla relazione

$$10^{k-2r+2} \left(h - \frac{m-1}{2c_0} \frac{(h+1)^2}{10^{2r-2}} \right) < x < (h+1) 10^{k-2r+2}.$$

Ordinariamente h è un numero di $r-1$ cifre, quindi $h+1 \leq 10^{r-1}$, e perciò si avrà

$$10^{k-2r+2} \left(h - \frac{m-1}{2c_0} \right) < x < (h+1) 10^{k-2r+2}. (*)$$

O. STOLZ.

(*) Più ampie applicazioni di quest'ultima formola si trovano nella pregevolissima opera dell'Autore: *Vorlesungen über allgemeine Arithmetik*, I, pag. 310.

DISCUSSIONE ELEMENTARE DEI CASI DI PLURIOMOLOGIA DEI TETRAEDRI

Si deve a *Schröter* ed a *Rosanes* la discussione dei casi di pluriomologia dei triangoli (*Math. Annalen*. V^{mo} 2). La discussione analoga per i tetraedri è stata fatta da *Ed. Hess*, nella memoria: *Beiträge zur Theorie der mehrfach perspective Dreiecke und Tetraeder* (*Math. Ann.* V^{mo} 28), ove sono trattati dettagliatamente i diversi casi, sia pel triangolo sia pel tetraedro. I tetraedri omologici in 4 modi, o tetraedri desmici, erano già stati studiati a fondo da *Stephanos*, *Veronese*, *Reye*, *Viator* ecc. *Hess* dimostrò che solo un altro caso è possibile, quello dei tetraedri omologici in due soli modi, e dette pure qualche proprietà di questi tetraedri. Il procedimento di *Hess* è analitico, e quello delle altre memorie trattanti questo argomento non è nemmeno elementare; solo *Schröter* in una memoria del giornale di *Crelle* (*) V^{mo} 109 si propose di dimostrare elementarmente le proprietà fondamentali dei tetraedri desmici, partendo da una costruzione data a priori.

Lo scopo della presente nota è di rifare la discussione di *Hess*, ma in modo sintetico e del tutto elementare; e di dedurre dalla costruzione effettiva dei tetraedri omologici in due ed in quattro modi le loro proprietà principali.

1. Se due tetraedri *completamente distinti* ABCD, A'B'C'D' sono omologici, in modo che le congiungenti AA', BB', CC', DD', passino per un punto O, ciò si indicherà brevemente scrivendo: $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$. Può darsi, che sostituendo nella scrittura precedente ad A'B'C'D' una delle permutazioni tra le 4 lettere, si abbia un'altra omologia, con un altro centro O'. Allora i tetraedri ABCD, A'B'C'D' si dicono omologici in due modi. Dobbiamo ora ricercare quale delle permutazioni bisogna scegliere perchè ciò sia possibile.

2. Tra le permutazioni delle lettere A', B', C', D' si vede facilmente che bisogna scartare quelle che lasciano al loro posto una o due lettere. Infatti, se insieme alla omologia $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$ si avesse ad esempio l'altra $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & C' & D' & B' \end{array} \right|$, i due triangoli BCD, B'C'D' non situati in un piano (per l'ipotesi dei tetraedri distinti) sarebbero omologici in due modi; e ciò non può essere, perchè allora si avrebbe un asse di omologia comune ai due modi, cioè l'intersezione dei piani dei due triangoli.

3. Le permutazioni restanti non lasciano nessuna lettera al suo posto;

(*) Elementar Construction der Figur dreier in desmischer Lage befindlichen Tetraeder.

esse sono le sei permutazioni dispari: $B'C'D'A'$, $B'D'A'C'$, $C'A'D'B'$, $C'D'B'A'$, $D'A'B'C'$, $D'B'C'A'$, e le tre pari $D'C'B'A'$, $B'A'D'C'$, $C'D'A'B'$.

Se si avessero le due omologie $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$, $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ B' & C' & D' & A' \end{array} \right| O'$, lo spigolo AB si appoggerebbe tanto ad $A'B'$ quanto a $B'C'$, e perciò conterrebbe il punto B' d'incontro di queste rette; similmente lo spigolo CD si appoggerebbe tanto a $C'D'$ quanto a $D'A'$, quindi conterrebbe il punto D' comune a queste rette. Allora si avrebbe questo assurdo che le BB' , DD' ossia i due spigoli opposti AB , CD si dovrebbero incontrare nel centro di omologia O . In modo del tutto analogo si arriva alla esclusione delle permutazioni $B'D'A'C'$, $C'A'D'B'$, $D'A'B'C'$, $D'B'C'A'$, così delle permutazioni dispari rimane $C'D'B'A'$. Se si avessero le due omologie $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$, $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ C' & D' & B' & A' \end{array} \right| O'$, lo spigolo AC si appoggerebbe tanto ad $A'C'$ quanto a $C'B'$, quindi conterrebbe il punto C' d'incontro di queste rette; lo spigolo BD si appoggerebbe tanto a $B'D'$ quanto a $D'A'$, quindi conterrebbe il punto D' d'incontro di queste rette; ed allora, come nel caso precedente si avrebbe l'assurdo che i due spigoli opposti AC , BD (coincidenti rispettivamente con CC' , DD') si dovrebbero incontrare nel centro d'omologia O .

Così restano escluse tutte le permutazioni tranne queste tre: $D'C'B'A'$, $B'A'D'C'$, $C'D'A'B'$.

4. Dato un tetraedro $ABCD$ ed un punto O , sia proposto di trovare un punto O' ed un tetraedro $A'B'C'D'$ in modo da avere: $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$, $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ D' & C' & B' & A' \end{array} \right| O'$. Si unisca O con A, B, C, D ; siccome i punti B', C' si debbono trovare rispettivamente su OB, OC , il centro O' della seconda omologia, incontro di BC' con CB' deve stare nel piano OBC ; i punti A', D' dovendo stare su OA, OD , lo stesso punto O' , come incontro di AD' con $A'D$, deve trovarsi nel piano OAD , dunque O' è nella intersezione l dei piani OBC, OAD . Costruita questa retta l , che passa per O e si appoggia a BC, AD , e scelto su essa comunque il punto O' , il tetraedro richiesto $A'B'C'D'$ risulta determinato ponendo: $A' \equiv AO \cdot O'D$, $B' \equiv BO \cdot O'C$, $C' \equiv CO \cdot O'B$, $D' \equiv DO \cdot O'A$. Difatti le AA', BB', CC', DD' , passano per O e le AD', BC', CB', DA' per O' .

Le stesse considerazioni precedenti valgono per le altre due permutazioni $B'A'D'C'$, $C'D'A'B'$.

Riconosciuta così l'esistenza dei tetraedri biomologici passiamo a dimostrarne alcune proprietà.

5. Pongasi $M \equiv AC \cdot A'C'$, $N \equiv BD \cdot B'D'$; la retta MN trovandosi nei due piani $BC'A', B'CA$, si appoggia ad $A'D, AD'$, ma queste due rette concorrono in O' , dunque MN passa per O' . Similmente si vede che i punti $AB \cdot A'B', CD \cdot C'D'$ stanno allineati con O' . Risulta da ciò che il piano ω della 1ª omologia comprende il centro della 2ª, e similmente il piano ω' della 2ª omologia comprende il centro O della 1ª. Dunque: se due te-

tetraedri sono biomologici il piano di una delle omologie passa per il centro dell'altra (Hess. mem. citata)

6. Dalle considerazioni fatte si deduce la costruzione dei due piani di omologia, dati che siano O ed O' : il piano ω è quello delle due rette passanti per O' , e che si appoggiano rispettivamente alle due coppie di spigoli AC, BD ; AB, CD ; il piano ω' è quello delle due rette passanti per O e che si appoggiano alle stesse coppie precedenti. Inoltre i punti $O_1 \equiv BC \cdot B'C'$, $O'_1 \equiv AD \cdot A'D'$ appartengono ad entrambi i piani ω, ω' , dunque O_1, O'_1 è l'intersezione di questi piani. Avremo dunque che: *fissato un tetraedro $ABCD$ ed un punto O , esistono infiniti tetraedri $A'B'C'D'$ biomologici ad esso con uno dei centri in O ; il piano ω' dell'altra omologia è un piano fisso, il punto O' ed il piano ω appartengono a due rette fisse (1 ed O_1, O'_1).*

7. Nei due tetraedri biomologici $ABCD, A'B'C'D'$, escluse le coppie $BC, B'C'$; $AD, A'D'$ che si corrispondono in entrambe le omologie, ordiniamo le coppie rimanenti in due modi:

$$\left. \begin{array}{l} AB, A'B' \\ AC, A'C' \\ CD, C'D' \\ BD, B'D' \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{corrispondenti} \\ \text{nella 1}^{\text{a}} \text{ omologia,} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} AB, D'C' \\ AC, D'B' \\ CD, B'A' \\ BD, C'A' \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{corrispondenti} \\ \text{nella 2}^{\text{a}} \text{ omologia.} \end{array}$$

In ognuna delle coppie corrispondenti nella 1^a omologia unendo in croce, gli estremi avremo i punti $AB' \cdot BA' \equiv P, AC' \cdot CA' \equiv P', CD' \cdot DC' \equiv Q, BD' \cdot DB' \equiv Q'$. Similmente per la 2^a omologia avremo i punti $AC' \cdot BD' \equiv R, AB' \cdot CD' \equiv R', CA' \cdot DB' \equiv S, BA' \cdot DC' \equiv S'$. La PP' , trovandosi nei due piani $AB'C', A'BC$ si appoggia a $B'C'$, e BC quindi passa per O_1 , incontro di queste rette; la QQ' trovandosi nei due piani $DB'C', D'BC$, si appoggia alle stesse $BC, B'C'$, quindi passa pure per O_1 . Analogamente si trova che $PQ', P'Q$ passano per O_1 e $PQ, P'Q'$ per O' . Cioè i punti $PP' QQ'$ stanno sul piano ω , formando un quadrangolo, il cui triangolo diagonale è $O_1 O' O_1$. Lo stesso vale per i punti R, R', S, S' rispetto al piano ω' , onde: *in due tetraedri biomologici, esclusi gli spigoli che corrispondono in entrambe le omologie, si considerino le 4 coppie di spigoli che corrispondono in una di esse; se in ciascuna di queste coppie si trova il punto d'incontro delle rette che uniscono in croce gli estremi degli spigoli, si hanno 4 punti del piano di quella omologia; questi punti formano un quadrangolo, che ha per punti diagonali il centro dell'altra omologia ed i punti d'incontro degli spigoli non considerati.*

8. Se due triangoli sono omologici in due modi, in generale l'asse di una delle omologie non passa per il centro dell'altra. C'è però un caso particolare, (*) che corrisponde esattamente al caso dei tetraedri biomologici. Si ha questo teorema: *se due triangoli $ABC, A'B'C'$ sono omo-*

(*) Questo caso è considerato nella memoria di Hess.

logici nei due modi $\left| \begin{array}{ccc} A & B & C \\ A' & B' & C' \end{array} \right| O o$, $\left| \begin{array}{ccc} A & B & C \\ C' & B' & A' \end{array} \right| O' o'$, ed O' appartiene ad o , o' appartiene ad O .

Siano dati il triangolo ABC e due punti O, O' allineati con B ; pongasi $AO \cdot CO' \equiv A'$, $CO \cdot AO' \equiv C'$, $AC \cdot A'D' \equiv L$, $AB \cdot LO' \equiv N$, $NA' \cdot OO' \equiv B'$; il triangolo $A'B'C'$ così costruito è omologico ad ABC nei due modi $\left| \begin{array}{ccc} A & B & C \\ A' & B' & C' \end{array} \right| O$, $\left| \begin{array}{ccc} A & B & C \\ C' & B' & A' \end{array} \right| O'$, e l'asse o della 1^a omologia passa per il centro O' della seconda. Vogliamo dimostrare che O sta su o' . Per il quadrangolo $AA'CC'$ il fascio delle rette o, o', LC, LC' è armonico; segnando con CC' , si ha che il gruppo dei punti $C, C', P \equiv o \cdot CC'$ ed O è armonico; segnando con CA' , si ha il gruppo armonico dei punti $C, A', Q \equiv CA' \cdot LO, O'$. Proiettando il gruppo $CC'OP$ su OO' dal punto $BC \cdot B'C'$, si ha il gruppo armonico $BB'OO'$, che con l'altro gruppo $CA'QO'$ ha un punto comune, dunque $BC, A'B', QO$ (ossia LO) concorrono in un punto. Ciò vuol dire che la congiungente di L con $BC \cdot A'B'$, ovvero o' contiene il punto O .

9. In due triangoli omologici hanno importanza per lo studio delle configurazioni i punti d'incontro delle rette che si ottengono unendo in croce gli estremi di due lati corrispondenti. (*) Questi punti formano un triangolo (che si potrebbe chiamare triangolo di *Veronese*) omologico ad entrambi i triangoli primitivi e con lo stesso asse d'omologia. Se i due triangoli stanno nello spazio il piano del triangolo di *Veronese* passa per l'incontro dei piani dei triangoli primitivi. Si deduce da ciò che dati due tetraedri omologici, i piani dei 4 triangoli di *Veronese* corrispondenti alle 4 coppie di facce corrispondenti formano un tetraedro (tetraedro di *Veronese*) omologico ai tetraedri primitivi con lo stesso piano di omologia.

Posto ciò, il teorema di Hess e quello del n. 7 si possono enunciare completamente dicendo che: *in due tetraedri biomologici i tetraedri di Veronese corrispondenti alle due omologie si riducono ai piani di esse.*

Per il caso particolare dei triangoli biomologici, analizzato nel numero precedente si ha il teorema analogo, facilmente dimostrabile.

10. Ritorniamo ora alla discussione di Hess. Abbiamo visto che se due tetraedri $ABCD, A'B'C'D'$ omologici nel modo $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$ risultano omologici anche in un altro modo, questo dovrà corrispondere ad una delle 3 permutazioni: $D'C'B'A', B'A'D'C', C'D'A'B'$. Così è sempre possibile costruire due tetraedri $ABCD, A'B'C'D'$ omologici nei due modi $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O$ $\left| \begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{array} \right| O'$ (§ 4). Vogliamo vedere se due tetraedri siffatti possono risultare omologici anche in un terzo modo, il quale dovrà corrispondere ad una delle due permutazioni $B'A'D'C', C'D'A'B'$. In-

(*) VERONESE, *Nuovi teoremi sull'esagrammo mistico*. Lincei, 1877.

sieme alle due omologie precedenti si abbia ad esempio l'altra $\left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ B' & A' & D' & C' \end{matrix} \right| O''$
 Allora, la retta $A'D'$ incontra BC , $B'C'$ incontra AD . La retta l interse-
 zione dei due piani OBC , $OA'D'$ dovrà incontrare BC , $A'D'$, e quindi
 passare per il loro punto d'incontro G ; analogamente l passa per l'incontro
 H di AD con $B'C'$. Risulta che il punto O' non si può scegliere comunque
 sulla retta l , ma deve essere il coniugato armonico di O rispetto ai punti
 G , H di appoggio di l con BC , AD . Scelto O' in questo modo, si ha un te-
 traedro $A'B'C'D'$, che effettivamente risulta omologico ad $ABCD$ anche al
 terzo modo $\left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ B' & A' & D' & C' \end{matrix} \right| O'$. Infatti per le costruzioni eseguite le 4 rette
 AB' , BA' , CD' , DC' stanno a 2 a 2 in piani differenti, e perciò passano per
 uno stesso punto O'' . Anzi abbiamo qualche cosa di più; le 4 rette AC' ,
 BD' , CA' , DB' stanno pure a 2 a 2 in piani differenti e perciò concorrono
 in uno stesso punto O''' . Dunque se due tetraedri $ABCD$, $A'B'C'D'$ sono
 omologici in tre modi, essi risultano anche omologici in un quarto modo.

Perciò, il risultato finale della discussione è questo: *se due tetraedri
 $ABCD$, $A'B'C'D'$ sono omologici in più modi, essi possono essere omologici
 in due, ed in tutti e quattro i modi seguenti:*

$$\left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \end{matrix} \right| O, \left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ D' & C' & B' & A' \end{matrix} \right| O', \left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ B' & A' & D' & C' \end{matrix} \right| O'', \left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ C' & D' & A' & B' \end{matrix} \right| O''''.$$

I tetraedri omologici in quattro modi furono chiamati da *Stephanos* te-
 traedri desmici.

II. Nel numero precedente abbiamo dimostrato l'esistenza dei tetraedri
 desmici, e data nello stesso tempo la loro costruzione effettiva. Da questa
 costruzione dedurremo le loro proprietà principali. Sia $O_1 \equiv BC \cdot B'C'$,
 $O_2 \equiv AD \cdot A'D'$; la retta $O_1 O_2$, appoggiandosi a BD e $B'D'$, passa per
 il loro incontro O''' ; ed appoggiandosi a CD , $C'D'$, passa per il loro in-
 contro O'' ; dunque O'' ed O''' stanno sulla retta $O_1 O_2$. Analogamente
 si dimostra che O''' ed O' si trovano sulla congiungente i punti $AB \cdot A'B'$,
 $CD \cdot C'D'$ e che $O' O''$ stanno sulla congiungente i punti $BC \cdot A'D'$, $AD \cdot B'C'$.
 Ma i punti $O_1, O_2, AB \cdot A'B', CD \cdot C'D', BC \cdot A'D', AD \cdot B'C'$ stanno sul
 piano d'omologia ω corrispondente al centro O , dunque il piano $O' O'' O'''$
 coincide con ω . Similmente i piani $O' O'' O'''$, $O' O''' O''$, $O' O'' O''''$ coincidono
 rispettivamente con i piani d'omologia $\omega', \omega'', \omega'''$ che corrispondono ai
 centri O', O'', O''' . Dunque: *se due tetraedri sono desmici i 4 centri ed i 4
 piani d'omologia sono i vertici e le facce di uno stesso tetraedro*. Questo
 tetraedro è desmico ad entrambi. Infatti dalla figura risulta subito:

$$\left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ O'' & O''' & O'''' & O' \end{matrix} \right| A', \left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ O'' & O'''' & O' & O''' \end{matrix} \right| B', \left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ O''' & O' & O'''' & O'' \end{matrix} \right| C', \left| \begin{matrix} A & B & C & D \\ O' & O'''' & O'' & O''' \end{matrix} \right| D',$$

$$\left| \begin{matrix} A' & B' & C' & D' \\ O'' & O'''' & O' & O''' \end{matrix} \right| A, \left| \begin{matrix} A' & B' & C' & D' \\ O'' & O' & O'''' & O''' \end{matrix} \right| B, \left| \begin{matrix} A' & B' & C' & D' \\ O''' & O' & O'' & O'''' \end{matrix} \right| C, \left| \begin{matrix} A' & B' & C' & D' \\ O' & O'''' & O'' & O''' \end{matrix} \right| D.$$

si ha così un sistema *desmico* di 3 tetraedri $ABCD$, $A'B'C'D'$, $OO''O'''$,
 due qualunque di essi sono omologici in 4 modi con i centri ed i piani
 d'omologia nei vertici e nelle facce del 3° tetraedro.

12. In due tetraedri desmici $ABCD$, $A'B'C'D'$ uno spigolo di uno di essi si appoggia ad una coppia di spigoli opposti dell'altro e propriamente AB , CD si appoggiano contemporaneamente ad $A'B'$, $C'D'$; BC , AD si appoggiano a $B'C'$, $A'D'$ e BD , AC si appoggiano a $B'D'$, $A'C'$. Più brevemente si può dire con *Stephanos* che i due tetraedri si appoggiano tra loro. Reciprocamente se due tetraedri $ABCD$, $A'B'C'D'$ verificano le condizioni precedenti, essi sono desmici. Difatti per ipotesi le rette AA' , BB' , CC' , DD' stanno a 2 a 2 in piani differenti, quindi concorrono in un punto O . Analogamente le altre tre quaterne di rette: AD' , BC' , CB' , DA' ; AB' , BA' , CD' , DC' ; AC' , BD' , CA' , DB' sono costituite ciascuna di quattro rette concorrenti in un punto.

13. Nei tetraedri $ABCD$, $A'B'C'D'$, $OO'O''O'''$, appartenenti ad un sistema desmico, consideriamo la coppia di spigoli BC , AD del 1° tetraedro e le due coppie $B'C'$, $A'D'$; OO' , $O''O'''$ degli altri due, che si appoggiano alla prima. Queste 6 rette sono gli spigoli del tetraedro O_1O' , GH . Partendo dalla coppia BA , CD , si ottiene un altro tetraedro, e partendo dalla terza coppia AC , BD , se ne ottiene un terzo. In tal modo abbiamo 3 nuovi tetraedri, i cui spigoli coincidono con quelli dei tetraedri primitivi, ed i cui vertici sono i 12 punti ove concorrono a 3 a 3 questi spigoli all'infuori dei punti A , B , C , D , A' , B' , C' , D' , O , O' , O'' , O''' . Risulta che i tre nuovi tetraedri, come i primitivi si appoggiano a due a due quindi formano un nuovo sistema desmico che dicesi il *sistema desmico coniugato* al primo sistema. Un tetraedro di uno dei due sistemi ha due spigoli opposti in comune con ciascuno dei 3 tetraedri dell'altro sistema.

14. I 18 spigoli dei tetraedri del sistema desmico $ABCD$, $A'B'C'D'$, $OO'O''O'''$ si incontrano a 3 a 3 nei vertici dei tetraedri del sistema coniugato. In ognuno di essi stanno dunque 4 punti, due vertici del 1° sistema e due del secondo: queste coppie si separano armonicamente. Difatti considerando ad esempio la coppia di spigoli BC , AD del 1° tetraedro, ad essa si appoggia la coppia $B'C'$, $A'D'$ del 2° nei punti G , O_1 ; H , O' , e la coppia OO' , $O''O'''$ negli stessi punti e dalla figura risulta subito che BC è diviso armonicamente da G , O , e AD da HO' . Analogamente per i punti che stanno AB , CD ; AC , BD ecc.

15. È facile vedere che la retta OO' si appoggia alla coppia BC , AD in G , H ed il gruppo $OO'G'H$ è armonico. Similmente O , O'' sono divisi armonicamente dai punti di appoggio della loro congiungente con la coppia AB , CD , ed O , O''' sono divisi armonicamente dai punti di appoggio della loro congiungente con l'altra coppia BD , AC . Dunque in un sistema desmico di tre tetraedri, un vertice O di uno di essi e il polo della faccia opposta $O'O''O'''$ rispetto a ciascuno degli altri tetraedri.

Sicchè dato un tetraedro $ABCD$ ed un punto O si può costruire un solo tetraedro desmico ad $ABCD$, e di cui un vertice è O ; basterà condurre per O le 3 rette, che si appoggiano rispettivamente alle 3 coppie di spigoli opposti di $ABCD$, e segarle col piano polare di O rispetto allo stesso tetraedro $ABCD$; i 3 punti di sezione O' , O'' , O''' , insieme ad O ,

Questi problemi son divisi in 10 paragrafi: nel primo ci sono quelli relativi ai segmenti, nel secondo quelli relativi ai triangoli, ecc., ed, infine, il decimo comprende dei problemi di ripetizione ed alcuni temi degli esami di licenza degli istituti tecnici (sezione F. M.).

I problemi di ciascun paragrafo sono posti in ordine progressivo di difficoltà, e sono preceduti dalle formole che riguardano le proprietà fondamentali della figura a cui i problemi si riferiscono.

Gli insegnanti delle scuole secondarie, considerando l'utilità di questa raccolta di problemi, saranno certamente grati all'autore per averla compilata con tanta cura e diligenza, e non mancheranno di accoglierla favorevolmente.

K.

RIVELLI. — *Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi ed alla loro costruzione in carta.* — Manuali Hœpli — Serie artistica.

Questo nuovo manuale pubblicato dal solerte editore U. Hœpli non ha altro scopo, come dice il suo titolo, che quello di addestrare i giovani studenti specialmente delle scuole tecniche e industriali a costruire con poca spesa i modelli in cartoncino dei principali solidi che si presentano nello studio della geometria. — Questo scopo può dirsi felicemente raggiunto; l'eleganza dell'edizione contribuirà ad invogliare i giovanetti a darsi a questo utile passatempo.

A. B.

ESAMI DI BACCALAUREATO DELL'APRILE 1896

(Continuazione vedi pag. 69)

Accademia di Rennes.

1°. *Quistioni a scelta.* — a) In qual caso si dice che alcune relazioni fra più variabili sono distinte? Quante relazioni distinte esistono fra le sei linee trigonometriche di uno stesso angolo? Trovarle, e mostrare perchè esse sono distinte. Dedurne i valori di $\sin x$ e $\cos x$ in funzione di $\tan x$.

b) Calcolare $\sin \frac{x}{2}$ e $\cos \frac{x}{2}$ in funzione di $\sin x$.

Discussione.

c) Risolvere un triangolo conoscendo due lati e l'angolo opposto ad uno di essi. Discussione.

Problema. — Si formi 1° il quadrato della somma dei quadrati di due numeri interi consecutivi $a, a - 1$, 2° il quadrato del doppio $2a$ del maggiore di essi; dimostrare che nella divisione di questi due quadrati la parte intera del quoziente ed il resto sono pure dei quadrati. Se a è il numero che segue immediatamente un quadrato, il resto è il quadrato che segue immediatamente il quadruplo del quoziente.

Accademia di Tolosa.

Per gli estremi A e B d'un diametro d'una circonferenza data, di raggio R e centro O, si conducano le tangenti AC, BD a questa circonferenza, e s'indichino con C, D i punti d'incontro con una tangente CD alla circonferenza.

- 1°. Dimostrare che il triangolo COD è rettangolo e che $AC \times BD = R^2$.
- 2°. Determinare la tangente CD in modo che l'area del trapezio ACDB sia equivalente a quella d'un quadrato di lato dato a .
- 3°. Determinare il minimo dell'area del trapezio ACDB, quando si fa variare la tangente CD.

WEIERSTRASS

Il 19 febbraio ultimo scorso si è spento a Berlino Carlo Teodoro Guglielmo Weierstrass, al quale poco più di un anno prima, in occasione del suo ottantesimo anniversario, tutta la Germania aveva reso solenni onoranze come al più illustre dei Matematici tedeschi.

L'indole del *Periodico* non ci consente di parlare delle opere insigni di lui, per le quali fu detto il padre dell'analisi moderna; crediamo però di fare cosa grata ai lettori dando qualche cenno sulla sua vita.

C. Weierstrass nacque il 31 ottobre 1815 a Ostenfelde in Vestfalia. Dal 1834 al 1838 studiò diritto e scienza delle finanze nell'Università di Bonn; ma poco soddisfatto degli studi giuridici all'età di 23 anni si dedicò alle matematiche, che studiò privatamente a Münster dove nell'estate del 1841 dette l'esame *pro facultate docendi*.

Dal 1842 insegnò in vari Ginnasi e pubblicò i lavori sulle funzioni Abelianhe, che furono il fondamento della sua gloria, e gli dischiusero nel 1856 le porte dell'Università di Berlino, che ha illustrato per oltre 40 anni.

Inchiamoci reverenti dinanzi alla tomba, che chiude il corpo di C. W. ma non il suo spirito, il quale vivè e vivrà nelle sue opere.

CONCORSI

Accademia delle scienze fisiche e matematiche. — L'Accademia, non avendo ritenuta degna di premio nessuna delle due memorie presentate per il concorso del 1896, ha bandito il concorso per un premio di L. 1000 sul medesimo tema, che è il seguente:

Esporre, discutere e coordinare in forma possibilmente compendiosa tutte le ricerche concernenti la determinazione della totalità dei numeri primi, apportando qualche notevole contributo alle leggi secondo le quali questi numeri si distribuiscono fra i numeri interi.

Le memorie dovranno essere inviate al segretario dell'Accademia non più tardi del 31 marzo 1898.

Accademia Pontoniana (Concorso al premio Tenore). — Si ripropone al concorso pel premio di L. 500 il seguente tema:

Le Matematiche in Napoli dalla fondazione dell'antica Reale Accademia delle Scienze (1762) alla nuova (1861).

I lavori dovranno farsi pervenire, franchi da ogni spesa, al Segretario generale dell'Accademia non più tardi del 31 marzo 1898.

Errata-Corrige. — Nel fascicolo II a pag. 57, riga 7^a, alle parole:apparisce come fattore coseno, devono seguire le altre: *mentre la seconda parte ci dà tutti i termini in cui lo stesso arco apparisce come fattore seno;...*

GIULIO LAZZERI — *Direttore responsabile*

Finito di stampare il 4 Maggio 1897.

UN' OSSERVAZIONE SULL' EQUIVALENZA DEI POLIEDRI

per congruenza delle parti

Quando un poliedro convesso P è diviso in parti poliedriche convesse in modo che, se un punto è vertice di una delle parti, esso sia vertice anche di tutte quelle parti cui appartiene, noi diremo che P è diviso in parti *annodate*, e diremo *nodo* ogni punto in cui cadano i vertici delle parti.

Ciò posto vale il seguente

TEOREMA. — *Se un poliedro convesso P è diviso in parti poliedriche convesse annodate, la somma degli angoloidi delle parti aumentata o diminuita di un multiplo di un diedro piatto eguaglia la somma di convenienti multipli, secondo numeri non minori di 2, dei diedri di P .*

Dimostrazione. — Consideriamo infatti i 4 seguenti possibili casi relativi alle varie posizioni di un nodo.

1. *Il nodo sia interno a P .* In tal caso tutti gli angoloidi delle parti che hanno il vertice in esso riempiono l'intero spazio, cioè sommano due diedri piatti. Se dunque n è il numero di tali nodi ed S_1 è la somma di tutti quegli angoloidi delle parti che hanno i vertici in essi, si avrà $S_1 = 2n\pi$.

2. *Il nodo sia interno ad una faccia di P .* Allora tutti gli angoloidi delle parti che hanno il vertice in quel nodo riempiono soltanto quella metà dello spazio in cui cade P , cioè un diedro piatto. Se dunque m è il numero di tali nodi ed S_2 è la somma degli angoloidi delle parti che hanno i vertici in essi, si avrà $S_2 = m\pi$.

3. *Il nodo sia interno a uno spigolo di P .* Allora tutti gli angoloidi delle parti di P che hanno il vertice in esso riempiono il diedro D_i corrispondente a quello spigolo. Se dunque r_i è il numero dei nodi interni a

tale spigolo ed S_3 è la somma di tutti gli angoloidi delle parti che hanno i vertici in nodi interni agli spigoli di P , sarà $S_3 = r_1 D_1 + r_2 D_2 + \dots$

4. *Il nodo cada infine in un vertice di P .* Allora gli angoloidi delle parti che hanno il vertice in esso riempiono quell'angoloide di P che ha il vertice in quel nodo. Detta dunque A la somma degli angoloidi di P ed S_4 la somma di tutti quegli angoloidi delle parti di P che hanno i vertici nei vertici di P , sarà $S_4 = A$.

D'altronde, se A_1 è un angoloide di P , n_1 il numero degli spigoli di A_1 e Σ_1 la somma dei diedri di A_1 , si ha $A_1 = \Sigma_1 - (n_1 - 2)\pi$.

Perciò

$$S_4 = (\Sigma_1 + \Sigma_2 + \dots) - (n_1 + n_2 + \dots - 2V)\pi,$$

essendo V il numero dei vertici di P . Ma, poichè ogni diedro di P appartiene a due angoloidi, si ha

$$\Sigma_1 + \Sigma_2 + \dots = 2D_1 + 2D_2 + \dots, \quad n_1 + n_2 + \dots = 2C,$$

essendo C il numero degli spigoli di P .

Rimane dunque in ultimo

$$S_4 = 2D_1 + 2D_2 + \dots - (2C - 2V)\pi.$$

Raccogliendo ora in una sola S le quattro somme S_1, S_2, S_3, S_4 , e facendo

$$\mp K = 2n + m - 2V + 2C,$$

otterremo appunto

$$S \pm K\pi = (r_1 + 2)D_1 + (r_2 + 2)D_2 + \dots$$

conformemente all'enunciato.

Da questo teorema si può ricavare un notevole corollario, che richiede però due particolari lemmi.

LEMMA 1°. — *Se D è il diedro del tetraedro regolare R e δ il diedro acuto del tetraedro trirettangolo isoscele T , si ha*

$$2\delta = \pi - D.$$

Dimostrazione. — Bisogna ricordare che in ogni tetraedro una faccia qualunque è la somma delle proiezioni delle altre tre su di essa. Applicando questo principio ad R avremo dunque (se α indica l'area di una faccia di R) $\alpha = 3\alpha \cos D$, donde

$$\cos D = \frac{1}{3}.$$

Applichiamo poi lo stesso principio a T ; allora, indicando con β l'area della base e con γ l'area di una qualunque delle tre faccie rettangole di T , avremo le due equazioni

$$\beta = 3 \gamma \cos \delta,$$

$$\gamma = \beta \cos \delta,$$

donde, moltiplicando,

$$\cos^2 \delta = \frac{1}{3}.$$

Da questa si ha successivamente

$$2 \cos^2 \delta = 2 \operatorname{sen}^2 \left(\frac{\pi}{2} - \delta \right) = 1 - \cos (\pi - 2\delta) = \frac{2}{3},$$

epperò

$$\cos (\pi - 2\delta) = \frac{1}{3} = \cos D.$$

Ora, essendo $\delta < \frac{\pi}{2}$, si ha

$$\pi > \pi - 2\delta > 0; \text{ ed è poi } \pi < D < \pi,$$

dunque

$$D = \pi - 2\delta.$$

LEMMA 2°. — Il diedro D del tetraedro regolare è incommensurabile con π .

Infatti, essendo (lemma 1°) $\cos D = \frac{1}{3}$, si ha $\operatorname{sen} D = \frac{\sqrt{8}}{3}$.

Allora, ponendo

$$\epsilon = \frac{1 \pm i \sqrt{8}}{3},$$

se fosse

$$(1) \quad D = \frac{m}{n} \pi$$

sarebbe

$$\epsilon = \cos \frac{m}{n} \pi + i \operatorname{sen} \frac{m}{n} \pi;$$

e perciò

$$\epsilon^n \pm 1 = 0.$$

Ma ϵ è radice dell'equazione $3x^2 - 2x + 3 = 0$, dunque nell'ipotesi (1) deve essere $x^n \pm 1$ divisibile per $P = 3x^2 - 2x + 3$.

Sia $\frac{Q}{K}$ il quoziente di tale divisione, ed indichi Q un polinomio intero (di grado $n - 2$) e K un numero intero primo con Q .

Potremo scrivere

$$K(x^n \pm 1) = QP.$$

Detto α_0 il coefficiente di x^{n-2} in Q , dovrà essere intanto

$$K = 3\alpha_0,$$

epperò QP dovrà essere divisibile per 3. Ora 3 non può dividere Q , perchè 3 divide K , dunque (BERTRAND, *Alg. elem.*) 3 deve dividere P . Ma poichè 3 non divide P , Q non esiste e quindi D è incommensurabile con π . (¹)

Veniamo ora all'accennato

COROLLARIO. — *Un tetraedro regolare R e un tetraedro trirettangolo isoscele T non si possono dividere in uno stesso numero di parti annodate rispettivamente simili (e tanto meno congruenti).*

Sia infatti possibile dividere R e T in parti annodate rispettivamente simili; allora la somma degli angoloidi delle parti di R o di T sarebbe la stessa. Perciò, indicando con r, ρ, σ, K degli interi non negativi dovrebbe essere pel teorema dimostrato

$$(r + 12)D = (\rho + 6)\delta + (\sigma + 6)\frac{\pi}{2} \pm K\pi,$$

(¹) Anche i diedri dell'ottaedro, del dodecaedro e dell'icosaedro regolare sono incommensurabili con π . Infatti, se si chiama D il diedro di un poliedro regolare convesso, si trova (v. *Traité de Géom.* di ROUCHÉ e COMBEROUSSE pag. 245 del 2° vol. 3ª edizione)

$$\operatorname{sen} \frac{D}{2} = \frac{\cos \frac{\pi}{m}}{\operatorname{sen} \frac{\pi}{n}},$$

ove m è il numero degli spigoli di ciascun angoloide e n il numero dei lati di ciascuna faccia. Facendo allora

$$z = \cos D + i \operatorname{sen} D,$$

si vede facilmente che pel tetraedro

$$\sqrt{z} = \frac{\sqrt{2+i}}{\sqrt{3}};$$

per l'ottaedro

$$\sqrt{z} = \frac{1+i\sqrt{2}}{\sqrt{3}};$$

per l'icosaedro

$$\sqrt{z} = \frac{(\sqrt{5}-1) + i(1+\sqrt{5})}{2\sqrt{3}}$$

e infine pel dodecaedro

$$\sqrt{z} = \frac{(\sqrt{5}-1) + 2i}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}.$$

Si trova perciò che per i primi due solidi z è radice della stessa equazione $3x^2 - 2x + 3 = 0$ (e quindi i D corrispondenti sono supplementari); mentre per l'icosaedro z è radice della

$$9x^4 - 2x^2 + 9 = 0,$$

e per il dodecaedro z è radice della

$$5x^4 + 8x^2 + 5 = 0,$$

e si prova come pel caso del tetraedro (e dell'ottaedro) che questi due ultimi diedri sono incommensurabili con π . Nel testo citato è detto invece che il diedro dell'icosaedro è dato esattamente da

$$133^\circ.11'.22'',75.$$

ossia

$$(2r + 24) D = (\rho + 6) \cdot 2\delta \pm \tau\pi,$$

ove τ è un intero, D è il diedro di B e δ è il diedro acuto di T .

Ma pel lemma. 1° $2\delta = \pi - D$, dunque la precedente relazione diviene

$$(2r + 24) D = (\rho + 6) \pi - (\rho + 6) D \pm \tau\pi$$

ossia

$$(2r + \rho + 30) D = (\rho + 6 \pm \tau)\pi;$$

e quindi, poichè $2r + \rho + 30$ non può essere zero perchè r e ρ debbono essere positivi o nulli, dovrà essere $D = \frac{m}{n} \pi$, cioè D commensurabile con π , ciò che è contrario al lemma 2°.

Aprile 1897.

G. SFORZA.

Una definizione di poligono convesso

1. Le definizioni di poligono convesso, che comunemente vengono date nei trattati di geometria elementare per le scuole secondarie, sono *sovrabbondanti*, cioè contengono più di quanto è strettamente necessario per *definire*, nel vero senso di questa parola, tale figura. Propositioni di tal fatta le chiamerei piuttosto *denominazioni*.

Mi propongo in questa Nota di esporre una *definizione* di poligono convesso. Le citazioni che si trovano nel seguito si riferiscono agli "Elementi di Geometria di Giuseppe Veronese trattati con la collaborazione di Paolo Gazzaniga". Avrei potuto conseguire forse maggior brevità nell'esposizione, ricorrendo per le citazioni ad un lavoro nel quale fosse svolto più completamente l'argomento della divisione del piano in parti mediante rette, ma preferisco attenermi al libro accennato come quello che più è conforme al metodo di trattazione da me seguito in altre Note sui fondamenti della geometria. Ho invece pensato di tener distinto ciò che è affatto inerente alla quistione che mi son proposto di trattare, da quanto è, dirò così, d'indole più generale, e che espongo in alcune

OSSEVAZIONI PRELIMINARI. — I°. Dal fatto che una retta α divide il piano in due parti M, N (n. 3 oss. è def.) e che se una retta β taglia α in un punto, essa vien divisa in due raggi posti uno in M e uno in N (n. 23 t. III), risulta immediatamente con dimostrazione per assurdo che, se un segmento ha gli estremi in una delle due parti M, N vi giace per intero.

II°. Se C è un punto di α e CQ un raggio di N , esso divide questa regione in due parti, corrispondenti a quelle in cui vien diviso da esso il mezzo fascio con centro in C posto in N (n. 23 lemma), parti che sono due angoli piani (n. 21 def. I 4) $\widehat{KCQ}, \widehat{QCH}$. Se si prende un punto X in \widehat{KCQ} ed uno Y in \widehat{QCH} , cioè da bande

opposte rispetto alla retta CQ , il segmento (XY) taglia questa (c. t. III) e precisamente il raggio CQ , trovandosi tutto in N . Cioè:

Un semipiano è diviso da un suo raggio qualunque CQ , uscente da un punto C della retta origine a in due parti, e ogni segmento che ha un estremo in una e l'altro nell'altra di queste taglia il raggio CQ , e perciò, se una retta non parallela ad a taglia il raggio opposto a CQ , quel suo raggio che si trova nel semipiano in discorso giace tutto in una delle due parti considerate.

III°. Dato un triangolo ABC (lascio le figure alla cura del lettore), il suo lato BC divide il piano in due parti, di cui chiameremo M quella che contiene il triangolo, N l'altra. Il raggio CQ opposto a CA si trova nella seconda (u. 23 t. III) e la divide (oss. prelim. II) in due angoli piani \widehat{BCQ} , \widehat{QCH} (CH opposto a CB), ed ogni raggio AS che taglia la BC in un punto S e che perciò appartiene, a partire da S , ad N , deve trovarsi, a partire da S , tutto o in \widehat{BCQ} o in \widehat{QCH} (oss. II). Per conseguenza tutti e soli quei raggi in discorso, per i quali S cade sul raggio CB , saranno in \widehat{BCQ} , e quelli per cui S cade in (BC) danno la parte comune ai due angoli \widehat{BCQ} , \widehat{BAC} , mentre quelli, per i quali S cade sul raggio BK (opposto a BC), ci danno la parte che il primo non ha in comune col secondo, la quale, essendo BK da banda opposta a BH rispetto alla AB , trovasi rispetto a questa retta da banda opposta all'angolo \widehat{BAC} . Possiamo concludere: *L'angolo piano interno \widehat{BAU} del triangolo ABC e l'angolo esterno \widehat{BCQ} hanno in comune tutta la parte del primo che si ha astruendo dal triangolo dato, la qual parte è tutta quella che l'angolo esterno ha dalla stessa banda in cui trovasi l'angolo interno considerato rispetto al lato AB .*

IV°. *Dati due angoli adiacenti \widehat{ACB} , \widehat{ACD} , se un raggio CE dell'angolo piatto opposto a quello che risulta dalla somma dei due nominati determina col raggio CA un angolo \widehat{ACE} convesso che contenga il raggio CB , l'opposto di CE cade in \widehat{ACD} . Difatti CF , opposto di CE , deve trovarsi o nell'uno o nell'altro dei due angoli adiacenti anzidetti (23 t. III). Ma essendo \widehat{ACE} convesso, il raggio opposto a CE cade fuori di esso (21 def.), e quindi anche di \widehat{ACB} , perciò si trova in \widehat{ACD} .*

2. Consideriamo una retta A_1A_2 che divide il piano in due parti M , N , ed in una di queste, per es. in M , prendiamo un punto A_3 ; vien così determinato un triangolo $A_1A_2A_3$ di M .

Nella parte che A_1A_2K (A_2K opposto a A_3A_2) ha in M si prenda un punto A_4 ; nella parte che A_1A_2L (A_1L opposto ad A_3A_1) ha in M si prenda un punto A_5 , e così si proceda fino ad un ultimo punto A_n . I punti $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ determinano un poligono che chiamerò *convesso*. Possiamo perciò porre la seguente

DEFINIZIONE. — *Chiamasi convesso ogni poligono che sia tutto da una parte rispetto uno dei suoi lati A_1A_2 , e sia tale che ognuno dei triangoli determinati da un vertice A_1 di questo lato con le coppie $A_2, A_3; A_3, A_4; \dots, A_{n-1}, A_n$ abbia il vertice, che non è comune col precedente, nell'angolo esterno di questo che è adiacente al lato comune, e che non ha il vertice in A_1 .*

3. Conduco (supposto eseguita la figura determinata dalla definizione) la A_2A_1 . Essendo A_1 in A_1A_2K e in M , è pure (u. 1 oss. III) in $A_1A_2A_3$, nel quale trovasi adunque il raggio A_2A_1 , che perciò taglia (A_1A_3) , per cui il raggio A_2A_3 trovasi in $A_1A_2A_3$, e così i raggi A_2A_1, A_1A_3 si trovano da parte opposta rispetto alla retta A_1A_2 . Perciò i due angoli adiacenti $A_2A_1A_3, A_1A_2P$ (A_1P opposto ad A_1A_2) e A_1A_3 si trovano nelle condizioni dell'oss. IV, e quindi A_2L è in A_1A_2P e A_1A_2L è parte di A_1A_2P , per cui A_3 cadendo in quello per definizione, si trova pure in

questo, dunque (oss. III) essendo A_3 anche in M , trovasi pure in $\widehat{A_1 A_2 A_4}$ fuori del triangolo $A_1 A_2 A_4$. Così proseguendo si veda che *gli angoli* $\widehat{A_1 A_2 A_3}, \widehat{A_1 A_3 A_4}, \dots, \widehat{A_{n-2} A_{n-1} A_n}$ sono successivi, e che il poligono trovasi tutto nell'angolo $\widehat{A_1 A_2 A_3}$, cioè tutto da una parte rispetto al lato $A_1 A_2$.

Ora abbiamo gli angoli adiacenti $\widehat{A_2 A_1 A_3}, \widehat{A_1 A_3 P}$ e in quest'ultimo c'è $A_2 L$, per cui $\widehat{A_1 A_3 L}$ è consecutivo a $\widehat{A_2 A_1 A_3}$, cioè $A_2 A_1$ è interno all'angolo convesso (minore del piatto $\widehat{A_2 A_1 P}$) $\widehat{A_1 A_3 L}$, perciò A_2 cadendo per ipotesi in $\widehat{A_1 A_3 L}$, trovasi anche in $\widehat{A_2 A_1 A_3}$. Così continuando si conclude: *Se un poligono è convesso in un dato verso a partire da un suo vertice A_1 , esso lo è anche a partire dal suo successivo A_2 , nello stesso verso, e quindi da ogni altro.*

Dalla definizione e da questi teoremi si ricava facilmente: *Ogni angolo di un poligono convesso è convesso. (Per il triangolo ciò si suppone già noto.) Il poligono è tutto contenuto in ciascuno dei suoi angoli. Ogni diagonale divide il poligono in due poligoni convessi. Considerando le diagonali uscenti da un vertice, il poligono risulta somma di $n - 2$ triangoli.*

4. Riferendoci alla figura precedente, e supponendo, per fissare le idee, che sia A_7 l'ultimo vertice, esso è situato in $\widehat{A_1 A_6 V}$ ($A_6 V$ opposto ad $A_7 A_5$), perciò i raggi $A_6 A_1, A_6 V$ sono da bande opposte rispetto alla $A_7 A_5$, ed applicando agli angoli adiacenti $\widehat{A_1 A_6 A_7}, \widehat{A_1 A_6 R}$ ($A_6 R$ opposto ad $A_7 A_5$) l'oss. IV, si vede che A_7 cade in $\widehat{A_1 A_6 R}$. Così continuando si arriva a concludere: *Ogni poligono che è convesso a partire da un vertice A_1 in un dato verso, lo è pure nel verso opposto.*

5. Arrivati nella costruzione del nostro poligono per es. al vertice A_5 , si prenda A_4 in $\widehat{A_1 A_2 A_4}$. Allora la $A_2 A_4$ deve tagliare ($A_1 A_4$), che ha gli estremi sui lati dell'angolo; e perciò taglierà un altro lato (segmento) del triangolo $A_1 A_2 A_4$. Proseguendo si vede che $A_2 A_5$ deve tagliare un lato del poligono, che così non rimane tutto da una parte rispetto a quella retta. Analogamente avviene se A_2 si prende nell'opposto di $\widehat{A_1 A_2 A_4}$. Prendendolo poi nell'opposto di $\widehat{A_1 A_2 U}$ ($A_2 U$ opposto ad $A_3 A_4$) viene a trovarsi con A_1 da parte opposta rispetto $A_1 A_4$, e perciò continuando nella costruzione si dovrà arrivare ad un vertice che converrà unire con A_1 o con un altro vertice che si trova dalla stessa banda di A_1 , e allora il lato che si ottiene è segato dalla $A_1 A_4$, rispetto alla quale dunque il poligono non trovasi tutto da una parte. Concludendo: *Un poligono non convesso non si trova tutto da una parte rispetto ad ognuno dei suoi lati. Un poligono che si trova tutto da una parte rispetto ciascuno dei suoi lati è convesso.*

Ed ora rimane tolto l'inconveniente lamentato dal Prof. Frattini nel Periodico del 1896, al quale si può del resto ovviare mantenendo anche la solita definizione, come trovasi dimostrato nel Trattato di Geometria dei signori Lazzari e Bassani.

Sondrio febbraio 1897.

FRANCESCO PALATINI.

NECROLOGIO

La scienza matematica ha perduto uno dei suoi più illustri cultori.

GIACOMO GIUSEPPE SYLVESTER

è morto a Londra il 15 marzo scorso nella grave età di 83 anni.

ALCUNE PROPRIETÀ DELLA SVILUPPANTE DI CERCHIO

(Continuazione e fine vedi fascicolo precedente).

§ 3. *Dividere un arco AB di Λ in due parti, aventi un dato rapporto m.* — Chiamando C il punto di divisione ed x il raggio vettore OC, si ha:

$$m = \frac{AC}{CB} = \frac{x^2 - R^2}{R^2 - x^2}$$

d'onde:

$$(6) \quad x = \sqrt{\frac{mR^2 + R^2}{m + 1}}$$

Se dunque m è razionale, il problema proposto si risolve colla riga e col compasso.

A questo problema si può connettere l'altro di dividere un dato arco AB di Λ in n parti eguali. Basta fare nella (6) $m = \frac{1}{n-1}$.

Facendo nella (6) $m = 1$, si ha la formola (facilmente costruibile):

$$(7) \quad x = \sqrt{\frac{R^2 + R^2}{2}}$$

corrispondente alla divisione del dato arco AB per metà.

Nella (7) si supponga $R_1 = nR$, con n intero; si ottiene allora:

$$x = R \sqrt{\frac{n^2 + 1}{2}}$$

Se si metta la condizione che anche x sia multiplo di R , il numero $\frac{n^2 + 1}{2}$ deve essere un quadrato perfetto intero e perciò n dispari. Posto allora $n = 2p + 1$, si ha:

$$\frac{n^2 + 1}{2} = p^2 + (p + 1)^2$$

e, dovendo il secondo membro, che è la somma dei quadrati di due numeri interi consecutivi, essere un quadrato perfetto, si deve avere necessariamente $p = 3$ e per conseguenza:

$$n = 7, \quad x = 5R.$$

Dunque:

« *Se in una sviluppante di cerchio si tirano, dal centro del cerchio*

evoluta, tre raggi vettori proporzionali ai numeri 1, 5, 7, il medio divide per metà l'arco intercetto dagli estremi ».

Questo è il solo caso possibile, quando si metta la condizione che il secondo e il terzo raggio vettore siano multipli del primo.

Se nell'equazione (6) si suppone $m = \frac{R}{R_1}$, risulta:

$$x = \sqrt{RR_1}.$$

Perciò:

« Se in una sviluppante di cerchio si tirano, dal centro del cerchio evoluta, tre raggi vettori, di cui il medio sia media proporzionale fra gli altri due, esso divide l'arco in due parti proporzionali ai raggi vettori estremi ».

Siccome, qualunque sia m , si può scrivere:

$$x = \sqrt{(mR) \cdot \frac{R_1}{m}},$$

si ha:

« Vi sono infiniti archi AB i quali, da un punto fisso C , sono divisi in parti proporzionali ai raggi vettori estremi; il prodotto di questi raggi è costante ed eguale al quadrato del raggio vettore OC ».

Dividere un arco di sviluppante in sezione aurea. —

Tenute ferme le notazioni del problema precedente, se la parte aurea è AC , deve essere:

$$AB : AC = AC : CB$$

Si ha dunque l'equazione:

$$(R^2 - R^2)(R^2 - x^2) = x^2 - R^2$$

che, risolta rispetto ad x^2 , dà:

$$(8) \quad x^2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \cdot R^2 + \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \cdot R_1^2,$$

essendo l'altra radice da escludere.

Perciò:

« Il quadrato del raggio vettore x è eguale alla somma di due rettangoli, uno dei quali è la parte minore del quadrato di R diviso in sezione aurea e l'altro è la parte aurea del quadrato di R_1 »

Se invece si mette la condizione che la parte aurea dell'arco AB sia CB , si ottiene per x^2 l'espressione a cui si riduce (8) scambiando fra loro R e R_1 .

Esprimere il rapporto anarmonico di quattro punti della sviluppante.

I quattro punti siano A, B, C, D e si supponga che i primi due siano separati dagli altri; si ha:

$$(ABCD) = \frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD}$$

ossia, in causa dell'equazione (4):

$$(ABCD) = \frac{(R^2_2 - R^2)(R^2_3 - R^2_1)}{(R^2_2 - R^2_1)(R^2_3 - R^2)}$$

Ponendo:

$$(ABCD) = \lambda$$

e risolvendo l'equazione precedente rispetto a R^2_3 , si trova:

$$R^2_3 = \frac{R^2_1(R^2 - R^2_2) - \lambda R^2(R^2_1 - R^2_2)}{(R^2 - R^2_2) - \lambda(R^2_1 - R^2_2)}$$

Con questa formola si può determinare il quarto punto di una sviluppante di cerchio che, insieme a tre punti dati della medesima, formano un gruppo di punti avente un dato rapporto anarmonico.

Fatto $\lambda = -1$, si ha il teorema:

« Se in una sviluppante di cerchio, e a partire dal centro del cerchio evoluta, si descrivono quattro raggi vettori R, R_1, R_2, R_3 , i primi tre arbitrari e il quarto definito dalla relazione:

$$(9) \quad R^2_3 = \frac{2R^2R^2_1 - (R^2 + R^2_1)R^2_2}{R^2 + R^2_1 - 2R^2_2}$$

i quattro estremi formano, sulla spirale, un gruppo armonico ».

Siccome l'equazione (9) è identicamente soddisfatta da:

$$(10) \quad R_2 = \sqrt{R^2 - RR_1 + R^2_1}, \quad R_3 = \sqrt{R^2 + RR_1 + R^2_1}$$

si ha:

« I quattro punti della sviluppante che corrispondono ai due raggi vettori arbitrari R, R_1 e ai due altri R_2, R_3 definiti dalle equazioni (10), costituiscono un gruppo armonico ».

§ 4. Ci proponiamo di trovare l'area di un settore compreso fra due raggi vettori qualunque e l'arco compreso fra i loro estremi.

Siano OA, OA_1 due raggi vettori vicinissimi, Aa, A_1a_1 i raggi di curvatura corrispondenti, AC l'arco di centro O descritto col raggio OA ed intercetto fra i raggi vettori OA, OA_1 . Abbiamo, applicando i risultati precedenti:

$$\text{Area } OAC = \frac{1}{2} OA \cdot \text{arco } AC = \frac{1}{2} OA \cdot \text{arco } AA_1 \cdot \text{sen } \theta =$$

$$= \frac{1}{2} R \cdot AA_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{h^2}{4R^2}} = \frac{1}{2} AA_1 \cdot \rho$$

$$\text{Area } ACA_1 = \frac{1}{2} AC \cdot CA_1 = \frac{1}{2} AA_1 \cdot \text{sen } \theta \cdot CA_1 =$$

$$= \frac{1}{2} AA_1 \cdot CA_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{h^2}{4R^2}} = \frac{1}{2} AA_1 \cdot \rho \frac{CA_1}{R}$$

Perciò:

$$\text{Area } OAA_1 = \frac{1}{2} AA_1 \cdot \rho \left(1 + \frac{CA_1}{R}\right)$$

D'altronde potendosi considerare la figura AA_1aa_1 come un settore circolare di centro a e di raggio ρ , si ha

$$\text{Area } AA_1aa_1 = \frac{1}{2} \rho \cdot AA_1$$


e quindi:

$$\frac{\text{Area } OAA_1}{\text{Area } AA_1aa_1} = 1 + \frac{CA_1}{R}$$

Passando al limite col supporre che A_1 vada avvicinandosi indefinitamente ad A , si ha:

$$\lim. \text{Area } OAA_1 = \lim. \text{Area } AA_1aa_1$$

Scomponendo quindi un settore qualunque OAB e l'area corrispondente



$ABab$ in un numero grandissimo di settori analoghi ai precedenti OAA_1 , AA_1aa_1 , ed applicando la proprietà ora dimostrata, si giunge al teorema:

« In una sviluppante di cerchio l'area $ABab$ compresa fra l'arco qualsivoglia AB , l'arco corrispondente ab dell'evolvente e i due raggi di curvatura estremi Aa Bb è equivalente all'area del settore OAB ».

Facendo uso della figura, si ha:

$$\text{Area } M_{k-1} M_k m_{k-1} m_k = \frac{1}{2} m_k M_k \cdot \text{arco } M_k M_{k-1} = \frac{1}{2} kt \cdot \text{arco } M M_{k-1}$$

Siccome (V. § 1):

$$M_{k-1} M_k = kt \cdot \varepsilon = \frac{2}{h} kt^2,$$

risulta:

$$\text{Area } M_{k-1} M_k m_{k-1} m_k = \frac{1}{h} k^2 t^3,$$

e perciò:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{k=n} M_{k-1} M_k m_{k-1} m_k &= (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) \frac{t^3}{h} = \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \frac{t^3}{h} = \frac{1}{6h} nt(nt+t)(2nt+t). \end{aligned}$$

Passando al limite per $n = \infty$, si trova:

$$\text{Area } M\Delta a = \frac{\sigma^3}{3h},$$

essendo σ l'arco circolare Ma .

Se dunque si indica con S l'area del settore compreso fra il raggio vettore iniziale OM e un raggio vettore qualunque OA e si applica il teorema dimostrato in questo § e le formole (1), (2), (3), si trova:

$$(11) \quad S = \frac{(hs)^{\frac{3}{2}}}{3h} = \frac{\rho^3}{3h} = \frac{(4R^2 - h^2)^{\frac{3}{2}}}{24h}$$

Con tale formola si può evidentemente trovare l'area di un settore qualunque OAB , considerandolo come differenza dei due settori OMB , OMA .

Se S , S_1 sono due settori contati dal raggio vettore iniziale OM ; s , s_1 gli archi corrispondenti; ρ , ρ_1 i raggi di curvatura nei punti estremi di questi archi, si ha:

$$\frac{S^2}{S_1^2} = \frac{s^3}{s_1^3}, \quad \frac{S}{S_1} = \frac{\rho^3}{\rho_1^3}$$

Dunque:

« I settori, contati dall'origine della sviluppante, sono proporzionali ai cubi dei raggi di curvatura nelle estremità degli archi; e i quadrati di detti settori sono proporzionali ai cubi degli archi corrispondenti ».

Ne viene di conseguenza che:

« Prendendo sopra una sviluppante di cerchio una serie di archi, tutti contati dall'origine, e formanti una progressione geometrica di ragione q , i corrispondenti settori formano un'altra progressione geometrica di ragione $q^{\frac{3}{2}}$, e reciprocamente ».

Se gli archi consecutivi MA , AA_1 , A_1A_2 , ... dell'evolvente sono proporzionali ai numeri dispari, si può mettere:

$$MA = \alpha, \quad AA_1 = 3\alpha, \quad A_1A_2 = 5\alpha, \dots$$

Risultando allora:

$$MA = \alpha, \quad MA_1 = 4\alpha, \quad MA_2 = 9\alpha, \dots$$

dall'equazione (11) si ricava per i settori:

$$MOA = \frac{\sqrt{h}}{3} \alpha^{\frac{3}{2}}; \quad MOA_1 = 8 \cdot \frac{\sqrt{h}}{3} \alpha^{\frac{3}{2}};$$

$$MOA_2 = 27 \cdot \frac{\sqrt{h}}{3} \alpha^{\frac{3}{2}}; \dots$$

Perciò:

« Se sopra una sviluppante di cerchio si prendono degli archi successivi proporzionali ai numeri dispari, il primo dei quali abbia un estremo nell'origine, i settori corrispondenti sono proporzionali ai numeri 1, 7, 19, 37, 61, ... differenze dei cubi dei numeri della serie naturale; e reciprocamente ».

§ 5. Se $MB_1, B_1B_2, B_2B_3, \dots$ sono archi eguali del cerchio evoluta ed $MA_1, A_1A_2, A_2A_3, \dots$ gli archi corrispondenti della sviluppante, ponendo $MB_1 = \sigma$, si ha:

$$OA_1 = \sqrt{\sigma^2 + \frac{h^2}{4}}, \quad OA_2 = \sqrt{4\sigma^2 + \frac{h^2}{4}}, \quad OA_3 = \sqrt{9\sigma^2 + \frac{h^2}{4}}, \dots$$

e quindi:

$$MA_1 = \frac{\sigma^2}{h}, \quad MA_2 = \frac{4\sigma^2}{h}, \quad MA_3 = \frac{9\sigma^2}{h}, \dots$$

Avremo dunque:

$$MA_1 = 1MA_1, \quad A_1A_2 = 3MA_1, \quad A_2A_3 = 5 \cdot MA_1, \dots$$

cioè:

« Gli archi della sviluppante di cerchio che corrispondono ad archi eguali del cerchio evoluta, il primo dei quali ha un estremo nell'origine sono proporzionali ai numeri dispari; e conseguentemente (§ 4) i settori che corrispondono a questi archi sono proporzionali ai numeri 1, 7, 19, 37, 61, ... differenze dei cubi dei numeri della serie naturale ».

Soddisfano evidentemente a questo teorema gli archi $MP_1, P_1P_2, P_2P_3, \dots$ dell'evolvente che sono compresi fra le estremità dei vari cicli (V. § 2).

Siccome poi si ha:

$$MP_1 = h\pi \quad \text{e quindi:} \quad OP_1 = \sqrt{\pi^2 h^2 + \frac{h^2}{4}}$$

sarà:

$$\text{arco } MP_1 = \pi^2 h$$

Dunque:

« L'arco di sviluppante che corrisponde a tutto lo sviluppo del cerchio evoluta è eguale alla circonferenza avente per diametro la circonferenza del cerchio evoluta ».

Se si prendono gli archi $MA_1, A_1A_2, A_2A_3, \dots$ tutti eguali ad l , si hanno le eguaglianze:

$$(\text{arco } MB_1)^2 = hl; \quad (\text{arco } MB_2)^2 = 2hl; \quad (\text{arco } MB_3)^2 = 3hl; \dots$$

le quali dimostrano il teorema:

« Se più archi successivi della sviluppante (il primo dei quali abbia un estremo nell'origine) sono eguali fra loro, i quadrati degli archi corrispondenti del cerchio evoluta, contati tutti a partire dall'origine, formano una progressione aritmetica di ragione hl , essendo l la lunghezza degli archi dell'evolvente ».

Se fra l'arco s della sviluppante e l'arco corrispondente σ del cerchio evoluta ha luogo la condizione $s = m\sigma$, siccome:

$$hs = \sigma^2,$$

si ottiene:

$$s = m^2h, \quad \sigma = mh$$

Dunque:

« *Quell'arco della sviluppante che comincia dall'origine e che è eguale ad m volte il corrispondente arco dell'evoluta, ha una lunghezza eguale a m^2 volte il diametro del cerchio evoluta, e il raggio di curvatura nella sua estremità è m volte questo diametro* ».

Se poi la proprietà precedente ha luogo per un arco AB non cominciante dall'origine, ponendo $MA_1 = s$, $MA_2 = s_1$, si ha:

$$hs_1 = \sigma_1^2, \quad hs = \sigma^2$$

e quindi:

$$h(s_1 - s) = (\sigma_1 - \sigma)(\sigma_1 + \sigma) = \frac{1}{m}(s_1 - s)(\sigma_1 + \sigma)$$

Dividendo per $s_1 - s$, risulta:

$$\sigma_1 + \sigma = \rho_1 + \rho = mh$$

Dunque:

« *Gli archi della sviluppante che sono eguali ad m volte i corrispondenti dell'evoluta, sono quelli in cui la somma dei raggi di curvatura estremi è eguale ad m volte il diametro del cerchio evoluta* ».

Se $OA_1, OA_2, \dots, OA_{n-1}, OA_n$ sono dei raggi vettori in progressione geometrica di ragione q e si pone:

$$R = OA_1, s_1 = AA_2, s_2 = A_1A_3, \dots, s_n = A_{n-1}A_n,$$

si ha:

$$s_n = \frac{q^2 - 1}{h} \cdot q^{2(n-1)} \cdot R^2,$$

ovvero:

$$s_n = \frac{1 - q^2}{h} \cdot q^{2(n-1)} \cdot R^2,$$

secondo che gli archi s sono diretti dalla parte dei raggi vettori crescenti o decrescenti.

Possiamo dunque dire:

« *Se si prendono dei raggi vettori consecutivi in progressione geometrica di ragione q , gli archi successivi che essi determinano sono in progressione geometrica di ragione q^2* ».

Se $q > 1$, si ha un'infinità di raggi vettori R e di archi s ; se $q < 1$, dalla parte dei raggi vettori decrescenti si potranno portare m archi consecutivi purché si abbia:

$$R \geq \frac{h}{2q^m}.$$

Siano A, B, C tre punti della sviluppante, R, R₁, R₂ i loro raggi vettori, e sia:

$$R_1 = mR, R_2 = nR$$

Avendosi:

$$AB = \frac{m^2 - 1}{h} R^2, \quad AC = \frac{n^2 - 1}{h} R^2,$$

risulta:

$$(12) \quad \frac{AB}{AC} = \frac{m^2 - 1}{n^2 - 1}$$

Se ora consideriamo gli altri tre punti A₁, B₁, C₁ corrispondenti ai raggi vettori qR, qR₁, qR₂, si ha pure:

$$A_1B_1 = \frac{m^2 - 1}{h} q^2 R^2, \quad A_1C_1 = \frac{n^2 - 1}{h} q^2 R^2$$

e quindi:

$$\frac{A_1B_1}{A_1C_1} = \frac{m^2 - 1}{n^2 - 1} = \frac{AB}{AC}$$

Da questo teorema derivano molte proprietà della sviluppante di cerchio. Così ad esempio:

« Se quattro raggi vettori consecutivi di una particolare sviluppante di cerchio determinano tre archi che si possano considerare come i lati di un triangolo rettangolo, i medesimi raggi, o altri ad essi proporzionali, hanno la stessa proprietà in tutte le sviluppanti di cerchio ».

Così pure:

« Il rapporto anarmonico di quattro punti A, B, C, D di una particolare sviluppante di cerchio è eguale al rapporto anarmonico degli altri quattro punti A₁, B₁, C₁, D₁ di qualsivoglia sviluppante di cerchio, i cui raggi vettori sono eguali, o proporzionali, a quelli dei primi » ecc. ecc.

Dall'equazione (12) si ricava l'altra:

$$(13) \quad \frac{BC}{AB} = \frac{n^2 - m^2}{m^2 - 1},$$

la quale conduce a molte proprietà della nostra curva.

Supponendo per esempio successivamente $m = 2, 3, 4, 5$ e determinando per quali valori di n il rapporto $\frac{BC}{AB}$ è intero, nonché il valore di detto rapporto, si giunge al teorema:

« Se in una sviluppante di cerchio si conducono tre raggi vettori OA, OB, OC, il primo arbitrario, il secondo multiplo del primo secondo uno dei numeri 2; 3; 4; 5 e il terzo multiplo del primo rispettivamente secondo uno dei numeri:

$3\alpha \pm 1; 8\alpha \pm 1$, ovvero $8\alpha \pm 3; 15\alpha \pm 1$, ovvero $15\alpha \pm 4; 24\alpha \pm 1$,
ovvero $24\alpha \pm 5$, ovvero $24\alpha \pm 7$, ovvero $24\alpha \pm 11$,

l'arco BC è multiplo di AB rispettivamente secondo i numeri:

$3\alpha^2 \pm 2\alpha - 1$; $8\alpha^2 \pm 2\alpha - 1$, ovvero $8\alpha^2 \pm 6\alpha$; $15\alpha^2 \pm 2\alpha - 1$, ovvero $15\alpha^2 \pm 8\alpha$; $24\alpha^2 \pm 2\alpha - 1$, ovvero $24\alpha^2 \pm 10\alpha$, ovvero $24\alpha^2 \pm 14\alpha + 1$, ovvero $24\alpha^2 \pm 22\alpha + 4$, essendo α un numero intero qualunque ».

Parma, maggio 1896.

G. PIRONDINI.

NOTA SOPRA ALCUNE FORMOLE DI STEINER

Si descrivano due circonferenze interne l'una all'altra coi raggi R, r ed i centri O ed E alla distanza d ; il punto D della retta OE di egual potenza rispetto ai due cerchi lontano da O del segmento $OD = \delta$, vien determinato da

$$(1) \quad t^2 = \delta^2 - R^2 = (\delta - d)^2 - r^2;$$

da cui si traggono (2)

$$\delta = \frac{d^2 + R^2 - r^2}{2d}, \quad t = \frac{1}{2d} \sqrt{(d + R + r)(d + R - r)(d - R - r)(d - R + r)}.$$

Sulla stessa OE prendiamo il punto I alla distanza $OI = \delta \pm t$ per centro d'inversione e p^2 per potenza, i cerchi O ed E si trasformeranno in due altri concentrici coi raggi (3) $r' = \frac{p^2 r}{2t(t + \delta - d)}$, $R' = \frac{p^2 R}{2t(t + \delta)}$ e col centro comune O' definito per $IO' = \frac{p^2}{2t}$. Due circonferenze C_n, C_{n+1} tangenti ai cerchi O, E ed esternamente fra loro si convertono nei cerchi inversi C'_n, C'_{n+1} , che toccheranno le circonferenze concentriche O' e fra loro avranno pure il contatto esterno; la distanza di due centri successivi pari al diametro $r' - R'$ di ciascuna apparirà dal centro O' sotto l'angolo ω dato per (4) $\sin \frac{\omega}{2} = \frac{r' - R'}{r' + R'}$. Supponendo m cerchi $C_1, C_2, C_3, \dots, C_{m-1}, C_m$, tangenti fra loro e l'ultimo col primo, iscritti nello spazio comune ai cerchi O ed E , ne conseguirà i centri degl'inversi C'_n esser i vertici di un poligono regolare stellato m -latero e della specie h ; quindi $m\omega = 2h\pi$ ed in virtù delle relazioni (1), (2), (3) (4) ricaveremo

$$4 \operatorname{tang}^2 \frac{\pi h}{m} = \frac{(r' - R')^2}{r' R'} = \frac{1}{Rr} \left(\frac{r}{t + \delta - d} - \frac{R}{t + \delta} \right)^2 (t + \delta)(t + \delta - d) = \\ = \frac{1}{Rr} \left[(R - r)^2 - d \left(\frac{R^2}{t + \delta} - \frac{r^2}{t + \delta - d} \right) \right] = \frac{1}{Rr} [(R - r)^2 - d^2];$$

il qual teorema di Steiner si enuncia « affinché m cerchi $C_1, C_2, C_3, \dots, C_m$ tangenti successivamente fra loro e l'ultimo al primo tocchino due cerchi R, r interni l'uno all'altro e coi centri alla distanza d , dovrà sussistere la condizione

$$(5) \quad d^2 = (R - r)^2 - 4Rr \operatorname{tang}^2 \frac{\pi h}{m},$$

essendo n ed m interi positivi; la condizione è indipendente dalla situazione del cerchio iniziale.

In secondo luogo consideriamo due cerchi della superficie sferica, descritti coi poli O ed E , i raggi sferici R, r e d rappresenti l'arco OE di cerchio massimo; scegliendo per origine d'inversione il punto della sfera opposto ad O , si denotino con R_1, r_1 i raggi delle proiezioni stereografiche aventi i loro centri O_1, E_1 alla distanza d_1 ; posto uno il raggio della sfera facilmente otterremo le relazioni

$$(6) \quad d_1 = \frac{\operatorname{sen} d}{\cos d + \cos r}, \quad r_1 = \frac{\operatorname{sen} r}{\cos d + \cos r}, \quad R_1 = \operatorname{tang} \frac{R}{2};$$

sostituendo questi valori nella (5), dopo aver messo l'indice 1 ai simboli d, R, r , deduciamo l'eguaglianza

$$\cos^2 \frac{R}{2} \operatorname{sen}^2 d - \left[\operatorname{sen} \frac{R}{2} \cos d + \operatorname{sen} \left(\frac{R}{2} - r \right) \right]^2 = 2 \operatorname{sen} R \operatorname{sen} r (\cos r + \cos d) \operatorname{tang}^2 \frac{\pi h}{m}.$$

Osservando il primo membro essera identico a

$$2 \operatorname{sen} \frac{d + R - r}{2} \operatorname{sen} \frac{d + r - R}{2} (\cos d + \cos r),$$

ne scaturisce la seconda formola di Steiner

$$(7) \quad \cos d = \cos (R - r) + 2 \operatorname{sen} r \operatorname{sen} R \operatorname{tang}^2 \frac{\pi h}{m}.$$

Infine due sfere interne l'una all'altra coi centri O ed E situati alla distanza d e coi raggi R, r mediante l'inversione per le relazioni (3) si cambieranno in due sfere coi raggi r', R' ed il centro comune O' ; ogni sfera ad essa tangente avrà il diametro $r' - R'$. Ora i centri C'_n della m sfere tangenti fra loro successivamente ed alle sfere concentriche sono distanti dal centro O' dei segmenti eguali ad $\frac{r' + R'}{2}$ e giacciono in una certa circonferenza avente il centro O'' ed il raggio $\rho' = \frac{r' - R'}{2} \operatorname{sen} \theta$, dove θ simboleggia l'angolo $O'O C'_n$. Gli stessi punti C'_n saranno vertici di un poligono regolare stellato m -latero e della specie h , allorchè l'ultima sfera C'_m tocchi la prima C'_1 ; ponendo $\alpha = \frac{2h\pi}{m}$ per l'angolo sotto cui vedesi dal centro O'' la distanza $C'_n C'_{n+1}$ eguale al diametro di ogni sfera C'_n troveremo

$$r' - R' = 2\rho' \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2};$$

e eliminando ρ' ed α fra le precedenti eguaglianze risulterà

$$(8) \quad \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \frac{h\pi}{m} = \frac{r' - R'}{r' + R'} = \frac{dR - (R - r)(t + \delta)}{(R + r)(t + \delta) - dR}$$

a causa delle (3). Nel caso particolare di $\theta = \omega$ a motivo della (4) dedurremo

$$\rho' = 2 \left(\frac{r' - R'}{r' + R'} \right) \sqrt{r' R'} \quad , \quad \operatorname{sen}^2 \frac{h\pi}{m} = \frac{(r' + R')^2}{16r' R'}$$

e riducendo con le formole (3) si conchiuderà la terza relazione di Steiner

$$d^2 = (R + r)^2 - 16 Rr \operatorname{sen}^2 \frac{h\pi}{m}.$$

GRANDEZZE FINITE ED INFINITE

(Estratto di una lettera del Prof. RODOLFO BETTAZZI al direttore del
" Periodico di Matematica ")

Carissimo Amico,

Il tuo articolo « Sul postulato dell'equivalenza » comparso nel fascicolo 2° del Periodico di quest'anno, mi suggerisce alcune osservazioni in proposito, che vedrei volentieri pubblicate sul tuo giornale.

Trovo opportunissimo quello che dici circa la definizione *Frattini-Giudice* della grandezza finita, che cioè un ente, in quanto è grandezza, va giudicato a seconda della classe a cui si considera appartenente, poiché variano insieme a questa gli enti che possono dirsi sue parti; ma osservo che non si è fatto abbastanza quando si siano dette finite od infinite le grandezze, secondochè appartengono a classi di 1^a o di 2^a specie.

Infatti nelle classi di 2^a specie vi possono essere grandezze tali che convenienti multiple di qualunque loro parte le superano, e grandezze per cui esistono parti nessuna multipla delle quali può superarle: e una distinzione fra le une e le altre è opportuna, non essendo conveniente dire infinite tutte quelle grandezze per il solo fatto che appartengono a classi di 2^a specie. Pure ammettendo dunque che lo studio delle grandezze debba farsi dopo definite le classi a cui si fanno appartenere, (come dico ancor io nella mia « Teoria delle grandezze ») e che nelle classi di 1^a specie non occorrono altre distinzioni, essendo in esse finite tutte le loro grandezze, resta stabilito che per quelle di 2^a specie convenga distinguere le grandezze stesse, secondochè hanno il carattere del finito o dell'infinito. Ciò, in particolare, è necessario nella classe di tutte le superficie piane (poligoni, striscie, angoli) e in quella delle parti dello spazio (poliedri, prismi indefiniti, strati, diedri ed angoloidi) le quali sono di 2^a specie.

Sta bene poi che le grandezze infinite si potrebbero graduare anche per l'ordine d'infinito, secondo quello che tu dici; ma purchè ciò si faccia *nell'interno di ciascuna classe*, potendo una grandezza da dirsi infinita del 1° ordine in una classe divenire di 2°, di 3°,... ed anche di nessun ordine in un'altra.

Venendo all'ultima parte del tuo articolo, alla questione cioè se convenga o no adottare il concetto delle grandezze finite da dirsi trascurabili di fronte a quelle infinite, rispondo che, a mio credere, *non conviene* sia per la complicazione dell'idea eccessiva in un corso elementare, sia

perchè la ritengo come pericolosissima in mano ad uno scolaro, che potrebbe finire facilmente col trascurare anche quello che non è trascurabile.

Si potrebbe eliminare questo secondo pericolo dando al postulato la forma più precisa: « Due grandezze infinite di una classe, tali che l'una si ottenga dall'altra sottraendo una parte finita, o infinita d'ordine inferiore, sono equivalenti » ma non scompaiono nonostante tutte le difficoltà. Ed invero l'equivalenza di cui si parla in questo postulato non può essere in generale l'uguaglianza: per es. un piano non sarà mai uguale ad un piano a cui sia tolto un poligono. Allora o è necessario che venga data una prima definizione d'equivalenza anche per le grandezze infinite di una classe, il che in geometria non si è soliti a fare contentandosi di considerare l'uguaglianza per le grandezze di classi di 1^a specie (segmenti, angoli, strisce, archi, settori circolari, diedri, strati ecc.) e l'equivalenza per le grandezze finite di classi di 2^a specie (poligoni nelle superficie piane, poliedri fra le parti di spazio ecc.) oppure il postulato può includersi nelle definizioni di equivalenza, dicendo equivalenti due grandezze infinite di una classe quando sono scomponibili in parti uguali, tranne alcuna finita o infinita di ordine inferiore che compaiono nell'una e non nell'altra.

Che la questione abbia importanza scientificamente debbo essere io il primo ad ammetterlo; giacchè usare il tuo postulato equivale a considerare isolata nella classe di 2^a specie la sottoclasse delle sue grandezze infinite, e l'isolamento delle sottoclassi introdussi appunto e studiai nella mia « Teoria delle grandezze » (§§ 34 e segg.) Ma credi tu che convenga trattar questo nella scuola? Io giudico di no, quando penso al da fare che, e nella scuola e fuori, dà ai geometri la teoria dell'equivalenza anche per le sole grandezze finite!

Anche ammettendo il postulato o la nuova definizione d'equivalenza, ti confesso poi che non vedo come con esso si semplifichino le dimostrazioni dei teoremi che tu citi, almeno quando queste si vogliono avere rigorose. Esse invero sono fondate sul fatto che due figure equivalenti fra loro in una classe abbiano ad essere equivalenti in un'altra, ed anzi uguali, ciò che, colle osservazioni da me fatte in principio, non è cosa davvero evidente. P. es. nel Teorema 1^o sulla somma degli angoli di un triangolo tu dimostri che la somma degli angoli esterni (cioè il piano meno il triangolo) è equivalente all'intero piano, il che è giusto, considerando tali figure come grandezze della classe *superficie piane*, nella quale il triangolo, grandezza finita, è trascurabile rispetto all'intero piano, almeno dato il postulato. Ma quando tu consideri la somma degli angoli come un angolo ed il piano come un giro, cioè quando consideri quegli enti non più nella classe delle superficie piane ma bensì in quella degli angoli, come fai a concludere che in questa nuova classe, dove il concetto di equivalenza è diverso, e le parti non sono che angoli, le figure continuino ad essere equivalenti, e più ancora che siano uguali? Ciò sarà

anche vero; ma per lo meno richiede una dimostrazione, che toglie ogni semplicità al teorema.

Concludo che l'idea della graduazione degli ordini d'infinito nelle classi geometriche non mi pare appropriata alla geometria elementare: e, quanto meno, non può usarsi per applicare ad enti, considerati in una classe, conclusioni dedotte quando quegli enti si considerano in un'altra.

Osservo qui di passaggio che l'ammissione del postulato da te chiesto darebbe come conclusione che una grandezza che è infinita in una classe, essendo equivalente a quella che si ottiene trascurandone una parte finita, non soddisferebbe al Postulato De Zolt-De Paolis: e avremmo la distinzione delle grandezze in finite ed infinite secondochè soddisfano o no a tale postulato.

tuo affmo

RODOLFO BETTAZZI.

Torino 23 Marzo 1897.

SOLUZIONI DELLE QUISTIONI 339* 340* 352* 356* 364* 365*

339. Nel cono descritto dalla rotazione dell'angolo θ intorno ad un suo lato si conduce un piano perpendicolare ad una generatrice e distante dal segmento d dal vertice; esprimere in funzione di θ e d gli assi, il parametro della conica e gli angoli formati dalle generatrici passanti per due vertici della curva.

340. Per un punto di una superficie conica circolare retta, condurre un piano secante in modo che gli assi della ellisse (o dell'iperbole) abbiano una data ragione k . Si conosce la distanza d del punto dal vertice e l'angolo 2θ del cono.

BELLACCHI.

Risoluzione del sig. Riccardo Micks professore al Ginnasio Comunale di Trieste.

Facendo passare pel vertice del cono un piano normale al piano dato (MN), otterremo le due generatrici e l'asse della conica. Sia O il punto in cui una di queste generatrici viene tagliata dal detto asse, d la distanza dal punto O dal vertice V del cono e β l'angolo che l'asse forma colla generatrice.

Facendo inoltre passare per un punto qualunque Q di quest'asse un piano parallelo alla base del cono, questo taglierà il cono secondo un cerchio di raggio TR (diametro STR) ed il piano della conica nella retta PQ, ove P è un punto della conica.

Prendendo O quale origine delle coordinate, il menzionato asse della conica come asse delle ascisse ed una parallela alla PQ come asse delle ordinate avremo

$$OQ = x \quad \text{e} \quad PQ = y.$$

Essendo 2θ l'angolo delle due generatrici del cono, avremo che l'angolo OQR del triangolo OQR sarà $= 90^\circ - (\beta - \theta)$ e quindi, applicando al triangolo OQR il

teorema dei seni, avremo

$$OR = \frac{x \cos(\beta - \theta)}{\cos \theta} \quad \text{e} \quad QR = \frac{x \sin \beta}{\cos \theta}.$$

E quindi il raggio $TR = (VO + OR) \sin \theta$,

$$TR = \left(d + \frac{x \cos(\beta - \theta)}{\cos \theta} \right) \sin \theta,$$

ed

$$SQ = SR - QR = 2 \cdot TR - QR.$$

Da un teorema noto si ha

$$\overline{PQ^2} = \overline{SQ \cdot QR};$$

da cui, sostituendo tutti i valori e riducendo, si ottiene

$$(1) \quad y^2 = 2d \cdot \operatorname{tg} \theta \cdot \sin \beta \cdot x - \frac{\sin \beta \cdot \sin(\beta - 2\theta)}{\cos^2 \theta} x^2,$$

la quale equazione della conica confrontata coll'equazioni

$$\begin{aligned} y^2 &= 2px - qx^2 && \text{per l'elisse} \\ y^2 &= 2px && \text{" la parabola} \\ y^2 &= 2px + qx^2 && \text{" l'iperbole,} \end{aligned}$$

dà

$$(2) \quad \begin{cases} \text{per l'elisse la condizione} & \beta > 2\theta \\ \text{" la parabola} & \beta = 2\theta \\ \text{" l'iperbole} & \beta < 2\theta. \end{cases}$$

Calcoliamo ora i semiassi.

Dalla (1) risulta $p = d \operatorname{tg} \theta \cdot \sin \beta$, e

$$q = \frac{p}{\alpha} = \frac{\sin \beta \cdot \sin(\beta - 2\theta)}{\cos^2 \theta};$$

per cui otteniamo facilmente i semiassi

$$a = d \sin \theta \cdot \frac{\cos \theta}{\sin(\beta - 2\theta)}$$

$$b = d \sin \theta \cdot \sqrt{\frac{\sin \beta}{\sin(\beta - 2\theta)}}$$

Problema 339. — Dalle condizioni (2) risulta che per caso speciale $\beta = 90^\circ$ avremo

una elisse se $2\theta < 90^\circ$, una parabola se $2\theta = 90^\circ$, ed un'iperbole se $2\theta > 90^\circ$.

I semiassi si ottengono dalla (3) per $\beta = 90^\circ$,

$$a = \frac{d}{2} \operatorname{tg} 2\theta \quad \text{e} \quad b = d \sqrt{\frac{\sin \theta}{\cos 2\theta}};$$

per cui in tal caso l'angolo (φ) che inchiodono le due generatrici, che passano pei vertici della conica, si ottiene dall'equazione

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \theta}{\cos 2\theta} \sqrt{3 \cos^2 \theta - 1}.$$

Problema 340. — Sia la ragione dei semiassi $\frac{a}{b} = k$.

Da (3) si ottiene allora

$$\sin \beta \cdot \sin(\beta - 2\theta) = \frac{\cos^2 \theta}{k^2},$$

e quindi

$$\cos 2(\beta - \theta) = \cos 2\theta - \frac{2 \cos^2 \theta}{k^2}$$

ci dà l'angolo β , che deve in tal caso includere il piano.

Altre risoluzioni della questione 340 del Prof. Retali, delle 339 e 340 del sig. Guido Fubini studente della Scuola normale superiore di Pisa e del sig. Ernesto Laura allievo del R. Istituto tecnico di Torino.

352.* *Determinare una piramide triangolare regolare, conoscendo la superficie totale s e la distanza h dei vertici della base dalle facce opposte.*

LUIGI BOSI.

Risoluzione del sig. Ernesto Tucci, alunno del R. Istituto Tecnico di Livorno.

Sia (S, ABC) la piramide, $SD = z$ l'apotema di essa, $SP = y$ l'altezza relativa ad ABC , x il lato della base, m la sua mediana. — Poniamo, per l'omogeneità $s = a^2$.

Si ha per dato:

$$(I) \quad \frac{3xz}{2} + \frac{x^2 \sqrt{3}}{4} = a^2, \text{ ossia } 6xz + x^2 \sqrt{3} = 4a^2.$$

Dal triangolo rettangolo SPD si ha $z^2 = y^2 + PD^2$.

P essendo il baricentro del triangolo ABC , è $PD = \frac{1}{3}m = \frac{x\sqrt{3}}{6}$ e quindi $PD^2 = \frac{x^2}{12}$, per cui

$$(II) \quad z^2 = y^2 + \frac{x^2}{12}$$

Si ha pure

$$(III) \quad \frac{1}{6}xz h = \frac{1}{6}yx^2 \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ da cui } z = \frac{xy\sqrt{3}}{2h}.$$

Innalzando a quadrato e sostituendo nella (II) avremo,

$$(IV) \quad \frac{3x^2 y^2}{4h^2} = y^2 + \frac{x^2}{12}, \text{ da cui } x^2 = \frac{12h^2 y^2}{9y^2 - h^2}$$

Sostituendo nella (I) il valore di z dato dalla (III), avremo

$$x^2 \sqrt{3} (3y + h) = 4a^2 h, \text{ e per la (IV) } \frac{12h^2 y^2 \sqrt{3} (3y + h)}{9y^2 - h^2} = 4a^2 h,$$

ovvero

$$(V) \quad f(y) = 3hy^2 \sqrt{3} - 3a^2 y + a^2 h = 0$$

$$y = \frac{a^2 \sqrt{3} \pm a \sqrt{3a^2 - 4h^2 \sqrt{3}}}{6h}.$$

DISCUSSIONE. — Affinché y sia reale dev'essere $3a^2 \geq 4h^2 \sqrt{3}$, ossia

$$(VI) \quad a \geq \frac{2h}{\sqrt{3}}.$$

Soddisfatta questa condizione, le due radici della (V) sono positive, però y dev'essere tale da rendere positivo il secondo membro della (IV) e così dev'essere

$y > \frac{h}{3}$. Ora sostituendo nella (V) si ha: $f\left(\frac{h}{3}\right) = \frac{h^2 \sqrt{3}}{3} > 0$; d'altra parte la semisomma delle radici della (V) è espressa da $\frac{a^2}{2h\sqrt{3}}$, quindi, in causa della (VI), sarà

maggiore di $\frac{2h}{3}$ e a fortiori di $\frac{h}{3}$. Si conclude che, soddisfatta la (VI), entrambi le radici sono reali e maggiori di $\frac{h}{3}$. Il problema ha quindi, in tale ipotesi, due soluzioni che si riducono ad una nel

CASO PARTICOLARE $\alpha = \frac{2h}{\sqrt{3}}$. Sarà in questo caso $x = \frac{4h}{3}$, $y = \frac{2h}{3}$, $z = \frac{4h\sqrt{3}}{9}$;

e quindi: "Data solamente h , la superficie totale s è minima ed uguale a $\frac{4h^2}{\sqrt{3}}$, quando il lato della base è uguale a $\frac{4h}{3}$."

356. Costruire le parabole che hanno una data direttrice, e

- a) passano per due punti dati;
- b) passano per un punto e toccano una retta data;
- c) toccano due rette date.

RELLI.

Risoluzione del sig. Ernesto Tucci, alunno nel R. Istituto Tecnico di Livorno.

Basta, per ogni caso costruire il fuoco della curva.

a) Siano M ed N i punti dati. Centro in M ed in N successivamente si descrivano due circonferenze tangenti alla direttrice. Il fuoco, per una proprietà della parabola, dovendo appartenere ad ambedue le circonferenze sarà sulla loro intersezione. Avremo quindi due, una, o nessuna soluzione, secondo che le circonferenze sono secanti, tangenti esternamente o esterne l'una all'altra. Se sono tangenti esternamente, i punti e il fuoco sono in linea retta. Se la retta MN è perpendicolare alla direttrice, le circonferenze sono tangenti internamente e la parabola degenera in una semiretta.

b) Sia M il punto dato, t la retta data. Centro in M si descriva la circonferenza tangente alla direttrice.

Per il punto d'incontro P della retta t colla direttrice conducasi la retta PQ simmetrica della direttrice rispetto alla t . Il fuoco, per un noto teorema, dovendo appartenere alla PQ e alla circonferenza, sarà sulla loro intersezione. Avremo quindi due, una o nessuna soluzione, secondo che la PQ è secante, tangente o esterna alla circonferenza. Per avere il punto di contatto della tangente t , basta costruire il simmetrico del fuoco rispetto a t , il quale apparterrà alla direttrice, e da quel punto innalzare una perpendicolare alla direttrice fino all'incontro della t in un punto, che sarà quello richiesto. Oppure si può innalzare dal fuoco una perpendicolare alla PQ fino all'incontro della t in un punto, etc. Se la PQ è tangente alla circonferenza M, il punto M, il fuoco ed il punto di contatto saranno in linea retta.

c) Si conducano le simmetriche d, d' della direttrice rispetto alle tangenti date t, t' . Il loro punto d'incontro F è il fuoco della parabola. Al solito i punti di contatto si troveranno, determinando le intersezioni rispettive della t e t' con le normali alle d, d' condotte da F.

Se le tangenti t e t' sono parallele, oppure se fanno con la direttrice angoli uguali a un semiretto, allora le d e d' saranno parallele ed il problema non avrà soluzione.

Altre risoluzioni del Prof. Umberto Ceretti e del sig. Emilio Stretti, allievo della R. Accademia navale.

364. Indicando in generale con $f(a, b)$ l'espressione:

$$d_1 \cdot d_2 \dots d_n \cdot \varphi \left(\frac{a}{d_1 \cdot d_2 \dots d_n} \right),$$

nella quale è

$$d_1 = D(a, b), d_2 = D\left(\frac{a}{d_1}, d_1\right), d_3 = D\left(\frac{a}{d_1 d_2}, d_2\right); \dots d_n = D\left(\frac{a}{d_1 d_2 \dots d_{n-1}}, d_{n-1}\right),$$

e si suppone $d_{n+1} = 1$, dimostrare che, se a, b sono divisori di m , sussiste la relazione

$$f(m, a) \cdot f(a, b) \cdot b = f(m, b) f(b, a) \cdot a.$$

365. Sia m multiplo di a e b .

Se m non contiene altri fattori primi oltre quelli di a, b sussiste la relazione:

$$f(a, b) \cdot m = f(m, b) \cdot a;$$

ed inversamente, se ha luogo tale relazione, m si compone con soli fattori primi di a, b .

U. SCARPIS.

Risoluzione del sig. Eugenio Stocchi alunno del R. Istituto tecnico di Ravenna.

LEMMA. — Condizione necessaria e sufficiente affinché ogni fattore primo di p sia fattore primo di q e viceversa, è che i due numeri siano proporzionali ai loro indicatori.

Sia

$$p = a^\alpha b^\beta \dots l^\lambda, \quad q = a^{\alpha_1} b^{\beta_1} \dots l^{\lambda_1};$$

si ha quindi

$$\varphi(p) = p \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{l}\right), \quad \varphi(q) = q \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{l}\right);$$

$$\frac{\varphi(p)}{p} = \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{l}\right), \quad \frac{\varphi(q)}{q} = \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{l}\right);$$

quindi

$$\frac{\varphi(p)}{p} = \frac{\varphi(q)}{q}$$

La condizione è dunque necessaria.

Si abbia ora

$$\frac{\varphi(p)}{p} = \frac{\varphi(q)}{q},$$

e si ponga

$$q = a^{\alpha_1} b^{\beta_1} c^{\gamma_1} \dots$$

$$p = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$$

Allora si ha

$$\frac{\varphi(p)}{p} = \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \dots, \quad \frac{\varphi(q)}{q} = \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \dots;$$

quindi per ipotesi

$$\left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{c}\right) \dots = \left(1 - \frac{1}{a_1}\right) \left(1 - \frac{1}{b_1}\right) \left(1 - \frac{1}{c_1}\right) \dots;$$

ossia

$$(1) \quad \frac{(a-1)(b-1)(c-1)\dots}{a \cdot b \cdot c \dots} = \frac{(a_1-1)(b_1-1)(c_1-1)\dots}{a_1 b_1 c_1 \dots}$$

Ed ora riducendo, ai minimi termini la frazione $\frac{(a-1)(b-1)\dots}{a b \dots}$, otterremo la

frazione $\frac{h}{k}$, in cui k , non potendo essere eguale al 1, perchè la frazione considerata è evidentemente minore dell'unità, contiene qualunno dei fattori primi a, b, c, \dots . Supponiamo che contenga a . — D'altra parte la frazione $\frac{(a_1-1)(b_1-1)\dots}{b_1 b_1 \dots}$ ha i suoi termini equimultipli dei termini della $\frac{h}{k}$, dunque il prodotto dei fattori primi a, b, c, \dots è divisibile per k e quindi per a ; ma allora a è eguale ad uno di essi; sia eguale ad a_1 . Allora si ha $\frac{a-1}{a} = \frac{a_1-1}{a_1}$, per cui dalla (1) si ricava

$$(2) \quad \frac{(b-1)(c-1)\dots}{b c \dots} = \frac{(b_1-1)(c_1-1)\dots}{b_1 c_1 \dots}$$

In modo analogo possiamo provare che uno dei fattori primi b, c, \dots è uguale ad uno dei fattori primi b_1, c_1, \dots ; sia $b = b_1$. Ma allora si ricava $\frac{b-1}{b} = \frac{b_1-1}{b_1}$, per cui dalla (2) si ha

$$\frac{(c-1)\dots}{c \dots} = \frac{(c_1-1)\dots}{c_1 \dots}$$

È chiaro che così continuando potremo provare che ciascuno dei fattori primi a, b, c, \dots è eguale ad uno dei fattori primi a_1, b_1, c_1, \dots ; e non può darsi che si esaurisca l'una serie di fattori prima dell'altra perchè allora si avrebbe un'eguaglianza della forma

$$1 = \frac{(m-1)(n-1)\dots}{m \cdot n \dots},$$

il che è evidentemente impossibile.

La condizione è quindi anche sufficiente.

Passiamo ora alla risoluzione delle quistioni proposte.

364. Si formino i seguenti specchi di eguaglianze:

(1)	(2)
$(5) \begin{cases} a = d\alpha \\ b = d\beta \end{cases}; \alpha \text{ primo con } \beta$	$(6) \begin{cases} m = a \cdot r \\ a = a \cdot 1 \end{cases}$
$(5) \begin{cases} \alpha = d_1 \alpha_1 \\ d = d_1 \beta_1 \end{cases}; \alpha_1 \text{ primo con } \beta_1$	$(6) \begin{cases} r = t_1 \omega_1 \\ a = t_1 \mu_1 \end{cases}; \omega_1 \text{ primo con } \mu_1$
$(5) \begin{cases} \alpha_1 = d_2 \alpha_2 \\ d_1 = d_2 \beta_2 \end{cases}; \alpha_2 \text{ primo con } \beta_2$	$(6) \begin{cases} \omega_1 = t_2 \omega_2 \\ t_1 = t_2 \mu_2 \end{cases}$
\dots	\dots
$(5) \begin{cases} \alpha_{h-2} = d_{h-1} \alpha_{h-1} \\ d_{h-2} = d_{h-1} \beta_{h-1} \end{cases}; \alpha_{h-1} \text{ primo con } \beta_{h-1}$	$(6) \begin{cases} \omega_{p-2} = t_{p-1} \omega_{p-1} \\ t_{p-2} = t_{p-1} \mu_{p-1} \end{cases}; \omega_{p-1} \text{ primo con } \mu_{p-1}$
$(5) \begin{cases} \alpha_{h-1} = d_h \alpha_h \\ d_{h-1} = d_h \beta_h \end{cases}; \alpha_h \text{ primo con } \beta_h$	$(6) \begin{cases} \omega_{p-1} = t_p \omega_p \\ t_{p-1} = t_p \mu_p \end{cases}; \omega_p \text{ primo con } \mu_p$

$$\begin{array}{l}
 (3) \\
 (7) \frac{b}{a} = \frac{d}{d\alpha}; \beta \text{ primo con } \alpha \\
 \hline
 (7) \frac{\beta}{d} = \frac{\delta_1 \rho_1}{\delta_1 \sigma_1}; \rho_1 \text{ primo con } \sigma_1 \\
 \hline
 (7) \frac{\rho_1}{\delta_1} = \frac{\delta_2 \rho_2}{\delta_2 \sigma_2}; \rho_2 \text{ primo con } \sigma_2 \\
 \hline
 \dots \\
 \hline
 (7) \frac{\rho_{k-2}}{\delta_{k-2}} = \frac{\delta_{k-1} \rho_{k-1}}{\delta_{k-1} \sigma_{k-1}}; \rho_{k-1} \text{ primo con } \sigma_{k-1} \\
 \hline
 (7) \frac{\rho_{k-1}}{\delta_{k-1}} = \frac{\delta_k \rho_k}{\delta_k \sigma_k}; \rho_k \text{ primo con } \sigma_k
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (4) \\
 (8) \frac{m}{h} = \frac{b}{b \cdot 1} \\
 \hline
 (8) \frac{s}{b} = \frac{u_1 \psi_1}{u_1 \theta_1}; \psi_1 \text{ primo con } \theta_1 \\
 \hline
 (8) \frac{\psi_1}{u_1} = \frac{u_2 \psi_2}{u_2 \theta_2}; \psi_2 \text{ primo con } \theta_2 \\
 \hline
 \dots \\
 \hline
 (8) \frac{\psi_{q-2}}{u_{q-2}} = \frac{u_{q-1} \psi_{q-1}}{u_{q-1} \theta_{q-1}}; \psi_{q-1} \text{ primo con } \theta_{q-1} \\
 \hline
 (8) \frac{\psi_{q-1}}{u_{q-1}} = \frac{u_q \psi_q}{u_q \theta_q}; \psi_q \text{ primo con } \theta_q
 \end{array}$$

Si consideri uno qualunque di questi specchi, il 1° p. es.; è facile vedere che si ha:

$$\begin{aligned}
 d = D(a, b); d_1 = D(\alpha, d) = D\left(\frac{a}{d}, d\right); d_2 = D(\alpha, d_1) = D\left(\frac{a}{d d_1}, d_1\right) \dots \\
 d_h = D(\alpha_{h-1}, d_{h-1}) = D\left(\frac{a}{d d_1 \dots d_{h-1}}, d_{h-1}\right);
 \end{aligned}$$

infine $d_{h-1} = D(\alpha_h, d_h) = D\left(\frac{a}{d d_1 \dots d_h}\right) = 1$; a quest'ultimo risultato si giunge necessariamente, perchè le α e le d vanno continuamente decrescendo.

Sopra i medesimi specchi facciamo le seguenti osservazioni, che ci serviranno in seguito:

Si consideri lo specchio (1), e sia γ un fattore primo di a , non comune a b ; non potendo γ dividere b , non può dividere d ; e allora dividendo a dovrà dividere α ; non dividendo d non può dividere d_1 , ma, dividendo α , dovrà dividere α_1 ; non dividendo d_1 non divide d_2 e dividendo α_1 dovrà dividere α_2 ; ecc. Così proseguendo si arriva a provare che γ divide α_h . Sia ora γ un fattore primo di α_h ; esso non può dividere nè β_h nè d_h (perchè primi con α_h), non può dunque dividere d_{h-1} , però dividendo α_h divide α_{h-1} , e allora non può dividere β_{h-1} (perchè β_{h-1} è primo con α_{h-1}), quindi non dividendo nè d_{h-1} nè β_{h-1} non divide α_{h-1} ecc. Continuando si arriva a provare che γ divide a e non b . Si può osservare che conseguenza di queste considerazioni è che α_h è formato con tutti e coi soli fattori di a non comuni a b .

Si tratta dunque di provare che:

$$\begin{aligned}
 (2) \quad a t_1 t_2 \dots t_p \cdot \varphi\left(\frac{m}{a t_1 t_2 \dots t_p}\right) \cdot d_1 d_2 \dots d_h \cdot \varphi\left(\frac{a}{d d_1 \dots d_h}\right) \cdot b = \\
 = b u_1 u_2 \dots u_q \cdot \varphi\left(\frac{m}{b u_1 u_2 \dots u_q}\right) \cdot d \delta_1 \delta_2 \dots \delta_k \cdot \varphi\left(\frac{b}{d \delta_1 \delta_2 \dots \delta_k}\right).
 \end{aligned}$$

Moltiplicando membro a membro le (5) dello specchio (1); e lo stesso facendo per le (6) dello specchio (2); per le (7) dello specchio (3); per le (8) dello specchio (4), si ha facilmente:

$$\left\{ \begin{array}{l} a = d d_1 d_2 \dots d_h \alpha_h \\ m = \alpha t_1 t_2 \dots t_p \omega_p \\ b = d \delta_1 \delta_2 \dots \delta_k \rho_k \\ m = b u_1 u_2 \dots u_q \psi_q \end{array} \right. \quad \text{da cui} \quad \left\{ \begin{array}{l} d d_1 \dots d_h = \frac{a}{\alpha_h} \\ \alpha t_1 \dots t_p = \frac{m}{\omega_p} \\ d \delta_1 \dots \delta_k = \frac{b}{\rho_k} \\ b u_1 \dots u_q = \frac{m}{\psi_q} \end{array} \right.$$

e sostituendo nella (9) essa diviene:

$$\frac{m}{\omega_p} \cdot \varphi\left(\frac{m}{\omega_p}\right) \cdot \frac{a}{\alpha_h} \cdot \varphi\left(\frac{a}{\alpha_h}\right) \cdot b = \frac{m}{\psi_q} \cdot \varphi\left(\frac{m}{\psi_q}\right) \cdot \frac{b}{\rho_k} \cdot \varphi\left(\frac{b}{\rho_k}\right) \cdot a$$

ossia:

$$(10) \quad \frac{\varphi(\omega_p) \cdot \varphi(\alpha_h)}{\omega_p \cdot \alpha_h} = \frac{\varphi(\psi_q) \cdot \varphi(\rho_k)}{\psi_q \cdot \rho_k}$$

Consideriamo ora un fattore primo γ di α_h ; sappiamo che esso divide a . Supponiamo che γ divida anche ω_p ; allora esso (specchio 2) non può dividere a , il che è assurdo. Dunque α_h è primo con ω_p .

Analogamente si prova che ρ_k è primo con ψ_q . Dunque si ha

$$\varphi(\omega_p) \cdot \varphi(\alpha_h) = \varphi(\omega_p \cdot \alpha_h) \quad , \quad \varphi(\psi_q) \cdot \varphi(\rho_k) = \varphi(\psi_q \cdot \rho_k)$$

Quindi la (10) diviene:

$$(11) \quad \frac{\varphi(\omega_p \cdot \alpha_h)}{\omega_p \cdot \alpha_h} = \frac{\varphi(\psi_q \cdot \rho_k)}{\psi_q \cdot \rho_k}$$

Prendiamo un fattore primo γ del prodotto $\omega_p \alpha_h$, esso dividerà ω_p od α_h ; supponiamo che divida α_h ; ma allora specchio (1) divide a e non b ; dividendo a divide m ; quindi dividendo m e non b specchio (4) divide ψ_q e per conseguenza il prodotto $\psi_q \rho_k$. Supponiamo ora che γ divida ω_p allora specchio (2) divide m e non a ; dividendo m potrà dividere b e potrà non dividerlo. Lo divida, allora specchio (3) dividendo b e non a divide ρ_k quindi $\psi_q \rho_k$. Infine si supponga che γ non divida b , allora specchio (4) dividendo m e non b divide ψ_q . Concludiamo dunque che un fattore primo di $\omega_p \alpha_h$ è pure fattore di $\psi_q \rho_k$; in modo analogo possiamo provare che ogni fattore primo di $\psi_q \rho_k$ divide $\omega_p \alpha_h$; ma allora per il Lemma premesso la (11) è vera, quindi anche la (10) ed infine la (9).

365. Si formino gli specchi:

$$(1) \quad \begin{array}{l} (3) \ a = d \alpha \\ \quad b = d \beta; \ \alpha \text{ primo con } \beta \end{array}$$

$$(3) \ \alpha = d_1 \alpha_1; \ \alpha_1 \text{ primo con } \beta_1 \\ d = d_2 \beta_1$$

$$(3) \ \alpha_1 = d_2 \alpha_2; \ \alpha_2 \text{ primo con } \beta_2 \\ d_1 = d_3 \beta_2$$

.....

$$(2) \quad \begin{array}{l} (4) \ m = b \cdot n \\ \quad b = b \cdot 1 \end{array}$$

$$(4) \ n = \delta_1 \rho_1; \ \rho_1 \text{ primo con } \sigma_1 \\ b = \delta_1 \sigma_1$$

$$(4) \ \rho_1 = \delta_2 \rho_2; \ \rho_2 \text{ primo con } \sigma_2 \\ \delta_1 = \delta_2 \sigma_2$$

.....

$$\begin{array}{l|l}
 (3) \alpha_{h-2} = d_{h-1} \alpha_{h-1} & (4) \rho_{k-2} = \delta_{k-1} \rho_{k-1} \\
 d_{h-2} = d_{h-1} \beta_{h-1} ; \alpha_{h-1} \text{ primo con } \beta_{h-1} & \delta_{k-1} = \delta_{k-1} \sigma_{k-1} ; \rho_{k-1} \text{ primo con } \sigma_{k-1} \\
 \hline
 (3) \alpha_{h-1} = d_h \alpha_h ; \alpha_h \text{ primo con } \beta_h & (4) \rho_{k-1} = \delta_k \rho_k ; \rho_k \text{ primo con } \sigma_k \\
 d_{h-1} = d_h \beta_h ; \alpha_h \text{ " " } d_h & \delta_{k-1} = \delta_k \sigma_k ; \rho_k \text{ " " } \delta_k
 \end{array}$$

La condizione posta dal problema è:

$$(5) \quad dd_1 d_2 \dots d_h \cdot \varphi \left(\frac{a}{dd_1 \dots d_h} \right) m = b \delta_1 \delta_2 \dots \delta_h \cdot \varphi \left(\frac{m}{b \delta_1 \delta_2 \dots \delta_h} \right) \cdot a.$$

Ma moltiplicando membro a membro le (3) dello specchio (1); poscia le (4) dello specchio (2) si ha

$$a = dd_1 \dots d_h \alpha_h, \quad m = b \delta_1 \delta_2 \dots \delta_h \rho_h,$$

da cui

$$dd_1 \dots d_h = \frac{a}{\alpha_h}, \quad b \delta_1 \delta_2 \dots \delta_h = \frac{m}{\rho_h};$$

per le quali la (5) diviene

$$\frac{a}{\alpha_h} \cdot \varphi \left(\frac{a}{\alpha_h} \right) m = \frac{m}{\rho_h} \cdot \varphi \left(\frac{m}{\rho_h} \right) \cdot a,$$

ossia

$$(6) \quad \frac{\varphi(\alpha_h)}{\alpha_h} = \frac{\varphi(\rho_h)}{\rho_h}.$$

Supponiamo che m sia formato da soli fattori semplici di a , b . Sia γ un fattore primo di α_h ; per le considerazioni fatte nella risoluzione della precedente quistione, si ha che γ divide a e non b . Ma dividendo a divide m , e allora divide m e non b per cui specchio (2) divide ρ_h . Inversamente sia γ un fattore primo di ρ_h , esso divide m e non b , quindi per l'ipotesi fatta dovrà dividere a ; ma allora dividendo a e non b specchio (1) divide α_h . Ma allora per il Lemma promesso sussiste la (6), quindi la (5).

La condizione è necessaria.

Supponiamo ora che la (5) sia vera, quindi anche la (6), allora per il suddetto Lemma α_h è formato con tutti e coi soli fattori semplici di ρ_h . Sia γ un fattore primo di m , esso dividerà b o non lo dividerà: se non lo divide, dividendo m e non b specchio (2) divide ρ_h , ma allora divide α_h quindi a . Dunque qualunque fattore primo di m o divide b o se non divide b divide a .

La condizione è dunque anche sufficiente.

QUISTIONI PROPOSTE (*)

359*. In un triangolo qualunque ciascuna bisettrice è divisa dal centro del circolo iscritto in due parti, che stanno fra loro come la somma dei lati che comprendono l'angolo bisecato sta al terzo lato.

(*) Le quistioni contrassegnate con un asterisco sono proposte particolarmente agli studenti delle scuole secondarie; le altre a tutti gli studiosi indistintamente.

360*. In un triangolo qualunque il rettangolo dei due segmenti determinati su ciascuna altezza dal punto d'incontro con le altre due è costante (ed equivalente al quadruplo del rettangolo che ha per lati i raggi dei cerchi iscritto e circoscritto al triangolo, che ha per vertici i piedi delle altezze).

G. CARDOSO-LAYNES.

361*. Costruire il triangolo conoscendo un lato, l'angolo opposto e la bisettrice dell'angolo noto.

A. VIVARELLI.

362*. 1^a. Determinare tre numeri in progressione geometrica, conoscendo la loro somma S e quella P^3 dei loro cubi.

Supposto che S e P siano reali e positivi, quali condizioni si richiedono perchè siano reali e positivi anche i tre numeri domandati?

363*. 2^a. Sui lati AB, BC, CD, DA di un quadrilatero gobbo $ABCD$ siano quattro punti A_1, B_1, C_1, D_1 presi in modo che il loro baricentro coincida con quello dei vertici A, B, C, D del quadrilatero dato. Dimostrare che si ha

$$\frac{AA_1}{A_1B} = \frac{BB_1}{B_1C} = \frac{CC_1}{C_1D} = \frac{DD_1}{D_1A}.$$

LUIGI BOSI.

366*. 1^o. La condizione necessaria e sufficiente, perchè un numero a sia eguale alla somma di p numeri dispari consecutivi è che p sia un divisore di a tale che

$$\frac{a}{p} - p = \text{numero pari (lo 0 compreso)}.$$

367*. 2^o. La condizione necessaria e sufficiente, perchè un numero a sia eguale alla somma di p numeri pari consecutivi è che p sia un divisore di a tale che

$$\frac{a}{p} - p = \text{numero dispari}.$$

A. FONTEBASSO.

368. Dimostrare che

$$2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{1+\frac{1}{2n}}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{1+\frac{3}{2n}}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{1+\frac{5}{2n}}} \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2-\frac{1}{n}}} \right\}$$

G. FUBINI.

369*. Se T è un tronco di prisma, che ha per base un poligono regolare S , P è il punto d'incontro dell'altra base S' colla retta parallela agli spigoli laterali condotta per il centro del circolo circoscritto ad S , h la distanza di P dal piano di S , h_1 la media aritmetica delle distanze dei vertici di S' dal piano di S , si dimostri che T è equivalente alla somma di tre piramidi, che hanno la base eguale ad S e l'altezza una eguale ad h e due ad h_1 .

370*. Il volume di un segmento sferico ad una base di altezza h ha per misura $\frac{1}{3} \pi h^2 (3R - h)$. Da questa misura si deducano quelle più comunemente usate per il segmento sferico ad una e due basi.

G. LAZZERI.

BIBLIOGRAFIA

PAOLO GAZZANIGA. — *Libro di Aritmetica ed Algebra elementare.* — (II^a edizione. Padova, Tip. Prosperini, 1897. L. 3,50).

La letteratura matematica, in questo ultimo decennio, specialmente, si è arricchita anche in Italia di opere pregevoli, che al rigore scientifico uniscono eccellenti qualità didattiche. Non sono, purtroppo, ancora scomparsi i mestieranti, che pubblicano libri per le scuole raffazzonati alla peggio, e che incontrano il favore dei pigri e degli ignoranti, ma alla loro azione deleteria si oppone ora quella benefica (che dovrà pure trionfare) di egregi scienziati, i quali non isdegnano di scendere dalla loro altezza per occuparsi della scienza elementare. Anche nelle scuole secondarie deve penetrare un soffio di vita nuova, che, iniziandole nei metodi della scienza moderna, tolga quella discontinuità tanto deplorata quanto dannosa fra gli studi secondari e quelli superiori. È doveroso, in un tempo che alla scienza deve tante conquiste, dare ad essa la dovuta importanza nella scuola, cominciando dalla più bella, dalla più pura, da quella che alle altre dà forza e diritto di esistere: la matematica.

Il libro del Gazzaniga per l'aritmetica razionale e per l'Algebra elementare mira a questo scopo nobilissimo e lo raggiunge.

Il libro del Gazzaniga in 324 pagine comprende tutto il programma attuale di Aritmetica ed Algebra elementare del corso secondario, compresa la trigonometria piana e qualche argomento, che, sebbene non compreso nei programmi ufficiali, può, ove l'indole della scuola lo permetta, essere svolto anche nel Liceo, perché importante e divertente.

Della prima edizione di questo libro si occupò nel *Periodico* il prof. Ciamberlini (anno XI, fascicolo IV-V, 1896), quindi io mi limiterò ad accennare alle differenze esistenti tra la prima e la seconda edizione, per non ripetere un'altra recensione pubblicata da me nel *Comune* di Padova del 3 marzo 1896.

Nel § 7, n. 44, del cap. I, il Gazzaniga, accogliendo volentieri un'osservazione rivoltagli, modificò il teorema: *Se fra i numeri 1, ..., E (\sqrt{n}) non vi è alcun divisore primo di n, il numero stesso n o è primo, oppure è il quadrato di un numero primo*, sopprimendo l'ultima parte. Nel § 10 " Osservazioni ed aggiunte " sono trasportati i principi dell'analisi combinatoria, che nella I^a edizione comparivano nel § 8, e così chiunque voglia non oltrepassare mai i limiti dei programmi ufficiali, può omettere nella scuola lo svolgimento di quella parte del testo, del resto interessante e piacevole. Nelle osservazioni è accennato in modo breve e chiaro alle condizioni sufficienti perché un gruppo sia numerabile.

Nel § 11 " Prime proprietà dei numeri frazionari " le frazioni sono introdotte in modo formale: le osservazioni preliminari sono utili per togliere quel senso di arbitrarietà, che presenta ai giovani il sistema formale, l'unico però da adottarsi in un insegnamento veramente razionale dell'aritmetica e dell'algebra.

Nel § 12, n. 80 vi è un breve cenno sulla proporzionalità dei numeri interi e frazionari dedotto dalla teoria delle frazioni.

Il § 13 (corrispondente al 12° della I^a edizione) contiene le *proprietà generali dei numeri razionali* (con una nota storica importante che riferisce il vero significato della parola *irrazionale*), salvo il cenno sulle frazioni continue trasportato al § 11 " osservazioni ed aggiunte, " anche qui collo scopo di separare nettamente lo svolgimento del programma ufficiale da quelle nozioni che, per quanto importanti, non figurano in esso. Approvo anche l'aggiunta del § 19, ove, dopo aver introdotto formalmente lo zero ed i numeri negativi, e studiate le operazioni con i numeri algebrici positivi e negativi, si accenna al fatto che anche i numeri negativi servono ad esprimere aggregati di oggetti o rapporti di grandezze, e quindi le operazioni con questi numeri possono servire a risolvere questioni di importanza pratica. Fra le aggiunte di questo § troviamo un cenno sulla teoria delle congruenze,

i teoremi di Wilson e di Fermat (che nella prima edizione appartenevano al § 8 "altre proprietà dei numeri"), e sul n.º dei termini periodici di $\frac{1}{n}$ con n primo o potenza di numero primo.

La teoria dei numeri reali, svolta magistralmente anche nella 1ª edizione, non presentava ragione alcuna per essere modificata; soltanto nella ristampa del libro le osservazioni e le aggiunte, prima sparse per il capitolo vennero raccolte nell'ultimo paragrafo (il 27º).

In fine del cap. Vº (*Numeri complessi*) una tabella riassume i diversi numeri studiati fin allora, e si passa quindi all'Algebra propriamente detta.

E a proposito dei numeri complessi ripeto quanto scrissi altrove qualche tempo fa: non so perché la loro teoria, bella, semplice e feconda, non faccia parte del programma liceale, quando è accettata quella degli irrazionali, introdotti per uno scopo, che viene raggiunto completamente soltanto coll'introduzione dei numeri complessi: alludo all'estrazione di radice, di qualunque indice, di un numero reale. Nel primo § dell'algebra è introdotto esplicitamente il concetto di *numero finito e determinato* (di solito ammesso in silenzio dagli autori e dai docenti) e alla definizione di *espressione algebrica* e di ciò che s'intende per suo valore fa seguito l'osservazione: *Non sempre una espressione algebrica produce un numero finito e determinato*, che mancava nella prima edizione.

Il teorema n. 45 a pag. 222 è enunciato, nella ristampa, in modo completo e chiaro, mentre la sua distinzione in parti (adottata da quasi tutti gli altri autori) lascia sempre dei dubbi ai discenti.

L'applicazione della teoria generale delle equazioni alle equazioni ad una incognita di Iº, IIº, IIIº e IVº grado è opportunamente raccolta in un solo paragrafo, nel quale il docente, ove non sia persuaso di estendere il suo programma, può sopprimere i cenni sulle equazioni di IIIº e IVº grado, indipendenti da quelle di Iº e IIº, svolte con brevità, semplicità ed eleganza.

Al § sui sistemi di equazioni segue un'aggiunta interessante sulle equazioni non algebriche, (esponenziale, logaritmica, applicazione dei logaritmi ai problemi d'interesse composto, ecc.).

Il libro termina con l'applicazione dell'Algebra alla Geometria, svolgendo la trigonometria piana. La chiusa è degno epilogo del libro bellissimo, prova luminosa dell'alto sapere e delle ottime qualità didattiche di chi lo scrisse.

L'autore nella ristampa ha tenuto conto delle lievi osservazioni degli amici, ha raccolto una maggior quantità di esercizi per ogni paragrafo, ha distinto con caratteri speciali tutte le definizioni, le proprietà caratteristiche e gli enunciati dei teoremi, e infine ha esteso qualche nota storica interessante. Il libro del Gazzaniga a mio parere, è uno dei migliori fra quanti uscirono finora in Italia per l'insegnamento dell'aritmetica e dell'algebra nei Licei e ad esso non può, non deve mancare il favore degli insegnanti colti e studiosi.

D. G. B. MARANGONI.

GIUSEPPE VERONESE (con la collaborazione di P. GAZZANIGA). — *Elementi di Geometria, ad uso dei Licei e degli Istituti Tecnici (1º biennio)*.

Questo del Prof. Veronese è diverso dagli altri trattati di geometria, che sono in uso nelle nostre scuole secondarie. Le ragioni del libro sono svolte nella Prefazione, e si riducono alle seguenti: coordinare gli *Elementi* di Euclide allo stretto rigore scientifico dei metodi moderni; formare della geometria un sistema di verità tale che l'osservazione empirica dia i concetti limitati e concreti, l'intuizione ne tragga alimento a concetti generali, e la scienza dia a questi ultimi leggi indipendenti dall'esperienza e logicamente connesse ognuna alla successiva.

Notevole è specialmente: 1º la soppressione del concetto del movimento senza deformazione nello studio della eguaglianza delle figure, per non restringere il concetto di eguaglianza a quello di congruenza; 2º l'applicazione di un principio moderno, secondo il quale: se è data una figura A mediante alcuni postulati e un'altra figura B in tale corrispondenza con A che collo scambio di alcune parole valgono per B le proposizioni contenute nei postulati di A, allora valgono pure per B, con lo scambio di quelle medesime parole, tutte le proposizioni dedotte per A.

Il Libro è preciso, è chiaro, è breve, ma non è facile, nel senso volgare della

parola; offerto a menti, non addestrate alla perfezione logica, reca fatica in sul principio ma poi — io lo dico per l'esperimento che ne ho fatto quest'anno — riesce più facile di ogni altro, e reca diletto ed utile a scolari e a maestri.

Anche gli esercizi, che sono numerosi, e divisi paragrafo per paragrafo, danno argomento di utile ricapitolazione della materia, ed aggiungono pregio didattico al trattato.

Questo è diviso in IX Capitoli, ed è preceduto da alcune nozioni generali sui gruppi, sulle serie e sulla corrispondenza univoca e del medesimo ordine tra i gruppi; nozioni che hanno importanza essenziale nel testo.

Senza volere addentrarci in un esame minuto di tutti i capitoli, che richiederebbe spazio non breve, mi limiterò per ora ad accennare i punti più importanti e le piccole lacune che, a parer mio, si riscontrano in quelle parti che furono argomento delle mie lezioni al 1° corso dell'Istituto.

Ad es. nel § 1° del libro primo le dimostrazioni dei teoremi, che per l'addizione dei segmenti valgono la legge associativa e la legge commutativa, non sono estese al caso di un numero qualsivoglia di segmenti. Al Teorema I (pag. 18) sui segmenti multipli, convrebbe mettere innanzi alcuni cenni sul metodo di conclusione da n ad $n + 1$, che è opportunamente applicato qui ed altrove.

Notevoli sono: la definizione di *figure opposte* rispetto ad un punto; quella dell'eguaglianza di esse, che viene data prima e indipendentemente dalla nozione del piano, e quella di rette parallele, che discende immediatamente dal concetto di figure opposte.

Non intendo piuttosto come, date le definizioni di figure eguali e di coppie rettilinee, non debba dedursi immediatamente che gli angoli di due coppie rettilinee eguali e gli angoli opposti al vertice sono eguali. Perché, se l'angolo è definito come una parte del fascio limitato da due raggi, esso è una figura di una coppia. Il teorema, ad es., che: "due figure F, F' eguali ad una terza F'' , sono eguali tra loro", non è rigorosamente dimostrato nel caso che le figure non siano rettilinee; perchè la figura rettilinea che stabilisce la corrispondenza di eguaglianza tra F'' ed F può essere diversa da quella che stabilisce la corrispondenza d'eguaglianza tra F'' ed F' .

Nota ancora che il perimetro di un triangolo è considerato da Veronese come *parte esterna*, il che lascia dubbio su alcune altre definizioni, come ad es. su quella di *parte interna* del poligono convesso cioè "parte interna dei triangoli che hanno un vertice comune in un vertice del poligono, e per lati le rette congiungenti il vertice comune cogli altri vertici del poligono", perchè in tal modo i punti delle diagonali del poligono potrebbero essere supposti esterni al poligono stesso.

Il Postulato IV (pag. 85) dovrebbe essere preceduto da un teorema che dimostrasse la possibilità di costruire i segmenti a e b .

Ma queste ed altre poche osservazioni che si potrebbero fare sugli altri capitoli sono di poca importanza per sè medesime, e possono essere completate o illustrate dal maestro.

Ciò che importa di dire è che il trattato è un'opera originale e degna del suo autore; il quale, dedicando il suo intelletto alla soluzione del problema dell'insegnamento della Geometria elementare, ha bene meritato della scienza; tanto meglio ha meritato, quanto più il suo libro è lontano dalla speculazione materiale.

Per parte mia io lo ringrazio, perchè con questo suo lavoro egli mi ha procurato più vivo il piacere di insegnare le cose vecchie e di trovarvi dentro insieme il fresco spirito delle nuove.

G. BORDIGA.

ERRATA-CORRIGE.

Le quistioni dalla 354 alla 358 pubblicate nel fascicolo III sono del *Prof. Retali* il cui nome fu omissso per errore d'impaginazione. Per la stessa ragione fu errata la numerazione delle quistioni saltando i numeri da 359 a 362. Correggiamo tale errore nel presente fascicolo.

GIULIO LAZZERI — *Direttore responsabile*

Finito di stampare il 2 Luglio 1897.

GENERALIZZAZIONE DI UN TEOREMA DEL PROF. E. CESÀRO

1. All'illustre prof. E. Cesàro è dovuto il seguente elegantissimo teorema:

Se con α si rappresentano gli interi positivi per i quali

$$E\left(\frac{2n}{\alpha}\right) = 2k + 1,$$

essendo n un numero intero positivo qualunque, si ha:

$$\Sigma \varphi(\alpha) = n^2. (*)$$

Il simbolo $E\left(\frac{2n}{\alpha}\right)$ indica la parte intera del quoziente $\frac{2n}{\alpha}$ e la funzione $\varphi(\alpha)$ è la nota funzione di Gauss, la quale rappresenta il numero dei numeri primi con α e inferiori ad esso.

Il teorema precedente può essere notevolmente esteso in base alla generalizzazione da me fatta della funzione φ di Gauss. (**)

2. Col simbolo $\varphi_p(\alpha)$ indicheremo il numero dei gruppi costituiti ciascuno di p numeri non superiori ad α , il cui massimo comun divisore è primo con α . La funzione $\varphi_p(\alpha)$ è definita da una delle seguenti uguaglianze:

$$(1) \quad \begin{cases} \varphi_p(\alpha) = \alpha^p \left(1 - \frac{1}{a^p}\right) \left(1 - \frac{1}{b^p}\right) \dots, \\ \Sigma \varphi_p(\delta) = \alpha^p, \end{cases}$$

dove a, b, \dots sono i divisori primi del numero α e la sommatoria s'intende estesa a tutti i divisori δ di α .

Faremo uso del simbolo $s_m^{(p)}$ per indicare la somma delle p^{me} potenze dei primi m numeri naturali.

(*) U. SCARPIS: *Primi elementi della teoria dei numeri* - pag. 24, vol. 225. - Mannali Hoepli.

(**) Veggasi la mia nota: *Sopra un problema della teoria dei numeri* (Roma, *Periodico di matematica*, anno 1891, pag. 119) e l'articolo del Prof. E. Cesàro: *A proposito di una generalizzazione della funzione φ di Gauss*, (Roma, *Periodico*, anno 1892, pag. 1).

TEOREMA. — Se con α si rappresentano gli interi positivi, pei quali
 $E \left(\frac{2n}{\alpha} \right) = 2k + 1$, essendo n un intero positivo qualunque, si ha:

$$\Sigma \varphi_p(\alpha) = s_{2n}^{(p)} - 2 s_n^{(p)}.$$

Indichiamo con β quei numeri che entrano, esattamente o no, un numero dispari di volte in $2(n-1)$, con h tutti i divisori di $2n-1$, tolta l'unità, e con k tutti i divisori pari di $2n$, che danno quozienti dispari.

È chiaro che il gruppo dei numeri α sarà costituito:

1° di tutti i numeri β , meno però quei numeri $\beta_1 > 1$ divisori di $2n$ che danno quozienti pari;

2° di tutti i numeri h ;

3° di tutti i numeri k .

Avremo quindi

$$(2) \quad \Sigma \varphi_p(\alpha) = \Sigma \varphi_p(\beta) - \Sigma \varphi_p(\beta_1) + \Sigma \varphi_p(h) + \Sigma \varphi_p(k).$$

Poniamo

$$n = 2^v n_1,$$

essendo n_1 un numero dispari (è evidente che se n è dispari, deve essere $v = 0$).

I numeri $\beta_1 > 1$, cioè i divisori di $2n$, tolta l'unità, che danno quozienti pari sono della forma $2^{v'} \delta$, essendo $v' < v + 1$ e δ divisore di n_1 ; i divisori di $2n$ che invece danno quozienti dispari, sono della forma $2^{v+1} \delta$. Quindi, se indichiamo con d tutti i divisori di $2n$, avremo

$$\Sigma \varphi_p(\beta_1) = \Sigma \varphi_p(d) - \Sigma \varphi_p(2^{v+1} \delta) - \varphi_p(1).$$

Ora, essendo δ numero dispari e quindi primo con 2^{v+1} , ed osservando la prima delle (1), ricaviamo

$$\varphi_p(2^{v+1} \delta) = \varphi_p(2^{v+1}) \varphi_p(\delta) = 2^{v+1} (2^v - 1) \varphi_p(\delta);$$

applicando la seconda delle (1), abbiamo inoltre

$$\Sigma \varphi_p(d) = 2^v n^p,$$

$$\Sigma \varphi_p(2^{v+1} \delta) = 2^{v+1} (2^v - 1) \Sigma \varphi_p(\delta) = 2^{v+1} (2^v - 1) n_1^p = (2^v - 1) n^p.$$

Pertanto avremo, giacchè è $\varphi_p(1) = 1$,

$$\Sigma \varphi_p(\beta_1) = 2^v n^p - (2^v - 1) n^p - 1,$$

ossia

$$\Sigma \varphi_p(\beta_1) = n^p - 1.$$

I numeri h sono i divisori di $2n-1$, esclusa l'unità, quindi sarà:

$$\Sigma \varphi_p(h) = (2n-1)^p - \varphi_p(1) = (2n-1)^p - 1.$$

Osserviamo che i resti sono primi con b , come subito si ricava dalla

$$a \cdot 10^k \equiv r_k \pmod{b}.$$

Questo conferma la nota proprietà che x può essere al più eguale a $\varphi(b)$, e mostra che la frazione $\frac{r_k}{b}$ è essa pure ridotta ai minimi termini. È poi evidente che i resti corrispondenti a questa frazione sono $r_{k+1}, \dots, r_x, \dots, r_{k+x}$, e che il periodo è la corrispondente permutazione circolare di quello relativo alla $\frac{a}{b}$.

2. Supponiamo che x sia scomponibile in due fattori interi m e q ; dove $q > 1$, e, per conseguenza, $x > 1$. (Ciò esclude quindi il solo caso $x = 1$, epperò $b = 3$ oppure 9). Il periodo allora si può spezzare in q gruppi successivi di m cifre l'uno, $p_1, p_2, p_3, \dots, p_q$, e sarà eguale a

$$P = p_1 \cdot 10^{(q-1)m} + p_2 \cdot 10^{(q-2)m} + \dots + p_{q-1} \cdot 10^m + p_q.$$

Avremo poi, per lo stesso procedimento della divisione

$$a \cdot 10^m = b p_1 + r_m$$

$$a \cdot 10^{2m} = b (p_1 \cdot 10^m + p_2) + r_{2m}$$

$$a \cdot 10^{3m} = b (p_1 \cdot 10^{2m} + p_2 \cdot 10^m + p_3) + r_{3m}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a \cdot 10^{qm} = b (p_1 \cdot 10^{(q-1)m} + p_2 \cdot 10^{(q-2)m} + \dots + p_{q-1} \cdot 10^m + p_q) + r_{qm}.$$

Levando da ognuna di queste eguaglianze, moltiplicata per 10^m , la successiva, otterremo

$$10^m \cdot r_m = b \cdot p_2 + r_{2m}$$

$$10^m \cdot r_{2m} = b \cdot p_3 + r_{3m}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$10^m \cdot r_{(q-1)m} = b \cdot p_q + r_{qm};$$

cui si può aggiungere

$$10^m \cdot r_{qm} = b \cdot p_1 + r_m,$$

che è la prima delle eguaglianze precedenti, per essere $r_{qm} = a$.

Poniamo

$$\Sigma r = r_m + r_{2m} + \dots + r_{qm}, \quad \Sigma p = p_1 + \dots + p_q.$$

Sommando le eguaglianze precedenti avremo

$$(10^m - 1) \Sigma r = b \Sigma p.$$

Supponiamo ora, e supporremo sempre in tutto quanto segue, che b sia primo con $10^m - 1$. Dovrà allora b essere contenuto in Σr , e per conseguenza, $10^m - 1$ in Σp ; avremo cioè, detto k un intero:

$$(I) \quad \frac{\Sigma r}{b} = \frac{\Sigma p}{10^m - 1} = k$$

Risulta chiaro in tal modo che la somma dei resti di posto $m, 2m, 3m, \dots, qm$, è multipla di b , e la somma dei corrispondenti gruppi con-

securivi di m cifre, in cui il periodo si può scomporre, è multipla, secondo lo stesso fattore, del numero composto di m cifre eguali a 9.

3. Il teorema si può estendere in questo senso: che i q resti, invece di contarli a partire dal primo, si potrebbero contare, sempre di m in m , a partire da uno qualunque di essi; ed i q gruppi di m cifre andrebbero contati in modo corrispondente, supposta continuata la successione delle cifre al quoziente, anche dopo l'ultima cifra del periodo.

E infatti, questi nuovi resti e questi corrispondenti nuovi gruppi, contati a partire dal k^{esimo} resto, sarebbero resti e gruppi, contati a partire dal primo resto, nella divisione che si farebbe per convertire in decimali la $\frac{r_{k-1}}{b}$. E per questa, essendo essa ridotta ai minimi termini (n. 1), vale il teorema precedente.

Abbiamo dunque:

Se il periodo corrispondente alla $\frac{a}{b}$ ha $x = mq$ cifre, dove $q > 1$, e (supposto continuata indefinitivamente la divisione necessaria per convertire $\frac{a}{b}$ in decimali) si considerano q resti di posto $m, 2m, 3m, \dots$ a partire dal k^{esimo} ; e, parimenti a partire dalla k^{esima} cifra del periodo si considerano in esso q gruppi consecutivi di m cifre l'uno, le somme di quei resti e le somme di quei gruppi saranno equimultiple di b e del numero formato da m cifre eguali a 9.

4. Ci sia permesso porgere qui un esempio un po' minuzioso, per fissare meglio le idee sulle cose dette e su quelle che diremo.

Convertendo in decimali la frazione $\frac{12}{19}$ si ottengono al periodo le cifre

631. 578. 947. 368. 421. 052

e, come resti successivi, i numeri

6, 8, 11; 15, 17, 18; 9, 14, 7; 13, 16, 8; 4, 2, 1; 10, 5, 12.

Ora abbiamo, scomponendo in tutti i modi possibili il periodo in gruppi, a cominciare dalla prima cifra:

Somma dei gruppi di 9 cifre = 631.578.947 + 368.421.052 = 999.999 \times 1.
 " " 6 " = 631.578 + 947.368 + 421.052 = 999.999 \times 2.
 " " 3 " = 631 + 578 + 947 + 368 + 421 + 052 = 999 \times 3.
 " " 2 " = 63 + 15 + 78 + 94 + 73 + 68 + 42 + 10 + 52 = 99 \times 5.
 " di tutte le 8 " = 6 + 3 + + 5 + 2 = 9 \times 9.

E per i resti, contati a partire dal primo:

Somma dei resti di 9 in 9 = 7 + 12 = 19 \times 1.
 " " 6 " = 18 + 8 + 12 = 19 \times 2.
 " " 3 " = 11 + 18 + 7 + 8 + 1 + 12 = 19 \times 3.
 " " 2 " = 3 + 15 + 18 + 14 + 13 + 8 + 2 + 10 + 12 = 19 \times 5.
 " di tutti i resti = 6 + 3 + + 10 + 5 + 12 = 19 \times 9.

Se i gruppi si contassero a partire dalla seconda cifra, invece che dalla prima, si avrebbe:

$$\begin{aligned} \text{Somma dei gruppi di 9 cifre} &= 315.789.473 + 684.210.526 = 999.999.999 \times 1. \\ \text{ " " 6 " } &= 315.789 + 473.684 + 210.526 = 999.999 \times 1. \\ \text{ " " 3 " } &= 315 + 789 + 473 + 684 + 210 + 526 = 999 \times 3. \\ \text{ " " 2 " } &= 31 + 57 + 89 + 47 + 36 + 84 + 21 + 05 + 26 = 99 \times 4. \\ \text{ " di tutte le " } &= 3 + 1 + \dots + 2 + 6 = 9 \times 9. \end{aligned}$$

Le analoghe somme dei resti, contati a partire dal secondo di essi, 3, sono rispettivamente eguali a 19 moltiplicato per gli stessi coefficienti che si sono trovati per i corrispondenti gruppi di cifre, e cioè per 1, 1, 3, 4, 9.

5. Si può determinare la condizione perchè il periodo abbia mq cifre, essendo q un numero primo contenuto in $b - 1$.

Dovendosi infatti avere, (sempre rispetto al modulo b) le congruenze

$$a \cdot 10^m \equiv r_m \quad a \cdot 10^{mq} \equiv a$$

si avrà, innalzando i membri della prima di queste alla q^{esima} potenza

$$a^q \cdot 10^{mq} \equiv r_m^q;$$

e moltiplicando per a^{q-1} quelli della seconda,

$$a^q \cdot 10^{mq} \equiv a^q,$$

donde

$$r_m^q \equiv a^q$$

L' m^{esimo} resto deve quindi essere un numero x che soddisfi alla congruenza

$$(II) \quad x^q \equiv a^q \pmod{b}$$

E la condizione è anche sufficiente e cioè se l' m^{esimo} resto è il primo che soddisfi a questa congruenza, ed è diverso da a , il periodo avrà qm cifre. E infatti essendo in questo caso

$$r_m^q \equiv a^q, \quad a \cdot 10^m \equiv r_m,$$

si avrà

$$a^q \cdot 10^{mq} \equiv r_m^q \equiv a^q, \quad \text{onde } a \cdot 10^{mq} \equiv a,$$

la quale dimostra che l' mq^{esimo} resto è a , epperò il periodo finisce alla qm^{esima} cifra. E non prima; vale a dire il trovato periodo di qm cifre non può essere la riunione di periodi irriducibili di un altro numero di cifre, y . Perchè, se ciò fosse, dovrebbe y essere contenuto in qm , e due casi potrebbero darsi: o la y contiene il fattore q , ed è quindi della forma qm' , con $m' < m$, oppure non contiene q ed allora, essendo esso un numero primo, epperò primo con q , divide m , e sarà per es. eguale ad $\frac{m}{s}$. Nel primo caso, della congruenza $a \cdot 10^{mq} \equiv a$ si ricaverebbe $a^q \cdot 10^{m'q} \equiv a^q$ e dalla $a \cdot 10^{m'} \equiv r_m$ si avrebbe $a^q \cdot 10^{m'q} \equiv r_m^q$ onde $r_m^q \equiv a^q$ e

non sarebbe l' m^{esimo} resto il primo che verifica la (II). Nel secondo il periodo sarebbe finito alla $\left(\frac{m}{s}\right)^{\text{esimo}}$ cifra, epperò m , resto di posto m , (che dovrebbe essere una ripetizione di quello di posto $\frac{m}{s}$) sarebbe a , contro il supposto.

Osserviamo poi che la (II) ha, come è noto, q soluzioni, (perchè una ne ha certamente, ed è $x = a$), e che nel caso che una di queste fosse il resto di posto m , le altre sarebbero rispettivamente i resti di posto $2m, 3m, \dots, qm$.

Si può dunque dire:

« Il periodo della frazione irriducibile $\frac{a}{b}$ si potrà scomporre in q (q numero primo contenuto in $b - 1$) gruppi di m cifre aventi le proprietà vedute, quando, e solo quando, l' m^{esimo} resto sia il primo resto « diverso da a , che soddisfi alla congruenza (II). I resti poi di posto « $2m, 3m, \dots, qm$ saranno le rimanenti radici della stessa ».

6. Dei teoremi ora veduti sono degni di speciale menzione i casi particolari di $m = 1$ e di $q = 2, 3$, che esamineremo quindi separatamente.

Se si suppone $m = 1$, ossia se si considerano tutte le cifre del periodo e tutti i resti ottenuti nella divisione di a per b , si ha subito:

« La somma delle cifre del periodo è multipla di 9, e quella dei resti « è multipla di b , denominatore della frazione, secondo lo stesso numero « nel caso che b sia primo con 3 ».

Che la somma delle cifre del periodo sia multipla di 9, qualora b sia primo con 3, si ricava anche immediatamente dalla $\frac{P}{10^x - 1} = \frac{a}{b}$, dalla quale appare essere P un multiplo di 9. Ma che la somma dei resti debba essere multipla di b , e precisamente secondo lo stesso numero, non è ancora stato da altri, ch'io sappia, dimostrato.

Così per le frazioni aventi per denominatori i numeri primi

7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127,

i periodi delle quali hanno rispettivamente

6, 2, 6, 16, 18, 22, 28, 15, 3, 5, 21, 46, 13, 58, 60, 33,
35, 8, 13, 41, 44, 96, 4, 34, 53, 108, 112, 42

cifre, (*) ho verificato (e riporto questi numeri per comodo di chi volesse studiar meglio l'argomento) che la somma delle cifre del periodo è 9 moltiplicato risp. per

3, 1, 3, 8, 9, 11, 14, 6, 1, 2, 10, 23, 7, 29, 30, 16,
14, 4, 6, 19, 22, 48, 2, 17, 25, 54, 56, 21

(*) Vedasi anche la tav. che il prof. Bettini pubblica in altro numero di questo periodico, dove è bene osservare che è incorso un errore: per $p = 23$, n deve essere 22 e non 32

e la somma dei resti è il rispettivo denominatore, moltiplicato per questi stessi numeri. Si noti che questi numeri sono la metà del numero delle cifre del corrispondente periodo, nel caso che tal numero sia pari (cioè che è evidente dalle proprietà generali esposte e si vedrà meglio nel n. seg.), e press'a. poco la metà negli altri casi (non saprei formulare, né tanto meno dimostrare, una regola più precisa).

7. Pongasi ora invece $q = 2$, il che presuppone che le cifre del periodo (periodo binario) siano in numero pari. Allora il periodo si potrà

dividere in due semiperiodi di $\frac{x}{2} = m$ cifre l'uno, i quali avranno per somma un numero composto di 9. Si osservi che il valore k nella formula (I) non può evidentemente essere diverso da 1. Segue che l' m^{mo} resto sommato col $2m^{\text{esimo}}$ darà b , epperò sarà $b - a$, poichè quest'ultimo è a ; e parimente daranno per somma b due resti qualunque che distano di m posti.

Viceversa, se l' m^{mo} resto è $b - a$, avendosi, sempre rispetto al modulo b ,

$$r_m \equiv b - a \equiv -a, \text{ epperò } r_{m^2} \equiv a^2,$$

il periodo avrà $2m$ cifre, per quanto è detto nel n. 5. Dunque:

Se l' m^{esimo} resto (e non un altro precedente) è $b - a$, il periodo avrà $2m$ cifre. Arrivati al resto $b - a$, si sarà ottenuta la prima metà del periodo e quella dei resti. Le rimanenti cifre del periodo si avranno levando dal 9 quelle del primo semiperiodo, e parimente si otterranno i resti successivi all' m^{esimo} levando da b quelli che li precedono di m posti. ()*

In questo caso il periodo si può anche scomporre in m gruppi di 2 cifre, tanto a cominciare dalla prima cifra che dalla seconda, e parimente i resti si possono raggruppare nella due somme di quelle di posto pari e di quelli di posto dispari. E perchè tutti insieme i resti hanno per somma bm , se la somma dei resti di posto pari è km , quella dei resti di posto dispari sarà $(m - k)b$: e i coefficienti k e $m - k$ saranno necessariamente diversi se m dispari, mentre sono eguali per m pari. Parimente la somma dei gruppi di 2 cifre in cui si può dividere il periodo sarà $99 \times k$ oppure $99(m - k)$, a seconda che i gruppi si cominciano a partire dalla prima o dalla seconda cifra. Se poi, essendo m' un divisore di m , si scompone il periodo in gruppi di m' cifre (sottogruppi del semiperiodo) la somma di questi gruppi sarà sempre (qualunque sia la cifra da cui si comincia), eguale al numero composto di m' cifre 9, mol-

tuplicato per $\frac{m}{m'}$; e quindi la corrispondente somma dei gruppi di m' resti

sarà $b \times \frac{m}{m'}$. E infatti quei gruppi si possono associare in modo da for-

mare $\frac{m}{m'}$ coppie, che danno per somma numeri composti di tutti 9.

(*) Questo teor. fu già dimostrato dal Lugi per il solo caso di $a = 1$ e b numero primo (*Periodico di Matem.* Anno II), e poi da me con metodo differente, ma colle stesse restrizioni, nell'accennata nota inserita nel giornale *Il Pitagora*.

Così per la frazione $\frac{12}{19}$ la somma dei resti di posto dispari, è, come vedemmo, 19×5 , e quella dei resti di posto pari è 19×4 ; mentre la somma dei resti di 3 in 3, da qualunque s'incominci, è $19 \times \frac{9}{3}$.

Meglio si vedono queste cose considerando la frazione $\frac{1}{97}$, il periodo della quale ha le seguenti 96 cifre

010. 309. 278. 850. 515. 453. 917. 525. 773. 195. 876. 288. 659. 793. 814. 432.
989. 690. 721. 649. 484. 536. 082. 474. 226. 804. 123. 711. 340. 208. 155. 567.

I resti poi sono

10, 9, 30; 9, 90, 27; 76, 81, 34; 49, 5, 59; 15, 53, 45; 62, 38, 89; 17, 73, 51; 25, 56, 75;
71, 31, 19; 93, 57, 85; 74, 61, 28; 86, 84, 64; 58, 95, 77; 91, 31, 79; 14, 43, 42; 32, 29, 96;
87, 94, 67; 88, 7, 70; 21, 18, 63; 48, 92, 47; 82, 44, 52; 85, 59, 8; 80, 24, 46; 72, 41, 22;
25, 86, 78; 4, 40, 12; 23, 36, 69; 11, 13, 33; 39, 2, 20; 6, 60, 18; 83, 54, 55; 65, 68, 1.

Qui si ha che il valore di k (vedi formola (I)) è per la somma dei gruppi di 48 cifre = 1, epperò 48 per la somma di tutte le cifre. Per i gruppi di 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 cifre è quindi rispettivamente di $\frac{48}{24} = 2$, $\frac{48}{12} = 4$, $\frac{48}{8} = 6$, $\frac{48}{6} = 8$, $\frac{48}{4} = 12$, $\frac{48}{3} = 16$, $\frac{48}{2} = 24$. Invece per le somme dei gruppi di 32 cifre, epperò anche dei resti, di 32 in 32, (dove 32 non è divisore di 48, numero delle cifre del semiperiodo), si ha $k = 1$, se s'incomincia dalla prima cifra, ma non sempre per gli altri punti di partenza. Così mentre i resti di posto 32, 64, 96 sono 61, 35, 1, che hanno per somma 97, quelli di posto 35, 67 e 99 ovvero di posto 3, 35, 67 sono 30, 84, 80 la cui somma è 97. E che k non possa sempre essere eguale a 1 per le somme dei resti di 32 in 32 lo si poteva prevedere dal fatto che, se così fosse, la somma dei resti dovrebbe essere 97×32 , mentre è invece 97×48 . (*)

Le stesse cose si possono ripetere per qualunque altra frazione avente per denominatore 97, il periodo e i resti delle quali si possono subito dedurre, con permutazione circolare, da quelli che ora abbiamo riportato (vedi n. 1).

Non parmi inopportuno richiamare poi l'attenzione del lettore su questo fatto, che le cose ora dette per i periodi binari valgono per qualunque denominatore b che sia primo con $10^m - 1$, (dove m è la metà del numero delle cifre del periodo); epperò, in particolare, quando b è primo, sempre escluso, s'intende, $b = 3$.

Ad es. $\frac{45}{77}$ dà per periodo 584. 415 e per resti 65, 34, 32; 12, 43, 45, i quali soddisfano alle leggi suesposte, essendo appunto il 77 primo

(*) I resti sono collocati, per modo che il lettore possa subito verificare, (anche per correggere qualche eventuale errore di stampa), che le somme dei 4 resti contati di 24 in 24, è sempre $97 \times 2 = 194$.

con $10^3 - 1$. Non così avviene per $\frac{1}{99}$ o per $\frac{1}{259}$, cui corrispondono i periodi 01 o 003. 861; ma qui 99 non è primo con $10 - 1$, né 259 con $10^3 - 1$.

8. Suppongasi ora che sia $q = 3$. Il periodo potrà dunque scomporsi in 3 gruppi di m cifre l'uno (periodo *ternario*) i quali, sommati, daranno k volte il numero composto di m cifre 9. Il valore di k non può evidentemente superare il 2; ma può essere tanto 1 che 2. Si può osservare che k sarà = 1 quando a sia < 3 , e cioè per le frazioni $\frac{1}{b}$ $\frac{2}{b}$; supponendo i gruppi siano contati dalla prima cifra. E infatti le somme dei resti di posto m , $2m$, $3m$ deve dare bk ; e siccome l'ultimo di esso è a , i primi due daranno per somma $bk - a$. Ma questa somma non può superare $2b - 3$, perchè questi resti saranno al più $b - 1$ e $b - 2$, onde se $a < 3$, sarà $k = 1$.

Può bastare però che sia $a = 3$ perchè sia $k = 2$. La frazione $\frac{3}{7}$, ad es. dà il periodo 428.571 e i resti 2, 6, 4, 5, 1, 3. Ora si ha

$$42 + 85 + 71 = 99 \times 2 \text{ e, analogamente, } 6 + 5 + 3 = 6 \times 2.$$

Quando il periodo è *ternario*, trovati i due primi gruppi del periodo, è subito determinato il terzo, sommando i due primi, e levando questa somma dal numero composto di tutti 9 oppure dal doppio di questo. Quale di questi due casi (se cioè $k = 1$ oppure $k = 2$) si verifichi, non può essere dubbio, nei casi pratici.

La condizione perchè il periodo sia ternario è, per quanto si disse nel n. 5, che tra i resti ottenuti ci sia una delle radici (diversa da a) della

$$x^3 \equiv a^3 \pmod{b}$$

oppure, poichè il numero delle cifre del periodo non dipende da a , che, convertendo la frazione $\frac{1}{b}$ in decimali, si giunga a un resto, diverso da 1, che soddisfi la

$$x^3 \equiv 1 \pmod{b}.$$

Questa congruenza ha sempre 3 radici non congruenti, se $b - 1$ è divisibile per 3.

La condizione si può presentare sotto un'altra forma più pratica. Se il periodo ha $3m$ cifre dovrà essere $r_m + r_{2m} + r_{3m} = kb$; ed essendo $r_{3m} = a$ sarà $r_m + r_{2m} = kb - a$. Ed è poi sufficiente che si abbia $r_m + r_{2m} = kb - a$ (con $k = 1$ oppure 2), perchè il periodo abbia $3m$ cifre. Infatti si ha, sempre rispetto al modulo b ,

$$a \cdot 10^m \equiv r_m, \quad a \cdot 10^{2m} \equiv r_{2m};$$

epperò
$$r_m + r_{2m} = kb - a \equiv a(10^m + 10^{2m}) \equiv -a,$$

e quindi
$$a(10^{2m} + 10^m + 1) \equiv 0.$$

Sarà pertanto

$$a(10^m - 1)(10^{2m} + 10^m + 1) \equiv 0;$$

cioè $a(10^{3m} - 1) \equiv 0$ epperò anche: $10^{3m} - 1 \equiv 0$,

dalla quale si ha

$$a \cdot 10^{3m} \equiv a.$$

Questa dimostra essere a il $3m^{\text{esimo}}$ resto, epperò avere il periodo $3m$ cifre

Nè può nascere il dubbio che questo periodo di $3m$ cifre possa poi essere la riunione di periodi irriducibili (in questo caso il periodo vero avrebbe meno di $3m$ cifre). Basta ripetere il ragionamento generale fatto nel n. 5. Si ha quindi:

Se il $2m^{\text{esimo}}$ resto, che si ottiene dalla divisione di a per b , è il primo che sommato coll' m^{esimo} dà $kb - a$ (dove $k = 1$ oppure 2), la frazione periodica equivalente alla $\frac{a}{b}$ avrà $3m$ cifre. Trovate le prime $2m$ cifre del periodo, si potranno ottenere le altre m , e dai primi $2m$ resti si potranno avere i seguenti m , applicando le ora vedute proprietà dei periodi ternari.

Così nell'esempio citato della frazione $\frac{1}{97}$, arrivati al resto di posto $64 = 2 \cdot 32$, si vede che esso, sommato con quello di posto 32 , dà $61 + 35 = 96$, che è la differenza fra il denominatore e il numeratore della frazione. Si può dunque dire che i primi due terzi del periodo sono già trovati, e che l'altro terzo si otterrà sommando i primi due e levando le cifre della somma dal 9 . E parimente si troveranno tutti i resti dopo il 64^{esimo} con questa formola: $r_{64+n} = k \cdot 97 - r_n - r_{32+n}$ dove tra il valore 1 e il valor 2 , che k può avere, non è possibile ambiguità.

E si ha: $r_{65} = k \cdot 97 - r_1 - r_{33} = k \cdot 97 - 10 - 28 = 97 - 10 - 28 = 59$;
 $r_{68} = k \cdot 97 - r_4 - r_{34} = k \cdot 97 - 3 - 86 = 97 - 3 - 86 = 3, \dots$
 $r_{70} = k \cdot 97 - r_6 - r_{35} = k \cdot 97 - 27 - 95 = 2 \cdot 97 - 27 - 95 = 72$, ecc. ecc.

Anche qui insisteremo nel far notare che queste proprietà furono dimostrate nella ipotesi che b sia primo con $10^m - 1$; epperò, possono sussistere anche in altri casi, oltre quello considerato in precedenti lavori sulle frazioni periodiche, cioè di b primo, diverso da 3 .

Così la frazione $\frac{72}{259}$ dà luogo al periodo $27.79.92$ e ai resti 202 , 207 , 257 , 239 , 59 , 72 . Essi soddisfanno alle leggi del periodo ternario, avendosi che il 259 è primo con $10^3 - 1 = 99$.

Alessandria, 24 marzo 1897.

V. MURER.

INTERMEZZO

I lettori di questa Rassegna mi useranno indulgenza, se usurpo alquanto spazio a cose di maggiore importanza per occuparlo con la mia persona. Rispondo al Prof. F. AMODEO, che in una lettera aperta " *A proposito dei postulati della Geometria Proiettiva* " comparsa da poco sul Giornale di Matematiche (vol. 34) discorre con mirabile disinvoltura de' fatti miei, preso argomento da poche osservazioni, da me volute inserire in un articolo " *Sugli enti primitivi della Geometria Proiettiva* " (che può vedersi agli atti di Torino del gennaio 1897) per far palese la temerità di qualche giudizio dello stesso sig. AMODEO circa un mio precedente lavoro. Trattandosi di cose molto pedestri, il lettore, che non fosse al corrente dell'antefatto, non si ritragga per ciò dal seguirmi: chè non gli sarà forse discaro ricrearsi alquanto con me di alcuni amenissimi inganni, nei quali è, non volendo, caduto il geniale e intraprendente geometra di Napoli.

* ... Il sig. Pieri (così l'AMODEO) ha messo un postulato soverchio, il X. (*) Il suo post. IX, che dice *se π è un piano proiettivo, fuori di esso giace almeno un punto, ...* afferma l'esistenza dell' S_1 (**) e i punti o rette non complanari e i piani differenti fra loro di cui si può parlare non possono che far parte di quelli che mediante il piano π e il punto fuori di esso si possono costruire. — Quest'ultimo giudizio, per chi nol sapesse, equivale precisamente al (mio) post. X: nel senso che da una proposizione si deduce l'altra, e viceversa, presenti le più comuni notizie circa la retta ed il piano. Per la qual cosa avviene che il sig. AMODEO si valga senza saperlo di quel principio, introdotto furtivamente nel discorso; anzi lo adopera appunto per mostrarne l'inutilità.

* E siccome in base al post. IX si dimostra che *nello S_2 un S_2 e un S_1 che non si appartengono hanno un S_0 a comune*, risulta che è inutile introdurre il postulato X. — Tra parentesi, non è pur vero che il teorema citato si regga " in base al post. IX " : anzi questo potrebbe esser tolto, senza niuna offesa alla stabilità di quella proposizione, contenente già nell'ipotesi il giudizio esistenziale espresso da IX. Ma il sig. AMODEO non ristà dal produrre argomenti contro la propria tesi, neanche dopo avere smentito con singolare efficacia ed eleganza (come abbiain visto) quella sua conclusione circa l'inutilità del post. X. Ed eccola poche righe appresso ad ammettere, che " *con quel post. si chiude lo spazio, e lo si limita alla terza dimensione* ". Un servizio da nulla, come ognun vede! Ben è vero che una dimensione di più o di meno poco importa al sig. AMODEO: *de minimis non curat praetor*.

Nè, del resto, può darsi in una scienza deduttiva un postulato assolutamente soverchio: fuorchè nel caso, che esso sia conseguenza delle altre premesse. Inutile potrà esser soltanto di fronte allo scopo che l'autor si prefigge. Sicchè bisognerebbe al sig. AMODEO di provare, che il X è conseguenza di altra premesse da me pure accettate; o che certi fini (p. es. la dualità fra gli enti punto proj^o.

(*) Questo: " *Una retta (proiettiva) e un piano (proiettivo) hanno sempre almeno un punto (proiettivo) a comune* ".

(**) Per S_2 s'intende l'insieme dei punti pr.ⁱ (degli S_0) che stanno in raggi proiettanti i vari punti d'un piano pr.^o (di un S_2) da un punto esterno al medesimo. L' S_1 è la retta pr.^a.

o piano proj^o., ed il fatto che l'ambiente proiettivo, o classe dei punti proiettivi, risulti precisamente un S_2 si possono egualmente raggiungere con gli altri miei postulati. Impresa vana ed assurda; parecchè si dimostra, come due e due fanno quattro, che è vero appunto il contrario. (*)

A chi mi chiedesse, onde nascono gli equivoci del sig. AMODEO in questa parte, direi senza punto esitare: da poca avvertenza a certe particolarità di un'ipotesi; da poco o niun conto di certe differenze ideali, che paion piccine, e son grandi: particolarità e differenze, che men facilmente si scuoprono a chi non è familiare con quelle tali " idee ai simboli logici ", di cui tocca elegantemente il mio critico verso la fine. Se per es. si faccia astrazione dal post. X, corre un'enorme distanza fra il dire " una retta ed un piano " e il dire " una retta ed un piano d'un S_2 ". Chi non avverte una tal differenza, non potrà neanche avvedersi dell'ufficio di quel postulato. — E come spiegarsi altrimenti l'ingenuità di chi pronunzia, ad es.: " avere io implicitamente accettata altrove la soppressione del post. X, non avendolo più ripresentato in un'altra Nota sopra *Un sistema di postulati per la Geometria proiettiva degli iperspazi*: " nota, che ha per iscopo appunto il definire l'ambiente proiettivo assoluto, senz'alcun limite al numero delle dimensioni? (**)

Poiscia il sig. AMODEO, guidato dal suo " buon senso geometrico ", che " gli fa riconoscer distinte due proposizioni deducibili immediatamente l'una dall'altra per assurdo " (dunque, per es., anche queste: ogni a è b , ogni non b è non a) mi domanda ancora una dimostrazione del come e perchè succeda che nella proposizione: 1^o) " Due S_0 indipendenti A e B individuano una (ed una sola) classe AB di infiniti S_0 , di cui fan parte quei due " sia affermata senz'altro anche questa: 2^o) " Se C, D sono due S_0 di AB, sarà $CD = AB$ ". Ma, forse presago dell'imbarazzo in che mi poneva con questa (veramente non troppo discreta) esigenza, (***)

(*) Da questa confusione dell' S_2 con la classe dei punti neppure si guardan sempre i Maestri. Nessun dubbio che il post. X si possa evitare, come qualunque altra premessa; ma a patto di sopprimere o mutare sostanzialmente parecchie proposizioni. Così p. es. una trattazione della Geometria Elementare indipendente da quel postulato (o da un altro che ne faccia le veci) — com'è quella recata dal prof. VERONESE negli *Elementi di Geometria*, Verona, 1897 — porterebbe a modificar gli enunciati consuetudinari d'un gran numero di proposizioni; a motivo della clausola " il tutto essendo supposto giacere in un dato spazio a tre dimensioni " — cioè dentro una figura definita p. es. come al loc. cit., pag. 108 — che bisognerebbe inserir nelle ipotesi. Questa regola è in fatti osservata sul principio del Libro terzo (op. cit., pag. 105); benchè il prof. Veronese adopari la frase " giacenti nello spazio, " troppo alta ad insinuar nella mente de' giovani l'idea che di quelle figure non esista più d'una, cioè ad introdurre tacitamente il postulato che si vorrebbe appunto evitare. Ma essa è già trascurata sin dal § 1 (vedi a pag. 113 il teorema V e il corollario che lo preceda), per poi cadere in dimenticanza al § 3: risultandone proposizioni (come gli importantissimi teoremi I, II e III a pagg. 118-19) le quali, così come stanno e senza una qualche premessa che riduca la classe de' punti ne' confini d'uno spazio da tre dimensioni, non possono avervi per dimostrate; giacchè non son vere se l'ambiente geometrico può anche suppersi maggiormente esteso.

(**) Tralascio a malincuore di alcune altre riflessioni del Sig. Am., che toccano da vicino al suo modo di vedere e d'intendere in certe questioni fondamentali di logica e senso comune: ma disgraziatamente vi manca ogni appiglio per una discussione un po' concludente. — Altra bontà d'idee chiare e ben definite, altra precisione di linguaggio, altro stile, altri metodi insomma ci vogliono ormai per trattare con qualche frutto di certi argomenti... Che costrutto si può cavare ad es. da tutti i discorsi che allegramente si rincorrono a pag. 2 fra le linee 2^o e 20^o della sua lettera?

(***) " ... Che poi nella 1^a sia affermata esplicitamente la 2^a sarà manifesto a chiunque consideri un poco addentro il senso della prop. stessa, la quale in somma consiste nelle due affermazioni seguenti: a) Dati due S_0 indipendenti A e B, esiste una classe d'infiniti S_0 contenente que' due; b) questa classe è determinata dai punti stessi ed unica. — Or che cosa può mai significare la prop. b), se non vuol dire, che la classe AB non deve mutare, quando al posto di A, B s'introduca un'altra coppia di punti C, D, presi a piacere tra gli infiniti che compongono AB? " (PERRI, loc. cit.) — Togliasi il punto interrogativo (se così piace) e si legga: le prop. 1) e 2) rivestono entrambe un solo e medesimo concetto in forme grammaticali alquanto diverse (diversità che sparisce immediatamente alla prova, p. es., dei simboli logici).

candidamente si affretta a porgermi con le sue proprie mani l'invocata riprova; facendo ben constatare qualmente agli dimostri la proposizione 2^a a questo modo: " infatti, se non fosse $AB = CD$, per C e D passerebbero due S, distinti CD ed AB, — che è quanto dire: " infatti, se non fosse vera la 2), non sarebbe vera la 1. Deduzione di ottima lega, e tale iuvero, che neanche il sig. Simplicio stenterebbe a riconoscer perfetta: ma che nel vigore della sua natività e concisione rivela appunto e tradisce la bontà del mio asserto.

Ma i confini segnati alla controversia paiono ormai troppo angusti alle armi cortesi del prof. AMODEO: il quale preso del campo a sua posta (sempre a cavallo del " buon senso geometrico ") corre una impresa più illustre facendosi incontro alcuni degli altri miei principi:

" Col IV [Se A, B sono punti distinti, la classe AB contiene il punto A] si afferma che in AB è il punto A, non B, e che in BC vi è il punto B, non C; col V [Se... C è un punto della classe AB, purchè diverso da B, sarà sempre $AB = BC$ (*)] si afferma che le classi AB, BC, che non hanno alcun punto comune, sono identiche... Una chiosa, per quanto arguta, qui non servirebbe che ad oscurar le bellezze del testo, con poco riguardo ai lettori. Ai quali voglio anzi batter le mani per avermi ascoltato fin qui: l'intermezzo è finito.

Torino, luglio 1897.

M. PIERI.

SULLA QUESTIONE 342*

In questa piccola nota osservo come la formola c) della questione indicata non è estensibile all' n -gono inscritto in un circolo, ($n > 4$).

Indichiamo di detto n -gono tre vertici consecutivi con $i, i + 1, i + 2$; con $a_{i,i+1}, a_{i+1,i+2}$ rispettivamente i lati congiungenti i vertici $i, i + 1$; $i + 1, i + 2$; e con $d_{i,i+2}$ la congiungente i vertici $i, i + 2$. Di più indichiamo con $h_{i,a_{i+1,i+2}}$ la distanza del vertice i dal lato $a_{i+1,i+2}$ ed analogamente per $h_{i+2,a_{i,i+1}}$. Allora manifestamente si ha

$$(A) \begin{cases} h_{i+2,a_{i,i+1}} = \frac{d_{i,i+2} \times a_{i+1,i+2}}{2R} \\ h_{i,a_{i+1,i+2}} = \frac{d_{i,i+2} \times a_{i,i+1}}{2R} \end{cases} \quad (i = 1, \dots, n)$$

badando, nell'applicare queste formole, che gli indici della forma $n + k, n + t$ vanno ritenuti solamente come indici k, t , e che lo scambio di posto degli indici

(*) Questa prop. fu poi risolta in principi di minor peso nei lavori, che fanno seguito a quello preso in mira dal Sig. AM. : e il simile fu fatto di parecchi altri postulati; aggiungendo o togliendo, mutando o modificando in ogni parte. Con tutto ciò, (a sentir l'AM.) " il Sig. Pieri... dichiara che ad essi [i primi sei postulati del mio primissimo saggio] ha nulla da aggiungere o togliere ". — Un tale solocco e presuntuoso giudizio non fu mai da me pronunziato: nè in quella forma (dico a tutela del mio buon nome in grammatica) nè in altra.

stessi lascia inalterato l'elemento. È subito visto intanto che l'unico aggruppamento che possa dedursi dalla (A) e della natura della formola c), in generale, è il seguente:

$$(B) \sum_{i=1}^{i=n} \left[h_{1, a_{i+1, i+2}} + h_{i+2, a_{i, i+1}} \right] \left[\frac{1}{h_{1, a_{i+1, i+2}}} + \frac{1}{h_{i+2, a_{i, i+1}}} \right] = \\ = \sum_{i=1}^{i=n} \left[a_{i, i+1} + a_{i+1, i+2} \right] \left[\frac{1}{a_{i, i+1}} + \frac{1}{a_{i+1, i+2}} \right] \dots$$

Diciamo in generale, perché, oltre al triangolo ed al quadrangolo, per i quali si hanno rispettivamente le formole

$$\text{per il triangolo} \quad \left[\begin{array}{l} h_{1, a_{23}} = \frac{a_{13} a_{12}}{2R}, \quad h_{3, a_{12}} = \frac{a_{13} a_{23}}{2R} \\ h_{2, a_{31}} = \frac{a_{23} a_{21}}{2R}, \quad h_{1, a_{23}} = \frac{a_{21} a_{31}}{2R} \\ h_{3, a_{12}} = \frac{a_{32} a_{31}}{2R}, \quad h_{2, a_{31}} = \frac{a_{32} a_{12}}{2R} \end{array} \right.$$

$$\text{per il quadrangolo} \quad \left[\begin{array}{l} h_{1, a_{23}} = \frac{d_{13} a_{12}}{2R}, \quad h_{3, a_{12}} = \frac{d_{13} a_{23}}{2R} \\ h_{2, a_{31}} = \frac{d_{23} a_{21}}{2R}, \quad h_{4, a_{23}} = \frac{d_{23} a_{31}}{2R} \\ h_{3, a_{41}} = \frac{d_{31} a_{34}}{2R}, \quad h_{1, a_{31}} = \frac{d_{31} a_{41}}{2R} \\ h_{4, a_{12}} = \frac{d_{12} a_{11}}{2R}, \quad h_{2, a_{41}} = \frac{d_{12} a_{12}}{2R} \end{array} \right.$$

che permettono gli aggruppamenti noti, non vi sono altri casi: Di vero, perché le espressioni delle somme delle distanze dei vertici moltiplicate per le inverse di quelle siano confrontabili nel modo noto, con le espressioni della somma dei lati moltiplicate per la somma delle inverse di questi, è necessario che la espressione che ci dà ciascuna delle dette distanze non contenga più di una diagonale, ossia che questa diagonale sia il terzo lato di un triangolo di cui i due altri lati sono lati del poligono che si considera, epperò concludiamo che di formole analoghe alla c) per l' n^{esimo} inscritto in un circolo ($n > 4$) non vi è che la (B).

G. CANDIDO.

SOLUZIONE DELLE QUISTIONI

271* 272 276 279 282* 338* 351* 355 366* 367* 368 369*

271*. Il trinomio:

$$a^{n+1} - (n+1)ab^n + nb^{n+1}$$

è divisibile per $(a-b)^2$; dare l'espressione del quoziente. Dedurne poi che le espressioni $2^{2n} + 15n - 1$ e $2^{4n} - 15n - 1$ per n intero e positivo sono multiple rispettivamente di 9 e 25.

G. BELLACCHI.

Risoluzione del sig. G. Gallucci, studente a Napoli.

Sostituendo in $a^{n+1} - (n+1)ab^n + nb^{n+1}$ alla b la a si ottiene zero, perciò essa è divisibile per $a-b$. Se nel quoziente $a^n + ba^{n-1} + b^2a^{n-2} + \dots + b^{n-1}a - nb^n$ si sostituisce alla b la a si ottiene di nuovo zero, quindi il trinomio proposto è divisibile per $(a-b)^2$. Il quoziente è:

$$a^{n-1} + 2ba^{n-2} + 3b^2a^{n-3} + \dots + (n-1)b^{n-2}a + nb^{n-1}.$$

Invece di $a, b, n+1$ poniamo $4, 1, n$; l'espressione data si cangia in

$$4^n - n \cdot 4 + n - 1 = 4^n - 3n - 1$$

che dovrà essere divisibile per $(4-1)^2 = 9$. Aggiungendo $18n$ non si cambia questo carattere di divisibilità, onde $4^n + 15n - 1$ è multiplo di 9. Invece di $a, b, n+1$ poniamo $4, -1, 2n$; l'espressione data si cambia in

$$4^{2n} + 2n \cdot 4 + 2n - 1 = 2^{4n} + 10n - 1$$

che dovrà essere divisibile per $[4 - (-1)]^2 = 25$. Togliendo $25n$ non si cambia questo carattere di divisibilità, onde $2^{4n} - 15n - 1$ è multiplo di 25.

272. *Le coniche, passanti per un punto e bitangenti sopra una retta fissa alle coniche di un fascio, formano un altro fascio; gli 8 punti base dei due fasci sono in una conica.*

V. RETALI.

Risoluzione del sig. G. Gallucci.

Sia $\varphi - k\psi = 0$ il fascio dato di coniche individuato dalle due coniche $\varphi = 0$ e $\psi = 0$; $L = 0$ la retta fissa; φ_1, ψ_1, L_1 ciò che diventano le espressioni φ, ψ, L quando alle coordinate correnti si sostituiscono quelle del punto dato. La conica passante per questo punto e bitangente secondo L alla φ è $\varphi - k_1 L^2 = 0$, ove

$$k_1 = \frac{\varphi_1}{L_1^2}.$$

Similmente la conica passante pel punto e bitangente alla ψ secondo L è

$$\psi - k_2 L^2 = 0 \text{ ove } k_2 = \frac{\psi_1}{L_1^2}.$$

Una conica qualunque del fascio individuato da queste due coniche è

$$(1) \quad \varphi - k_1 L^2 - k_2 (\psi - k_2 L^2) = 0,$$

che si può porre sotto la forma $\varphi - k_2 \psi - k' L^2 = 0$, e perciò è bitangente ad una conica del fascio dato. Dunque il fascio (1) è quello delle coniche passanti pel punto e bitangenti secondo L alle coniche del fascio dato. Prendiamo per k_2

il valore speciale $\frac{k_1}{k_2}$; otterremo la conica

$$\varphi - k_1 L^2 - \frac{k_1}{k_2} (\psi - k_2 L^2) = \varphi - \frac{k_1}{k_2} \psi = 0,$$

che appartiene anche all'altro fascio; dunque gli 8 punti base dei due fasci

stanno sulla conica $\varphi - \frac{k_1}{k_2} \psi = 0$.

276. *Fra tutti i triangoli le cui mediane formano una progressione aritmetica di data ragione, quali sono rettangoli, quali acutangoli, quali ottusangoli.*

L. BOSI.

Risoluzione del sig. G. Gallucci.

Sia m la ragione ed x la mediana minore, saranno $m+x$, $2m+x$ le altre due mediane. Ad x corrisponde il lato maggiore a , ad $m+x$ il lato medio b , ad $x+2m$ il lato minore c . Si avrà

$$b^2 + c^2 = 2x^2 + \frac{1}{2}a^2; \quad c^2 + a^2 = 2(m+x)^2 + \frac{1}{2}b^2; \quad a^2 + b^2 = 2(2m+x)^2 + \frac{1}{2}c^2;$$

da questa si deduce

$$a^2 + b^2 + c^2 = \frac{4}{3} [x^2 + (m+x)^2 + (2m+x)^2].$$

Sostituendo in questa eguaglianza $2x^2 + \frac{1}{2}a^2$ a $b^2 + c^2$, si ricava

$$a^2 + \frac{1}{2}a^2 + 2x^2 = \frac{4}{3} [x^2 + (m+x)^2 + (2m+x)^2],$$

da cui

$$\frac{9}{8}a^2 = \frac{3}{2}x^2 + 6mx + 5m^2,$$

In modo analogo si ricava:

$$\frac{9}{8}b^2 = \frac{3}{2}x^2 + 3m \times + \frac{7}{2}m^2, \quad \frac{9}{8}c^2 = \frac{3}{2}x^2 - m^2.$$

Il triangolo dato è rettangolo, acutangolo od ottusangolo secondo che $a^2 \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} b^2 + c^2$ cioè secondo che

$$\frac{3}{2}x^2 + 6m \times + 5m^2 \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} \frac{3}{2}x^2 + 3m \times + \frac{7}{2}m^2 + \frac{3}{2}x^2 - m^2$$

e riducendo $3x^2 - 6m \times - 5m^2 \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} 0$. Le radici dell'equazione, che si ottiene eguagliando a 0 il trinomio, sono

$$x_1 = m \left(1 + \sqrt{\frac{8}{3}} \right), \quad x_2 = m \left(1 - \sqrt{\frac{8}{3}} \right),$$

quindi si ha

$$3x^2 - 6mx - 5m = 3 \left[x - \left(1 + \sqrt{\frac{8}{3}} \right) m \right] \left[x - \left(1 - \sqrt{\frac{8}{3}} \right) m \right],$$

ed essendo x_2 negativa, il segno del trinomio per valori positivi della x dipende solo dal fattore

$$x - \left(1 + \sqrt{\frac{8}{3}} \right) m.$$

Per conseguenza il triangolo sarà rettangolo acutangolo ed ottusangolo secondo che $x \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} m \left(1 + \sqrt{\frac{8}{3}} \right)$.

Altra risoluzione del sig. F. Celestri.

279. Si considerino tutte le coniche aventi a comune un fuoco F e la direttrice f corrispondente, F ed f essendo dati.

1°. Per ogni punto M del piano passa una ed una sola di queste coniche. Dire in quale regione deve trovarsi il punto M, perchè la conica corrispondente sia un'ellisse, una parabola od un'iperbole.

2°. Trovare il luogo dei vertici posti sugli assi non focali.

G. SCORZA.

Risoluzione del prof. U. Ceretti a Badia Polesine.

1°. Si sa che una conica può definirsi come il luogo di un punto, di cui la distanza da un punto fisso (fuoco) ha un rapporto costante e (eccentricità) colla distanza da una retta fissa (direttrice).

Prendendo per asse delle ordinate la retta fissa e per asse delle ascisse la perpendicolare alla direttrice condotta per il fuoco, l'equazione della conica (indicando con a la distanza dal fuoco alla direttrice) è

$$(1) \quad e^2 = \frac{(x-a)^2 + y^2}{x^2}.$$

Poichè ciascuna conica deve passare per il punto M del piano, indicando con X ed Y le sue coordinate, si ha

$$(2) \quad e^2 = \frac{(X-a)^2 + Y^2}{X^2};$$

e quindi secondo che e^2 , e perciò e , al variare di X e di Y sarà minore, maggiore od uguale ad 1, la conica sarà ellisse, iperbole o parabola.

Risulta perciò evidente che, se il punto X, Y appartiene alla parabola rappresentata dall'equazione (2) ovvero

$$(3) \quad Y^2 = 2a \left(X - \frac{a}{2} \right)$$

che ha f per direttrice ed F per fuoco, la conica del fascio è la parabola stessa.

Per ogni punto M interno alla parabola (3) risulta: $Y^2 < 2a \left(X - \frac{a}{2} \right)$, e però anche: $e^2 < 1$, $e < 1$; mentre per ogni punto M esterno si ha analogamente: $e > 1$; quindi in corrispondenza la conica del fascio è un'ellisse od un'iperbole. E perciò: per ogni punto M interno alla parabola: $Y^2 = 2a \left(X - \frac{a}{2} \right)$ la conica del fascio è un'ellisse; per ogni punto esterno è un'iperbole.

OSSERVAZIONE. — Per il caso particolare: $X = a$, $Y = 0$, si ha: $e = 0$; questo risultato dice che la conica del fascio si riduce al punto F, considerato come cerchio di raggio nullo.

2°. Dalle relazioni 1) e 2), eliminando e^2 , si ottiene l'equazione della conica passante per il punto (X, Y), e cioè:

$$x^2(a^2 + Y^2 - 2aX) - X^2y^2 + 2aX^2x = a^2X^2,$$

questa equazione si può anche scrivere:

$$\left(x + \frac{aX^2}{a^2 + Y^2 - 2aX} \right)^2 (a^2 + Y^2 - 2aX) - X^2y^2 = a^2X^2 \left(1 + \frac{X^2}{a^2 + Y^2 - 2aX} \right);$$

le coordinate dei vertici situati sull'asse non focale, sono le soluzioni del sistema formato da questa equazione e dall'altra

$$x + \frac{aX^2}{a^2 + Y^2 - 2aX} = 0,$$

ovvero del sistema

$$\begin{cases} x = -\frac{aX^2}{a^2 + Y^2 - 2aX} \\ -X^2y^2 = a^2X^2 \left(1 + \frac{X^2}{a^2 + Y^2 - 2aX}\right) \end{cases}$$

Da queste equazioni eliminando $\frac{X^2}{a^2 + Y^2 - 2aX}$ si deduce

$$y^2 = -a^2 \left(1 - \frac{x}{a}\right) = a(x - a);$$

quindi: il luogo dei vertici posti sugli assi non focali è la parabola d'equazione: $y^2 = a(x - a)$; tale parabola, ha per asse l'asse delle ascisse, si ha per vertice il punto $F(x = a, y = 0)$ ha per fuoco il punto $\left(\frac{5a}{4}, 0\right)$ e per direttrice la retta $x = \frac{3}{4}a$.

282*. Date due circonferenze concentriche di centro O ed un punto S , si tiri SO ad incontrare la circonferenza esterna in A e si congiunga un punto qualunque C di questa circonferenza con A . Condotta CO che sega la circonferenza interna in B e poi SB che incontra CA in M , trovare il luogo descritto dal punto M al variare di C sul cerchio.

A. LUGLI.

Risoluzione del sig. G. Gallucci.

Sia A' l'incontro di SO con la circonferenza interna. Siccome le due circonferenze sono concentriche risulta CA parallela a BA' , e per conseguenza $\frac{SB}{SM} = \frac{SA'}{SA}$. Dunque al variare di C sul cerchio il rapporto $\frac{SB}{SM}$ è sempre eguale ad $\frac{SA'}{SA}$, quindi il punto M descrive una circonferenza omotetica alla circonferenza interna col centro di omotetia in S e col rapporto di omotetia $\frac{SA'}{SA}$.

Altra risoluzione del sig. F. Celestri.

338*. Determinare la parte di superficie sferica racchiusa fra due archi l'uno di circolo massimo, l'altro di circolo minore terminati alla corda comune.

BELLACCHI.

Risoluzione del prof. V. Retali.

Sopra una sfera di centro O e raggio r , sieno tracciati un cerchio minore $ACBD$ di centro H e raggio a , e un cerchio massimo $ECFD$: vuolsi determinare la superficie S del fuso sferico di prima specie (*), $CADEC$, limitato da due archi CAD e CED supposti entrambi minori della metà delle circonferenze cui appartengono. Se P e P' sono i poli del cerchio minore, condotti i cerchi massimi PCP' e PDP' , la superficie cercata è la differenza fra il settore di calotta sferica $PCADP'$ (limitato dall'arco CAD e dai due archi eguali PC e PD) e il triangolo sferico isoscele PCD ; denotando con α e β le misure dell'arco di circolo di raggio 1 cor-

(*) Dicesi essere un fuso sferico (Zweieck, Onglet), di prima o di seconda specie, secondo che uno solo o entrambi gli archi che lo limitano appartengono a cerchi minori.

rispondenti all'angolo CHD, e all'angolo sferico C del triangolo PCD, con h la distanza OH del centro della sfera del cerchio minore, avremo:

$$S = r(r-h)\alpha - r^2(\alpha + 2\beta - \pi) = 2r^2\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) - rh\alpha;$$

per le superficie S' , S'' , S''' degli altri tre fusi CBDEC, CBDFC, CFDAC, abbiamo:

$$S' = \text{calotta PACBD} - S = 2r^2\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) - rh(2\pi - \alpha)$$

$$S'' = \text{emisf.} - S' = 2r^2\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) + rh(2\pi - \alpha).$$

$$S''' = \text{emisf.} - S = 2r^2\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) + rh\alpha.$$

Osservando ora che nelle espressioni di S , S' , S'' , S''' il coefficiente di $2r^2$ è l'angolo η formato dalle tangenti in C ai lati del fuso; e che il coefficiente di rh è l'angolo λ corrispondente all'arco del cerchio minore, le quattro formole precedenti si riducono all'altra

$$\Sigma = 2r^2\eta \mp rh \cdot \lambda,$$

ove deve prendersi il segno $-$ o il segno $+$, secondoche l'arco di cerchio massimo che è lato del fuso, è minore o maggiore di un semicerchio massimo. Fissando, arbitrariamente, il senso positivo dei lati del fuso vale la formola generale

$$\Sigma = 2r^2\eta - rh\lambda,$$

che esprime il teorema: *« la superficie di un fuso sferico di prima specie eguaglia quella di un fuso ordinario avente uguale angolo (delle tangenti) diminuita di un settore di zona sferica, la cui altezza è la distanza del cerchio minore dal centro della sfera, e il cui angolo è misurato dall'arco del cerchio minore ».*

L'ultima formola risolve completamente la quistione proposta, ma possiamo anche esprimere facilmente Σ in funzione della corda comune $2s$ e dei raggi r , ρ .

Abbiamo infatti, $s = \rho \sin \frac{\alpha}{2}$,

$$\text{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{s}{\sqrt{\rho^2 - s^2}}, \quad h = \sqrt{r^2 - \rho^2}, \quad \cos \widehat{PC} = \frac{1}{r} \sqrt{r^2 - \rho^2};$$

del triangolo sferico isoscele CPD abbiamo poi;

$$\cot PC \cdot \text{sen DP} = \cot C \cdot \text{sen P} + \cos DP \cdot \cos P$$

dalla quale,

$$\cot C = \cot \beta = \cos PC \cdot \frac{1 - \cos \alpha}{\text{sen} \alpha} = \frac{1}{r} \sqrt{r^2 - \rho^2} \cdot \text{tg} \frac{\alpha}{2},$$

$$\cot \beta = \frac{s}{r} \sqrt{\frac{r^2 - \rho^2}{\rho^2 - s^2}},$$

e finalmente

$$\Sigma = 2r^2 \text{arc tang} \left(\frac{s}{r} \sqrt{\frac{r^2 - \rho^2}{\rho^2 - s^2}} \right) - 2r \sqrt{r^2 - \rho^2} \cdot \text{arc sec} \frac{s}{\rho};$$

che è la formola a cui si perviene col Calcolo Integrale.

Le superficie di ogni poligono sferico limitato da archi di cerchi minori può esprimersi mediante quelle di fusi di prima specie, come mostrerò in altra occasione, in una nota su questo argomento.

Altra risoluzione del sig. Emanuele Palumbo Todaro.

351*. Risolvere il sistema

$$\begin{aligned} (1) \quad & x^2 + y^2 + z^2 + u^2 = a^2 \\ (2) \quad & y(x + z + u) = b \\ (3) \quad & x(z + u) + uz = c \\ (4) \quad & xz = d. \end{aligned}$$

CANDIDO.

Risoluzione del sig. Egidio Tamagnini alunno del R. Istituto Tecnico A. Secchi, Reggio Emilia.

Dalla (2) ottengo

$$x + z + u = \frac{b}{y},$$

e quadrando

$$x^2 + z^2 + u^2 + 2xz + 2xu + 2uz = \frac{b^2}{y^2}.$$

Ma $x^2 + z^2 + u^2 = a^2 - y^2$ e $2xz + 2xu + 2uz = 2c$, quindi si ha

$$a^2 - y^2 + 2c = \frac{b^2}{y^2}$$

oppure

$$y^4 - (a^2 + 2c)y^2 + b^2 = 0,$$

La quale risolta dà:

$$y = \pm \sqrt{\frac{a^2 + 2c \pm \sqrt{(a^2 + 2c)^2 - 4b^2}}{2}}.$$

Conosciuto y il sistema diventa:

$$\begin{aligned} (1)' \quad & x^2 + z^2 + u^2 = a^2 - y^2 = a' \\ (2)' \quad & x + z + u = \frac{b}{y} = b' \\ (3)' \quad & xz + xu + uz = c \\ (4)' \quad & xz = d. \end{aligned}$$

Dalla (2)' ho ancora

$$x + z = b' - u,$$

e quadrando di nuovo

$$x^2 + z^2 + 2xz = b'^2 + u^2 - 2b'u.$$

Ma dalla (1)' ho $x^2 + z^2 = a' - u^2$ e dalla (4)' $2xz = 2d$ e di conseguenza

$$a' - u^2 + 2d = b'^2 + u^2 - 2b'u,$$

ossia

$$2u^2 - 2b'u + b'^2 - a' - 2d = 0,$$

che risolta mi dà

$$u = \frac{b' \pm \sqrt{2a' + 4d - b'^2}}{2}.$$

Restano le due incognite x, z di cui conosco la somma

$$x + z = b' - u = b''$$

e il prodotto

$$xz = d.$$

Posso quindi scrivere l'equazione in t che ha per radici x e z

$$t^2 - b't + d = 0,$$

la quale mi dà

$$t = \frac{b'' \pm \sqrt{b''^2 - 4d}}{2};$$

e avrò finalmente

$$x = \frac{b'' \pm \sqrt{b''^2 - 4d}}{2} \quad z = \frac{b'' \mp \sqrt{b''^2 - 4d}}{2}$$

Altre soluzioni dei sigg. Guido Bordi, Gino Lubrano, Attilio Crepas, Michele Bello.

355. Se due cerchi eguali si segano sotto un angolo di 60° , il loro cerchio radicale è il luogo della proiezione (ortogonale) di un punto dell'un cerchio sulla sua polare rispetto all'altro.

RETAGLI.

Risoluzione del prof. Cardoso-Laynes.

Indicando con $2a$ la distanza dei centri e con r il raggio, supposta la figura riferita ad un sistema cartesiano formato dalla retta centrale (asse x) e dall'asse radicale (asse y), le equazioni di due cerchi eguali qualunque saranno

$$(1) \quad (x - a)^2 + y^2 - r^2 = 0 \quad ; \quad (2) \quad (x + a)^2 + y^2 - r^2 = 0$$

e quella del loro cerchio radicale sarà:

$$x^2 + y^2 + a^2 - r^2 = 0.$$

Nel caso particolare in cui si supponga che i due cerchi s'incontrino secondo un angolo $= \frac{\pi}{3}$, se congiungiamo il centro di uno dei cerchi dati con uno dei punti d'intersezione degli stessi cerchi, dal triangolo che questa retta forma con gli assi coordinati si ha

$$(3) \quad a = r \cos \frac{\pi}{6} = \frac{r\sqrt{3}}{2}$$

e perciò l'equazione del cerchio radicale diviene

$$(4) \quad x^2 + y^2 = \frac{r^2}{4}.$$

Ciò posto, consideriamo la polare, rispetto al cerchio (2), di un punto (x_1, y_1) appartenente al cerchio (1). Essa sarà:

$$(5) \quad (x + a)(x_1 + a) + yy_1 - r^2 = 0.$$

La normale a questa, condotta da (x_1, y_1) è

$$(6) \quad y - y_1 = \frac{y_1}{x_1 + a}(x - x_1).$$

Risolvendo il sistema (5) (6) rispetto a x_1, y_1 si ha

$$(7) \quad x_1 = \frac{r^2(x + a) - a[(x + a)^2 + y^2]}{(x + a)^2 + y^2}; \quad y_1 = \frac{r^2 y}{(x + a)^2 + y^2}$$

nelle quali formole x, y indicano le coordinate della proiezione ortogonale di (x_1, y_1) sulla polare (5).

Sostituendo le (7) nella (1) si avrà l'equazione del luogo cercato, cioè:

$$r^4 - 4ar^2(x+a) + (4a^2 - r^2)\{(x+a)^2 + y^2\} = 0.$$

Tenendo conto della (3), la (8) si trasforma nella (4), il che dimostra il teorema.

Altra risoluzione del sig. Ernesto Laura.

366^a. La condizione necessaria e sufficiente perchè un numero a sia eguale alla somma di p numeri dispari consecutivi è che p sia un divisore di a tale che

$$\frac{a}{p} - p = \text{numero pari (lo 0 compreso)}.$$

367^a. La condizione necessaria e sufficiente perchè un numero a sia eguale alla somma di p numeri pari consecutivi è che p sia un divisore di a tale che

$$\frac{a}{p} - p = \text{numero dispari}.$$

A. FONTBRASSO.

Risoluzione del prof. Cardoso-Laynes.

Se indichiamo con S_k la somma dei primi k numeri dispari, avremo:

$$a = (2n+1) + (2n+3) + (2n+5) + \dots + (2n+2p-1) = S_{n+p} - S_n$$

ossia

$$a = (n+p)^2 - n^2 = p^2 + 2np$$

da cui

$$\frac{a}{p} - p = 2n$$

e inversamente da quest'ultima formola si risale facilmente alla prima, perciò il teorema del n. 366 resta dimostrato.

Se indichiamo con Σ_k la somma dei primi k numeri pari avremo:

$$a = (2n+2) + (2n+4) + \dots + (2n+2p) = \Sigma_{n+p} - \Sigma_n$$

ossia

$$a = (n+p)(n+p+1) - n(n+1) = p^2 + (2n+1)p$$

da cui

$$\frac{a}{p} - p = 2n+1$$

e inversamente da quest'ultima formola si può risalire alla prima e quindi il teorema del n. 367 resta dimostrato.

Altra risoluzione del sig. Michele Belfo.

368. Dimostrare che

$$2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{1+\frac{1}{2n}}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{1+\frac{1}{2n}}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{1+\frac{1}{2n}}} \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2-\frac{1}{2n}}} \right\}$$

G. FUBINI.

Risoluzione del sig. E. Strocchi.

È noto che: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$; e si ha pure (Vedi: CESÀRO, *Corso di analisi algebrica*, pag. 149, § 18) indicando con $\log a$ il logaritmo naturale di a ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \dots + \frac{1}{4n-1} \right) = \frac{1}{2} \log 2$$

Ciò premesso si ha:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{2n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{3}{2n}} \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2-\frac{1}{2n}} \right\} = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{2n} + 1+\frac{3}{2n} + \dots + 2-\frac{1}{2n}} \right\} = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{2n}{2n+1} + \frac{2n}{2n+3} + \dots + \frac{2n}{4n-1}} \right\} = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}^{\left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \dots + \frac{1}{4n-1}\right)} = \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}^{2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \dots + \frac{1}{4n-1}\right)} = \\ & = e^{2 \cdot \frac{1}{2} \log_e 2} = e^{\log_e 2} = 2. \end{aligned}$$

Altre risoluzioni del sig. Angiolo Pensa e del Prof. Riccardo Micks.

369*. Se T è un tronco di prisma, che ha per base un poligono regolare S, P è il punto d'incontro dell'altra base S colla retta parallela agli spigoli laterali condotta per il centro del circolo circoscritto ad S, h la distanza di P dal piano di S, h', la media aritmetica delle distanze dei vertici di S' dal piano di S; si dimostri che T è equivalente alla somma di tre piramidi che hanno la base eguale ad S e l'altezza una eguale ad h e due ad h'.

G. LAZZERI.

Risoluzione del sig. Prof. R. Micks di Trieste.

I semipiani condotti per la retta che congiunge P col centro del circolo circoscritto ad S e per gli spigoli laterali del tronco rispettivamente, scompongono il tronco in n tronchi di prismi triangolari le cui basi sono eguali ad $s = \frac{S}{n}$. — Chiamando $h', h'', h''', \dots, h^{(n)}$, le distanze dei vertici di S' dal piano di S, la misura del volume di uno di questi prismi triangolari è

$$v = \frac{s}{3} (h + h' + h'').$$

E quindi quella dell'intero tronco dato è

$$T = \frac{s}{3} [(h + h' + h'') + (h + h' + h''') + \dots + (h + h^{(n-1)} + h^{(n)}) + (h + h^{(n)} + h')]$$

ovvero
$$T = \frac{s}{3} [n \cdot h + 2(h' + h'' + h''' + \dots + h^{(n)})].$$

Essendo
$$h_1 = \frac{h' + h'' + h''' + \dots + h^{(n)}}{n},$$

si ha pure
$$T = \frac{s}{3} [nh + 2nh_1],$$

$$T = \frac{ns \cdot h}{3} + 2 \frac{ns \cdot h_1}{3},$$

che (essendo $ns = S$) si può scrivere

$$T = \frac{S \cdot h}{3} + 2 \frac{S \cdot h_1}{3}$$

q. e. d.

QUISTIONI PROPOSTE (*)

371*. Se N indica il numero dei numeri che hanno per caratteristica n , ed N' indica il numero dei numeri i cui reciproci hanno per caratteristica $-n'$, si ha $\frac{N}{N'} = 10^{n-n'+1}$.

372*. La sesta potenza di qualunque numero intero è congrua a 0, o ad 1 rispetto al modulo 9.

373. La terza potenza d'ogni numero intero è congrua a 0, o a ± 1 , o ± 5 rispetto al modulo 13.

374*. La sesta potenza di ogni numero intero è congrua a 0, o a ± 1 , rispetto al modulo 13.

375*. La quarta potenza di qualunque numero intero è congrua a 0, o ad 1, o a 6, o a 10 rispetto al modulo 15.

376*. Se si ha $N \equiv 6 \pmod{15}$, qualunque potenza di N sarà congrua a 6 rispetto al modulo 15.

377. Se si ha $N \equiv 10 \pmod{15}$, qualunque potenza di N sarà congrua a 10 rispetto al modulo 15.

BONOLIS.

378. Dimostrare le identità

$$\begin{aligned} \text{Sen}(nx) &= \begin{vmatrix} 2 \cos x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos x & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \cos x & 1 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \cos x & \dots \end{vmatrix} \\ \text{Cos}(nx) &= \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos x & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \cos x & 1 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \cos x & \dots \end{vmatrix} \end{aligned}$$

dove il primo determinante è di ordine $n-1$ ed il secondo di ordine n .

BETTINI.

379. Se $A, A'; B, B'; C, C'; D, D'$ sono quattro coppie di elementi coniugati in una involuzione quadratica I , i coniugati di A', B', C' rispettivamente nelle involuzioni $(B, C; D, D'), (C, A; D, D'), (A, B; D, D')$ sono un medesimo elemento E ; e i coniugati rispettivi di A, B, C nelle involuzioni $(B', C'; D, D'), (C', A'; D, D'), (A', B'; D, D')$ coincidono nell'elemento E' coniugato ad E nella I .

380. Determinare lo involuppo di un cerchio, il cui centro percorre una parabola data e che tocca una retta parallela alla direttrice. Trovare il punto di contatto del cerchio mobile col suo involuppo; e dimostrare che quest'ultimo è pure lo involuppo delle rette simmetriche della retta data rispetto alle tangenti della parabola.

(*) Le quistioni contrassegnate con un asterisco sono proposte agli studenti delle scuole secondarie; le altre a tutti gli studiosi indistintamente.

381. Due parabole omofocali hanno le direttrici parallele, ed r è la bisettrice della striscia formata da queste direttrici: dimostrare che lo involuppo delle bisettrici degli angoli formati da una tangente variabile dell'una o dell'altra parabola con r è un medesimo cerchio.

382. Luogo dei fuochi delle parabole, che toccano una parabola data e hanno per direttrice una medesima retta, parallela alla direttrice della parabola data.

RETALI.

ERRATA-CORRIGE. — Alla questione 360, proposta nel precedente fascicolo, va aggiunto quanto segue, che fu omissso:
 se il triangolo dato è acutangolo. (Modificare la seconda parte del teorema negli altri casi).

BIBLIOGRAFIA

Coi tipi di Raffaello Giusti (Livorno) sono uscite 5 operette didattiche del Dottor GIUSEPPE M. TESTI, delle quali diamo qui un breve cenno.

1°. — *Elementi di Algebra ad uso più specialmente dei licenziandi delle Scuole Tecniche.* — 5ª ediz. conforme ai programmi, con 235 esercizi appropriati a ciascun argomento. — Pagine 107. L. 1,20.

Questo libretto contiene le quattro operazioni razionali fondamentali, un cenno del calcolo dei radicali (su esempi), le equazioni di 1° e 2° grado a un'incognita, i sistemi di 1° grado a due incognite e anche (su esempi) a tre o più incognite. Buona mi sembra l'esposizione della regola per la divisione dei polinomi, perchè mentre è pratica è anche ragionata. I numeri negativi sono introdotti senza sottilizzare molto sulla legittimità delle operazioni con esse, e ciò è bene in un corso elementarissimo. In un punto mi è parso che l'A. non abbia ben espresso il suo pensiero ed è là dove per spiegare l'uso della parentesi presenta come differenti le espressioni $a + b \times c$, $(a + b \times c)$.

2°. — *Corso di Aritmetica con 500 esercizi e problemi ad uso degli alunni delle Scuole Tecniche, dei Ginnasi inferiori e delle Scuole Complementari.* — 5ª ediz. nuovamente corretta. — Pagine 295. L. 1,75.

Il pubblico, cui si indirizza l'A., è senza dubbio immaturo per certe dimostrazioni, e l'A. le ha molto opportunamente tralasciate; in compenso poi la materia è copiosa e ben disposta a preparare l'allunno allo studio dell'algebra; infatti nel nostro libro troviamo anche un capitolo pel calcolo con espressioni numeriche e l'uso delle parentesi. Lo studio dell'A. per conciliare la facilità coll'esattezza, se in generale può dirsi ben riuscito, mi sembra non abbia ben raggiunto lo scopo nel delicato argomento della misura (Cap. VI). Ecco il pensiero dell'A. Premessa una definizione di misura numerica, che equivale sostanzialmente a quella di rapporto di una grandezza all'unità nel caso che la grandezza sia commensurabile coll'unità, l'A. accennando al caso dell'incommensurabilità pone in evidenza la necessità delle misure inesatte.

Ora questo modo di vedere è intanto contrario all'usuale, perchè generalmente per misura numerica di una grandezza si intende quel numero cui si perviene misurando la grandezza data coll'unità o con parti aliquote prescritte dell'unità; il

qual numero può essere il rapporto della grandezza all'unità, ma in generale non è che un numero variabile col suo denominatore il quale ha per limite il rapporto della grandezza all'unità, anche se questo rapporto è razionale (come accade ad es. misurando $\frac{1}{3}$ di litro in decilitri o centilitri, ecc.). Inoltre il punto di vista dell'A. è contrario (mi sembra) al buon metodo, perchè, mentre lo mette nella necessità di accennare senza poterlo sufficientemente sviluppare (nemmeno su un esempio) il concetto sottile di incommensurabilità, non gli consente poi di evitare l'inconveniente che presenta il concetto usuale di misura numerica, che cioè una stessa grandezza abbia rispetto a una stessa unità infinite misure rappresentate da frazioni non equivalenti; perchè l'A. urta appunto in tale inconveniente, quando considera le misure inesatte nel caso dell'incommensurabilità.

In seguito poi l'A. definisce il *rapporto* di due grandezze come il quoziente delle loro misure (supposte esatte), lasciando così senza rapporto due grandezze aventi misure inesatte; mentre stando al concetto comune di rapporto (che è quello di misura esatta o che si considera come esatta) può avvenire che abbiano rapporto anche due grandezze aventi misure inesatte. Naturalmente accettando il concetto usuale di rapporto, invece di dimostrare come fa l'A. (pag. 220) che il rapporto di due grandezze è eguale alla misura della prima per mezzo della seconda, sarebbe da provare che, se esistono i rapporti di due grandezze ad una terza, il loro quoziente è il rapporto di una delle grandezze all'altra.

Queste osservazioni di indole tutta teorica non possono certo in niun modo menomare un lavoro d'intenti tutti pratici, il quale rimane sempre un pregevole libro di testo per le nostre Scuole.

3°. — *Elementi di Aritmetica teorico-pratica ad uso più specialmente delle Scuole Normali con numerosi esercizi e problemi. Parte 1ª. Operazioni e proprietà dei numeri (per 1º corso normale). 300 esercizi. Pagine 171 — 2ª edizione. L. 1,50.*

A differenza del precedente questo libretto è naturalmente tutto ragionato e contiene le teorie che riguardano l'Aritmetica pura o non le applicazioni. Mi sembra molto chiaro e ben fatto. Spero che l'A. nella 3ª edizione (che non può mancare) inserirà quella comoda disposizione di calcolo suggerita dal Bertrand per l'estrazione della radice cubica, senza della quale l'operazione è quasi impraticabile.

4°. — *Elementi di geometria ad uso degli alunni delle Scuole Tecniche e Normali con 177 figure e 510 esercizi. — 4ª edizione riveduta. — Pagine 208. L. 1,75.*

I programmi delle Scuole Tecniche e Normali sembrano esigere che le relazioni fra le grandezze geometriche siano ricavate il più che si può dalle relazioni fra i numeri che le rappresentano; e poichè in una Scuola Tecnica o Normale non si può parlare con esattezza degli irrazionali, questa esigenza conduce a delle dimostrazioni che valgono solo in certi casi.

Il nostro A., che scrive appunto per le Scuole Tecniche e Normali, ha quindi questo peccato originale nel metodo, e bisogna perdonargli se scrive una geometria dirò così approssimata. Anche accettando il suo metodo dovrei però intanto ripetere qui le osservazioni ai suoi concetti di misura e di rapporto che ho già

fatte parlando del 2° libretto. Inoltre non posso tacere che le qualità imprecise del metodo si sono comunicate talora allo stile dell'A., come per es. nella definizione di tangente al cerchio (pag. 60), nella dimostrazione del teor. 236 sull'equivalenza dei prismi e nell'introduzione di certe locuzioni poco corrette, come quella di poligono di un numero infinitamente grande di lati (pag. 103).

Infine debbo notare che vi è grande incertezza sui criteri che hanno guidato l'A. talora a esporre tal'altra a tacere le dimostrazioni delle proposizioni; per es. le principali proprietà degli angoli solidi nonchè le descrizioni dei solidi regolari sono date senza dimostrazione, mentre si pretende dimostrare la formola pel calcolo della circonferenza per mezzo del raggio (col poligono di infiniti lati) o del volume della sfera (come somma d'infinita piramidi), oppure si danno dimostrazioni alquanto difficili come quella del teor. 279 sull'equivalenza dei prismi. Tutti questi difetti sono poi compensati da molti buoni capitoli, come quello sulle parallele sulle posizioni relative di rette e piani, ecc., i quali provano ancora una volta che, ove lo scrittore non fosse stato traviato dal metodo (quasi obbligatorio), avrebbe saputo darci un volumetto incensurabile.

5°. — *Nozioni di geometria ad uso più specialmente delle allieve dei Corsi complementari (già Scuole preparatorie alle Normali) con 124 figure e 180 esercizi. — Pagine 92. L. 1.*

Qui l'A. vuole di proposito dare non dimostrazioni ma semplici illustrazioni delle proposizioni enunciate; e francamente mi sembra che, sia per la forma dell'esposizione, sia per la cura con cui sono disegnate le figure, Egli sia perfettamente riuscito a comporre un buon libro di testo.

G. SFORZA.

B. CARRARA. — *Raccolta di problemi di fisica e chimica. — G. B. Paravia 1897.*

La prima parte (pag. 368, L. 5) contiene settecento problemi sui vari rami della fisica che s'insegna nelle nostre scuole secondarie. Molti di essi sono seguiti da soluzioni assai sviluppate, che devono servire di esempio all'allievo, e che sono sempre semplici ed eleganti: indichiamo, per tutte, quelle relative ai problemi di ottica. Di tutti gli altri è data almeno la risposta; cosa utile, se gli errori di stampa fanno difetto, ad avvertire, nel caso, il giovane sia di un calcolo errato, sia di una soluzione sbagliata.

Parecchi problemi ci sembrano assolutamente superflui; perchè si riducono a vane applicazioni numeriche senza riscontro alcuno nei casi della vita ordinaria, o della pratica scientifica. Citiamo, abbreviandolo, questo che è fra i più innocenti: " quanti pezzi da 10 centesimi abbisognerebbero per fabbricare un emisfero della stessa lega di cm. 50 di diametro? (prob. 90) „

Altresi avremmo desiderato che si avesse avuto, sempre e dovunque, riguardo alla realtà scientifica. Così leggiamo: " Un vaso è fatto di una sostanza il cui calore specifico è 0,5... (prob. 393) „. Ora l'unico corpo che risponda a questo dato è il ghiaccio, il quale non può certo adoperarsi per farne un vaso calorimetrico. Ma ci affrettiamo subito a dire che questi medesimi difetti si trovano in tutte le opere congeneri.

Con molta cura è fatta la parte seconda, (pag. 87, L. 2) la quale contiene i problemi di chimica; sono notevoli specialmente quelli svolti ad esempio.

In complesso si tratta di una buona raccolta da consigliarsi ai professori ed ai giovani, che vogliono realmente impadronirsi delle teoriche esposte nei corsi. Un breve riassunto dei principii applicati nei varii problemi torna comodo allo studioso, ed opportune figure servono ad illustrare molte delle questioni sviluppate.

R. PITONI.

G. Z. REGGIO. — *Complementi di Algebra per gli allievi degli istituti tecnici* (2° biennio). — G. B. Paravia, 1897.

Nel primo libro (*calcolo combinatorio*) l'autore espone, in modo molto chiaro e preciso, gli ordinari teoremi sulle combinazioni, disposizioni e permutazioni e lo sviluppo della potenza intera e positiva di un binomio e di un polinomio. Seguono poi le formole che danno le somme delle varie potenze dei termini di una progressione aritmetica; un cenno, forse troppo limitato, sulle probabilità, e la teorica dei determinanti quale comunemente s'insegna nei libri per le scuole secondarie.

Nel secondo libro (*numeri e grandezze*) l'autore, premesso il concetto di numero intero, ricorda brevemente le caratteristiche delle operazioni dirette e inverse su questi numeri. Partendo poi dal bisogno di render sempre possibili quest'ultime operazioni, l'autore si fa strada a parlare dei numeri frazionari e negativi, ed estende ad essi le operazioni già indicate per i numeri interi. Dopo questo breve riassunto, l'autore si ferma più a lungo sui numeri irrazionali sviluppando il concetto del Dedekind, un po' più difficile, secondo noi, a farsi capire ai principianti di quello del Cantor. Vero è che quest'ultimo concetto, di riguardare cioè gli irrazionali come limiti di due serie convergenti di numeri razionali, è ripreso nel libro terzo e il chiarissimo autore se ne serve per illustrare le operazioni sugli irrazionali medesimi. Ma si poteva perciò appunto in un libro elementare evitare il primo modo di vedere, e dare un più ampio sviluppo al secondo. I numeri complessivi sono dall'autore esposti tanto col metodo del Cauchy quanto colla rappresentazione del Gauss.

Nel libro terzo si dichiarano, col rigore voluto dalla scienza moderna i concetti di frazioni e di limite e si sviluppa ampiamente la teorica delle frazioni continue.

Il quarto libro comincia con un riassunto, che poteva forse anche tralasciarsi, sulle equazioni di 1° e 2° grado, per accennare poi alla risoluzione dell'equazioni binomie, ed all'analisi indeterminata di primo grado. Segue un brevissimo capitolo, che può omettersi dall'insegnante, sulle congruenze, e il libro si chiude con cenni molto ben fatti sulle disequaglianze e sui massimi e minimi.

Trattandosi di soggetti così elementari e disparati il libro non contiene, né poteva contenere, nulla di nuovo. Si ha soltanto il diritto di richiedere una esposizione chiara, precisa e sicura e a questo l'autore soddisfa completamente. L'essere poi il libro giunto alla seconda edizione ci dispensa da qualunque altro giudizio.

Soltanto ci auguriamo che in una prossima ristampa siano più curate le note storiche, alcune delle quali si riducono ad un puro accenno di nomi senza indicazioni di date.

Buoni e bene scelti sono i problemi posti alla fine di ogni capitolo.

R. PITONI.

GIULIO LAZZERI — *Direttore responsabile*

Finito di stampare il 31 Agosto 1897.

NUOVO METODO PER LO STUDIO E PER IL CALCOLO DELLE FUNZIONI TRASCENDENTI ELEMENTARI

I. — Funzioni circolari.

1. - LEMMA 1°. — Essendo a, b due numeri tali che sia $|b| > |a|$, si formi la successione

$$(1) \quad a, b, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots, a_{n-1}, b_{n-1}, a_n, b_n, a_{n+1}, b_{n+1}, \dots$$

colla seguente legge. Sia a_1 la media aritmetica di a e di b ; sia b_1 la media geometrica di b e di a_1 ; in generale sia:

$$(2) \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n) \quad (3) \quad b_{n+1} = \sqrt{b_n a_{n+1}}$$

Se tutti i radicali, che ci danno le b_n vengono presi con lo stesso segno del numero b , allora a_n, b_n sono variabili convergenti, che tendono, col crescere di n , ad un medesimo limite $\psi(a, b)$.

Distingueremo due casi secondo il segno di b ; sia dapprima $b > 0$, allora tutte le b_n sono per ipotesi positive: poichè $|b| > |a|$ ed $a_1 = \frac{a+b}{2}$, il numero a_1 sarà positivo, minore di b e maggiore di a ;

poichè $b_1 = \sqrt{a_1 b}$ e $b > a_1$, si avrà $a_1 < b_1 < b$; quindi $b > b_1 > a_1 > a$. Nell'identico modo si dimostra essere: $b_1 > b_2 > a_2 > a_1$; $b_2 > b_3 > a_3 > a_2$; ecc. dalle quali disequaglianze risulta che col crescere dell'indice le b vanno diminuendo, le a aumentando; ma le b restano sempre superiori alle a . Inoltre la differenza $a_n - b_n$ decresce indefinitamente: infatti

$$a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + b_{n-1}) \text{ e per conseguenza } a_n - b_{n-1} = \frac{1}{2}(a_{n-1} - b_{n-1});$$

e siccome b_n è compreso tra b_{n-1} ed a_n si ha

$$a_n - b_n < \frac{1}{2}(a_{n-1} - b_{n-1}).$$

Ne segue che a_n, b_n sono due variabili convergenti, ed hanno un limite.

Sia ora $b < 0$, tutte le b_n saranno per ipotesi negative; anzi si riconosce immediatamente che se poniamo: $a' = -a$, $b' = -b$ e formiamo i numeri

$$(a) \quad a', b', a'_{11}, b'_{11}, a'_{21}, b'_{21}, \dots$$

in modo che (analogamente a quanto si è indicato per la (1)) ogni a'_n sia la media aritmetica e ogni b'_n sia la media geometrica dei due numeri che lo precedono, un numero qualunque della (1) non differisce che nel segno dal corrispondente della (a). Ma per il primo caso il limite di a'_n e di b'_n (per n crescente indefinitamente) esiste ed è positivo, perchè $b' > 0$; questo limite cambiato di segno sarà dunque il limite di a_n e di b_n , limite che perciò esiste ed è negativo.

Indicherò con $\psi(a, b)$ il limite delle variabili convergenti a_n, b_n per n crescente all'infinito.

COROLLARIO. — Il limite $\psi(a, b)$ è dello stesso segno di b e resta moltiplicato per un numero qualunque K , se si moltiplicano per K i numeri a, b .

LEMMA 2°. — Se $b > 0$, il limite $\psi(a, b)$ non solo è compreso tra un numero a e un numero b (consecutivi o no) qualunque, ma anche, per ogni valore di m tra $b_m - \frac{1}{3}(b_{m-1} - b_m)$ ed $\frac{1}{3}(a_m + 2b_m)$.

La prima parte di questo lemma, importante non per la teoria ma per il calcolo numerico di $\psi(a, b)$, risulta subito dalla dimostrazione precedente. Per la seconda parte si osservi che seguendo la via indicata nel *Traité de Géométrie* par E. ROUCHÉ et CH. DE COMBEROUSSE a proposito del teorema di Schwab, si ha

$$b_m - \frac{1}{3}(b_{m-1} - b_m) < \psi(a, b) < a_m + \frac{1}{3}(a_m - a_{m-1});$$

ora, posto nel terzo membro di questa disuguaglianza $m + 1$ in luogo di m , otteniamo appunto a causa della (2)

$$b_m - \frac{1}{3}(b_{m-1} - b_m) < \psi(a, b) < \frac{1}{3}(a_m + 2b_m)$$

2. - **TEOREMA.** — Se $a^2 + c^2 = b^2$, sussiste la identità

$$(3) \quad \text{arc. cos } \frac{a}{b} = \frac{c}{\psi(a, b)} \dots$$

che dà un arco in funzione del suo coseno. In questa identità il segno di c è indifferente, e per $\text{arc cos } \frac{a}{b}$ s'intende un arco il cui valore assoluto non supera un angolo piatto.

Sia dapprima $b > 0$; quando a, b tendono ad uno stesso limite t la frazione $\frac{a}{b}$ tende ad 1, l'arc cos $\frac{a}{b}$ tende a zero e perciò il rap-

porto fra il suo seno $\sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$, e l'arco stesso $\frac{\sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}}$ tende ad 1

e perciò

$$b \frac{\sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}} = \frac{c}{\text{arc cos } \frac{a}{b}}$$

tende precisamente a t . In altre parole: se noi possiamo far sì che a, b differiscano da un numero t di una quantità piccola ad arbitrio, lo

stesso accadrà di $\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}}$.

Se in questa frazione pongo ora in luogo di a e di b rispettivamente a_1 e b_1 , essa diventa

$$\frac{\sqrt{b_1^2 - a_1^2}}{\text{arc cos } \frac{a_1}{b_1}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a+b}{2\sqrt{b \frac{a+b}{2}}}} = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{2 \text{ arc cos } \sqrt{\frac{a+b}{2b}}};$$

ma se $\cos y = \frac{a}{b}$, $\cos \frac{1}{2} y = \sqrt{\frac{a+b}{2b}}$; quindi

$$\text{arc cos } \frac{a}{b} = 2 \text{ arc cos } \sqrt{\frac{a+b}{2b}}$$

e quindi

$$\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{b_1^2 - a_1^2}}{\text{arc cos } \frac{a_1}{b_1}}$$

Nell'identico modo si prova

$$\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{b_1^2 - a_1^2}}{\text{arc cos } \frac{a_1}{b_1}} = \frac{\sqrt{b_2^2 - a_2^2}}{\text{arc cos } \frac{a_2}{b_2}} = \dots \dots \frac{\sqrt{b_n^2 - a_n^2}}{\text{arc cos } \frac{a_n}{b_n}} = \dots \dots$$

Ma coll'ingrandire abbastanza n posso fare sì che a_n e b_n differiscano da $\psi(a, b)$ di una quantità piccola ad arbitrio; lo stesso, per il già

detto, accadrà di $\frac{\sqrt{b_n^2 - a_n^2}}{\text{arc cos } \frac{a_n}{b_n}}$, ma questa frazione è eguale a $\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}}$

quindi la differenza fra $\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\text{arc cos } \frac{a}{b}}$, e $\psi(a, b)$ è minore di qualsiasi quan-

tità arbitraria ε , ossia (ricordando che $c = \sqrt{a^2 - b^2}$).

$$\frac{c}{\text{arc cos } \frac{a}{b}} = \psi(a, b)$$

e la (3) è dimostrata. Il segno dato a c è indifferente, perchè archi differenti solo per il segno hanno uguali coseni.

Se $b < 0$ si ha: $-b > 0$ e per il caso precedente

$\text{arc cos } \frac{a}{b} = \text{arc cos } \frac{-a}{-b} = \frac{c}{\psi(-a, -b)} = -\frac{c}{\psi(a, b)}$ e la (4) è ancor vera, sia perchè il segno meno si può anche dare a c , sia perchè, come ora si fece notare,

$$\cos\left(-\text{arc cos } \frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b}.$$

Al lettore poi che chiedesse per qual ragione tra i valori di $\text{arc cos } \frac{a}{b}$ la (3) ce ne dia uno minore di π in valore assoluto, ricorderò che per la dimostrazione si usò la proprietà, che $\text{arc cos } \frac{a}{b}$ tende a zero per a, b tendente ad uno stesso valore t e che per $b > 0$ abbiamo supposto, come si vede dal corso della dimostrazione che la metà, il quarto, l'ottavo ecc. del nostro arco abbiano positivo il coseno.

Sia p. es. da trovarsi $x = \text{arc cos } \frac{3}{5}$ coll'approssimazione di 2:100000.

Si avrà

| | |
|------------------|------------------|
| $a = 3$ | $b = 5$ |
| $a_1 = 4$ | $b_1 = 4,47214$ |
| $a_2 = 4,23607$ | $b_2 = 4,352500$ |
| $a_3 = 4,294283$ | $b_3 = 4,32329$ |

per il secondo lemma $\psi(a, b) = \psi(3, 5)$ è compreso tra $b_2 - \frac{1}{3}(b_2 - b_3)$ e $\frac{1}{3}(a_3 + 2b_3)$ cioè tra 4,31355 e 4,313621 e per la (4) l'arc cos $\frac{3}{5}$ è compreso tra 0,92729 e 0,92731; la media aritmetica dei due ultimi numeri cioè 0,92730 è il valore cercato; valore ottenuto con la ricerca di tre medie geometriche, una divisione (facilmente esigibili coi logaritmi) ed altre poche semplicissime operazioni.

L'ampiezza dell'arco x è $9273 : 174,533 = 53^{\circ}, 7', 49''$, essendo $0,0174532925\dots$ la lunghezza dell'arco di 1° .

3. - PROBLEMA. — *Trovare arc sen $\frac{a}{b}$ per a, b positivi.*

Essendo $a^2 + c^2 = b^2$, si ha

$$\text{arc sen } \frac{a}{b} = \text{arc cos } \frac{c}{b} = \psi(c, b).$$

Così per es.

$$(4) \quad \text{arc sen } \frac{4}{5} = \text{arc cos } \frac{3}{5} = \psi(3, 5) = 0,92730 = 53^{\circ} 7' 49''.$$

Similmente si troverebbero arc tg $\frac{a}{b}$, ecc.

4. - PROBLEMA. — *Dedurre dalle precedenti formule il teorema di Schwab.* Questo elegantissimo teorema non è che un caso particolare della (3). Poniamo nella (3) $a = 0$ (si noti che non si può porre $b = 0$ perchè per ipotesi $|b| > |a|$) ed otteniamo $\frac{1}{\pi} = \frac{1}{2b} \psi(0, b)$, che per $b = \frac{1}{2}$ ci dice appunto

$$\frac{1}{\pi} = \psi\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

5. - TEOREMA. — *Se a, b, c sono tre numeri positivi tali che $a^2 + c^2 = b^2$, hanno luogo le identità:*

$$(5) \quad \frac{c}{\psi(a, b)} + \frac{a}{\psi(c, b)} = \frac{\pi}{2} \dots\dots$$

$$(6) \quad \frac{1}{\psi(a, b)} + \frac{1}{\psi(-a, b)} = \frac{\pi}{c} \dots\dots$$

$$(7) \quad \frac{c}{\psi(-a, b)} - \frac{a}{\psi(c, b)} = \frac{\pi}{2} \dots\dots$$

La (5) si ottiene sostituendo in arc cos $\frac{a}{b} + \text{arc sen } \frac{a}{b} = \frac{\pi}{2}$ i valori che per arc cos $\frac{a}{b}$ e per arc sen $\frac{a}{b}$ ci danno la (3) e la (4).

La (6) si dimostra sostituendo in arc cos $\frac{a}{b} + \text{arc cos } \frac{-a}{b} = \pi$ i valori che per arc cos $\frac{a}{b}$ e per arc cos $\frac{-a}{b}$ ci dà la (3) e dividendo per c .

La (7) risulta dall'eliminazione di $\psi(a, b)$ tra la (5) e la (6).

Tutte queste identità sono molto più generali del teorema di Schwab, che ne è un particolarissimo caso.

II. — Definizione elementare delle funzioni iperboliche.

6. - Se a, b sono positivi, ma $a > b$ si riconosce facilmente, anche in questo caso, l'esistenza di $\psi(a, b)$; la (3) diventa in tale caso

$\text{arc cos } \frac{a}{b} = i \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{\psi(a, b)}$, ed è naturale il definire

$$(8) \quad \text{arc cosh } \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{\psi(a, b)} \dots\dots$$

Nello stesso modo s'introdurrebbero le altre funzioni iperboliche. La (8) e le formule analoghe facilmente scopribili ci possono servire a calcolarne i valori e trovarne, come si dirà più avanti, le proprietà; ecco ora un esempio semplicissimo del modo, con cui queste si potrebbero studiare. Per definizione del limite $\psi(a, b)$ si ha

$$\psi(a, b) = \psi(a_1, b_1) = \psi\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{b \cdot \frac{a+b}{2}}\right).$$

Sostituendo per il primo ed il terzo membro di queste identità i loro valori dati dalla (8) si ottiene la nota proprietà

$$\text{arc cosh } \frac{a}{b} = \text{arc cosh } \sqrt{\frac{a+b}{2b}}.$$

III. — Funzione logaritmica.

7. - LEMMA. — Quando x tende ad 1 la frazione $\frac{x-1}{\log x}$ tende ad un limite.

Questa proprietà è notissima, ma voglio stabilirne qui una elegantissima dimostrazione.

Posto $y = \log x$, per $y > 0$ la frazione $\frac{x-1}{\log x} = \frac{10^y - 1}{y}$ è sempre positiva; basta quindi provare che essa diminuisce con y per dimostrare che tende ad un limite.

Moltiplichiamo y per la frazione $\frac{h}{k}$ minore di 1 ed a termini interi.

Ponendo $y_1 = \frac{y}{k} = \log x_1$ ed $y_2 = \frac{h}{k}y = hy_1 = \log x_2$ otteniamo poichè $x = x_1^k$

$$(9) \quad \frac{y}{10^y - 1} = \frac{x - 1}{\log x} = \frac{x_1^{k-1} + x_1^{k-2} + \dots + x_1 + 1}{k} \cdot \frac{x_1 - 1}{\log x_1} \dots\dots$$

e poichè $x_2 = x_1^h$

$$(\gamma) \quad \frac{10^{y_2} - 1}{y_2} = \frac{x_2 - 1}{\log x_2} = \frac{x_1^{h-1} + x_1^{h-2} + \dots + x_1 + 1}{h} \cdot \frac{x_1 - 1}{\log x_1} \dots$$

Ma essendo $x_1 > 1$, la frazione $\frac{x_1^{m-1} + x_1^{m-2} + \dots + 1}{m}$ con m intero aumenta, se si accresce m di una unità, perchè

$$\begin{aligned} \frac{x_1^m + \dots + 1}{m+1} - \frac{x_1^{m-1} + \dots + 1}{m} &= \frac{m x_1^m - x_1^{m-1} - \dots - 1}{m(m+1)} = \\ &= \frac{(x_1^m - x_1^{m-1}) + \dots + (x_1^m - 1)}{m(m+1)} > 0, \end{aligned}$$

ed aumenta a fortiori anche se si accresce m di più unità. Quindi, essendo $k > h$, si ha

$$\frac{x_1^{k-1} + x_1^{k-2} + \dots + x_1 + 1}{k} > \frac{x_1^{h-1} + x_1^{h-2} + \dots + x_1 + 1}{h},$$

ed in virtù delle (β) e (γ) la $\frac{10^y - 1}{y}$ è diminuita moltiplicando y per la $\frac{h}{k} > 1$.

Coi metodi con cui si trattano ora i numeri irrazionali si dimostra che ciò avviene anche se $\frac{h}{k}$ è irrazionale.

8. - TEOREMA. — Se a, b sono rispettivamente la media aritmetica e la media geometrica dei due numeri a_0 e b_0 , esiste l'identità

$$(9) \quad \log \frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{b_0} \frac{a_0 - b_0}{\phi(a, b)} \dots$$

dove $\frac{1}{q}$ è una costante per un medesimo sistema di logaritmi.

Per dimostrare la (9) seguiremo la stessa via tenuta per dimostrare la (3). Quando a e b tendono ad un medesimo limite t , i numeri a_n e b_n tendono pure allo stesso limite t , la frazione $\frac{a_n}{b_n}$ tende ad 1 e la frazione

$$\frac{a_n - b_n}{\log \frac{a_n}{b_n}} = b_0 \frac{\frac{a_n}{b_n} - 1}{\log \frac{a_n}{b_n}}$$

tende quindi al numero t moltiplicato per il limite q di $\frac{x-1}{\log x}$ quando x tende ad 1.

In altre parole: Se si possono rendere a e b tanto poco differenti, quanto si vuole, da un numero t , la frazione $\varphi = \frac{a_0 - b_0}{\log \frac{a_0}{b_0}}$ differisce di quanto poco si vuole da qt .

Di più, se nella φ poniamo in luogo di a, b rispettivamente a_1 e b_1 , essa diventa (essendo $a_0 = a + \sqrt{a^2 - b^2}$, $b_0 = a - \sqrt{a^2 - b^2}$, $a_1 = \frac{a+b}{2}$, $b_1 = \sqrt{ba_1}$).

$$\frac{2 \sqrt{a^2 - b^2}}{2 \log \frac{a+b+\sqrt{a^2-b^2}}{a+b-\sqrt{a^2-b^2}}} = \frac{2 \sqrt{a^2 - b^2}}{\log \left(\frac{a+b+\sqrt{a^2-b^2}}{a+b-\sqrt{a^2-b^2}} \right)^2} = \frac{a_0 - b_0}{\log \frac{a_0}{b_0}},$$

e la frazione φ non è cambiata per effetto di questa sostituzione, e non muterà quindi di valore neppure se in luogo di a, b porrò a_2, b_2 , ecc. ecc.

Ma coll'ingrandire abbastanza n posso fare sì che a_n, b_n differiscano da $\psi(a, b)$ di una quantità piccola ad arbitrio; $q \cdot \psi(a, b)$, per il già detto, differirà di quanto poco si vuole da φ , dove in luogo di a, b si sono posti rispettivamente a_n, b_n ; ma questa sostituzione, si dimostrò testè, non cambia il valore della φ , quindi la differenza fra φ e $q \cdot \psi(a, b)$ è minore di qualsivoglia numero arbitrario ϵ , e perciò

$$\varphi = q \cdot \psi(a, b)$$

e da questa eguaglianza si deduce la (9).

Così la $\psi(a, b)$ per $a > b$ (che già ci servì per lo studio delle funzioni iperboliche) serve pure per le funzioni logaritmiche.

Anche in questo caso il secondo lemma del § 1 riesce di massima utilità nei calcoli numerici; per la sua dimostrazione in questo caso, in cui $a > b$, basta in tutte le disuguaglianze del *Traité de Géométrie* sopracitato che servirono alla dimostrazione del secondo lemma nel caso di $a < b$, sostituire al segno $<$ il segno $>$ e viceversa. Si noti

pure che anche $\sqrt[3]{\frac{1}{2} a_m b_m (a_m + b_m)}$ è un valore approssimato di $\psi(a, b)$; questo radicale è il limite, a cui si tende particolare da a_{m+1}, b_{m+1} con successive medie geometriche.

IV. — Definizione elementare dei logaritmi neperiani.

9. - La (9) serve a trovare i logaritmi dei numeri di qualunque sistema, basta perciò (per un noto teorema di algebra elementare) far

variare la quantità q ; il più naturale dei sistemi di logaritmi è quello corrispondente a $q = 1$, la cui base indicherò provvisoriamente con z .

TEOREMA. — *I logaritmi corrispondenti a $q = 1$ sono i logaritmi neperiani.*

Infatti poichè $\log_z \frac{a}{b} = \frac{a_0 - b_0}{\psi(a, b)}$, la (9) si può scrivere

$$\log_{10} \frac{a_0}{b_0} = \frac{1}{q} \log_z \frac{a_0}{b_0},$$

ma d'altra parte

$$\log_{10} \frac{a_0}{b_0} = \log_{10} z \cdot \log_z \frac{a_0}{b_0}$$

quindi

$$\frac{1}{q} = \log_{10} z; \quad q = \lim_{v=0} \frac{10^v - 1}{v} = \log_z 10$$

e perciò $z = e = 2,718 \dots$ base dei logaritmi neperiani come v. d.

Si possono quindi definire elementarmente i logaritmi neperiani dall'uguaglianza

$$(10) \quad \log \frac{a_0}{b_0} = \frac{a_0 - b_0}{\psi(a, b)}$$

è dedurre poi in modo assai semplice il logaritmo neperiano di un numero p eguaglia $\lim_{v=0} \frac{p^v - 1}{v}$ e che la base dei logaritmi neperiani è $\lim_{y=0} (1 + y)^{\frac{1}{y}}$.

Esempio. — Trovare $\log_e 7$.

Nel nostro caso

| | |
|--------------------|-------------------|
| $a_0 = 7$ | $b_0 = 1$ |
| $a = 4$ | $b = 2,645751$ |
| $a_1 = 3,3228755$ | $b_1 = 2,965046$ |
| $a_2 = 3,14396075$ | $b_2 = 3,0531931$ |
| $a_3 = 3,0985769$ | $b_3 = 3,0758$ |
| $a_4 = 3,087188$ | $b_4 = 3,08149$ |

Per il secondo lemma $\psi(a, b)$ è compreso tra $\frac{1}{3}(a_1 + 2b_1)$ e $b_4 + \frac{1}{3}(b_4 - b_3)$, cioè il suo valore approssimato è 3,083389. Per la (10) si ha che $\log_e 7 = 1,9459101485 \dots$ e l'errore è minore di $6 : 10^{10}$; a questo risultato si giunge con la ricerca di sole quattro medie geometriche.

V. — Osservazioni e conclusione.

Ecco dunque dimostrato e generalizzato in più modi nelle (5), (6), (7) il teorema di Schwab e col mezzo della sola funzione $\psi(a, b)$ espresse tutte le funzioni trascendenti elementari e definite elementarmente alcune (funzioni iperboliche e logaritmi neperiani), il cui vero significato manca nei testi elementari. Questo fatto di essere tutte queste funzioni esprimibili mediante una sola funzione a variabili reali è un fatto capitale e credo nuovo; le loro molteplici relazioni sono facilmente dimostrabili col mezzo delle (3), (8), (9), (10); le loro proprietà si riducono tutte a proprietà della $\psi(a, b)$ con $a < b$ oppure con $a > b$: dimostrate queste proprietà per $a < b$ con la (3), per $a > b$ con le (9) ed (10) si possono, come avevamo promesso, trovare le proprietà delle funzioni iperboliche mediante la (8); ammesse queste ultime come naturale estensione delle proprietà delle funzioni circolari si ottiene dalla (11) un nuovo metodo per trattare la teoria dei logaritmi. Ma a tutto questo basta avere accennato, notando che queste proprietà di $\psi(a, b)$ possono riuscire preziose nei calcoli numerici di questo limite e cooperare col secondo lemma del § I per una sufficientemente rapida approssimazione. La $\psi(a, b)$ ha pure una notevole importanza pratica perchè offre un mezzo completo ed elementarmente dimostrabile, (il che fin ora, credo, mancava affatto) di calcolare le tavole trigonometriche e logaritmiche: specialmente le prime, quando si usino le tavole dei logaritmi.

Venezia, 10 ottobre 1897.

GUIDO FUBINI

studente nella R. Scuola Normale sup. di Pisa.

SUL SIGNIFICATO DI UNA NOTA ESPRESSIONE ARITMETICA

Nei diversi trattati che si adottano nelle scuole non è stato fino ad oggi ben definito il significato da darsi ad un'espressione della forma:

$$(1) \quad a : b : c : d;$$

è quindi naturale che alcuni insegnanti si attengano al primo, altri al secondo dei due possibili modi d'interpretazione.

Questi due modi d'interpettazione sono, com'è noto, i due seguenti:

$$\begin{aligned} (\alpha) \quad & a : b : c : d = [(a : b) : c] : d, \\ (\beta) \quad & a : b : c : d = a : [b : (c : d)]; \end{aligned}$$

ed essendo alcuni abituati a dare all'espressione considerata il significato (α) , altri il significato (β) , ne nasce una deplorabile confusione nella scrittura e nell'interpettazione delle formole.

Questa confusione può togliersi facendo uso costantemente delle parentesi, ma ciò non mi sembra nè bello nè utile dal momento che tutte le espressioni analoghe:

$$\begin{aligned} a + b + c + d, \\ a - b - c - d, \\ a \times b \times c \times d, \end{aligned}$$

hanno un significato fisso e determinato senza bisogno di alcuna parentesi. Perchè la divisione dovrebbe fare eccezione?

Secondo il mio debole parere, sarebbe opportuno stabilire una volta per tutte il significato da darsi all'espressione (1) perchè in matematica, più che in ogni altra scienza, è necessario *uniformità e precisione* di scrittura e di linguaggio.

Io non pretendo di risolvere la questione, mi limito semplicemente ad esporre la mia opinione affinchè altri esponga la sua e si possa così togliere un'ambiguità dannosa sia alla scienza che alla didattica.

Se vogliamo intanto che la *dualità* esistente fra le 2 operazioni inverse di 1^a e 2^a specie (vedi mie *lezioni di Aritmetica teorica*, cap. V) non soffra in nessun caso eccezioni dovremo adottare l'interpettazione (α) perchè per la sottrazione si ha:

$$a - b - c - d = ([a - b] - c) - d,$$

quindi cambiando il segno $-$ nel segno corrispondente dell'operazione correlativa, si ha:

$$a : b : c : d = ([a : b] : c) : d.$$

Inoltre, se osserviamo che:

$$a - b - c - d = a - (b + c + d),$$

se vogliamo che la dualità accennata sussista ancora, dovremo cambiare i segni $-$, $+$ nei segni delle due corrispondenti operazioni e avremo

$$a : b : c : d = a : (b \times c \times d),$$

e siccome per un noto teorema:

$$a : (bcd) = ([a : b] : c) : d;$$

siamo di nuovo condotti a dovere accettare l'interpettazione (α) .

Infine se ricordiamo che dividere per un numero significa moltiplicare per il suo inverso, avremo:

$$a : b : c : d = a \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{d} = \frac{a}{bcd}$$

che ci conduce pure alla interpretazione (α); mentre se si adottasse la 2^a interpretazione l'applicazione del teorema citato all'espressione:

$$a : b : c : d,$$

ne farebbe mutare il significato.

È bene anche osservare che adottando la 1^a interpretazione si può enunciare il correlativo del teorema sul valore dei polinomi algebrici, o cioè:

In un'espressione costituita di termini separati fra loro dai segni delle operazioni di 2^a specie, (\times :) [espressione monomia] per avere il valore basta fare il quoziente del prodotto dei termini preceduti dal segno \times e del prodotto dei termini preceduti dal segno :

In favore della seconda interpretazione si può dire che scrivendo l'espressione (1) col segno di divisione rappresentato da una linea orizzontale, si avrebbe:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

e che quindi sarebbe logico anche dividere b per la frazione $\frac{c}{d}$ e poi dividere a per il risultato.

Ma si può rispondere che il segno di frazione ha un significato in questo caso indeterminato, perchè, per averlo determinato, bisognerebbe scrivere in uno dei modi seguenti:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \quad \left[\frac{a}{\frac{b}{\left(\frac{c}{d}\right)}} \right] \quad \left[\frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{\frac{c}{d}} \right] \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

i quali conducono, come si vede, all'uno o all'altro dei due citati modi d'interpretazione.

AROLDO MARTINI ZUCCAGNI.

Per una dimostrazione elementare

La dimostrazione data a pag. 140 del numero precedente (Sett.-Ott.) di questo Periodico è tutt'altro che elementare, relativamente a quella che si suol dare, e che sostanzialmente è questa.

In conseguenza delle (1) è identicamente

$$(x - x_1) \dots (x - x_n) = (x - y_1) \dots (x - y_n);$$

per cui i numeri x_1, \dots, x_n debbono essere uguali ai numeri y_1, \dots, y_n indipendentemente dall'ordine.

Questa semplicissima dimostrazione può certamente darsi in una teoria delle equazioni, dove si suppone conosciuto il calcolo letterale con la relativa teoria della scomposizione dei polinomi in fattori primi. Siccome però sono ancora parecchi i libri d'Algebra incompleti o poco rigorosi, così richiamerò le nozioni, che l'esposta dimostrazione presuppone, e delle quali si ha bisogno appena si principia il calcolo letterale, per poterne insegnare le prime operazioni con vero rigore, e senza ambiguità.

Osservo anzitutto che, se a_0, a_1, \dots, a_n sono numeri dati ed a_0 non è nullo,

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

è diverso da zero per infiniti valori di x . È infatti sicuramente

$$|a_0x^n| > |a_1x^{n-1} + \dots + a_n|,$$

per cui è anche

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0,$$

se $|x|$ supera il maggiore dei due numeri

$$1, (|a_1| + \dots + |a_n|) : |a_0|.$$

Di qui segue che, se b_0, b_1, \dots, b_n son numeri dati, dei quali potrebbe esser nullo anche b_0 , e non sono tutte nulle le differenze $a_0 - b_0, a_1 - b_1, \dots, a_n - b_n$, sono allora diversi per infiniti valori di x così i due polinomi

$$a_0x^n + \dots + a_n, \quad b_0x^n + \dots + b_n$$

come pure i loro prodotti per $x - x_1, x_1$ essendo un qualsiasi numero dato.

Queste nozioni, che sono già necessarie per stabilire con precisione il significato di uguaglianza di due polinomi, bastano per giustificare l'esposta dimostrazione di poche parole, la quale, negli elementi d'Algebra, si potrebbe sviluppare così.

Il prodotto $(x - y_1) \dots (x - y_n)$, essendo uguale ad $(x - x_1) \dots (x - x_n)$, si deve annullare per $x = x_1$, e ciò esige che uno dei numeri y_1, \dots, y_n sia uguale ad x_1 ; sia p. es.:

$$y_1 = x_1.$$

Saranno uguali i due prodotti

$$(x - x_2) \dots (x - x_n), \quad (x - y_2) \dots (x - y_n),$$

cioè saranno identici i due polinomi in x ad essi equivalenti, perchè, se non fossero tali, non sarebbero uguali neppure i loro prodotti per $x - x_1$, che sono invece uguali, essendo essi

$$(x - x_1) \dots (x - x_n), \quad (x - y_1) \dots (x - y_n).$$

Essendo

$$(x - x_2) \dots (x - x_n) = (x - y_2) \dots (x - y_n),$$

deve essere x_2 eguale ad uno dei numeri y_2, \dots, y_n ; se per es. è

$$x_2 = y_2,$$

deve ancor essere

$$(x - x_1) \dots (x - x_n) = (x - y_1) \dots (x - y_n).$$

Continuando, così concludesi appunto che i numeri x_1, \dots, x_n debbono essere uguali ai numeri y_1, \dots, y_n indipendentemente dall'ordine.

F. GIUDICE.

SOPRA UN NUOVO MODO DI DEFINIRE LE RADICI PRIMITIVE di una congruenza

È noto che le radici primitive relative al modulo p , o le radici primitive della congruenza

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

sono quei numeri che appartengono, secondo il modulo p , all'esponente $p-1$; o in altri termini: a è radice primitiva relativamente al modulo p , se per qualsivoglia valore $v < p-1$, è a^v incongruo all'unità, secondo il modulo p .

Orbene, è facile dare per queste radici una nuova definizione, che si può anche riguardare come un corollario di un notissimo teorema. Si ha infatti: (*)

Essendo p primo, e θ un divisore di $p-1$, sieno x_1 e ξ due numeri compresi fra θ e p ; se si ha

$$x_1^\theta \equiv \xi \pmod{p},$$

si ha anche:

$$\xi^{\frac{p-1}{\theta}} \equiv 1 \pmod{p};$$

e reciprocamente, se si ha

$$\xi^{\frac{p-1}{\theta}} \equiv 1 \pmod{p},$$

la congruenza

$$x^\theta \equiv \xi \pmod{p}$$

ha θ radici.

Ora, l'ipotesi

$$x_1^\theta \equiv \xi \pmod{p}$$

equivale evidentemente a quest'altra

$$\xi = kp + x_1^\theta;$$

e il dire che la congruenza

$$x^\theta \equiv \xi \pmod{p}$$

(*) Vedi J. A. SERRET, *Cours d'Algèbre supérieure*. T. II, pag. 64.

ha θ radici, è lo stesso che dire che esistono θ numeri, tali che messi al posto di x , nella

$$\xi = kp + x^\theta,$$

la soddisfano; dunque si ha questa nuova forma per il precedente.

TEOREMA. — *La condizione necessaria e sufficiente affinché si possa determinare un esponente $v < p - 1$, tale che la congruenza*

$$\xi^v \equiv 1 \pmod{p}$$

sia soddisfatta, è che sia possibile scomporre il numero ξ nella somma $kp + x^\theta$.

È evidente dopo ciò che ogni numero scomponibile nella somma $kp + x^\theta$ non potrà essere radice primitiva relativamente al modulo p ; per conseguenza potremo dire che:

Un numero ξ è radice primitiva relativamente al modulo p , se non è possibile la decomposizione

$$\xi = kp + x^\theta,$$

dove k è un numero intero, x primo con p , e θ un divisore di $p - 1$ diverso dall'unità.

Consideriamo per es. la congruenza

$$\xi^4 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Essa ammette 4 radici, che sono i numeri 1, 2, 3, 4: di questi due soltanto appartengono all'esponente 4, ossia sono radici primitive: il 2 e il 3. In conseguenza sarà impossibile porre il 2 e il 3 sotto la forma

$$kp + x^\theta;$$

e poichè si ha $\theta = 4$ oppure $\theta = 2$, sotto una delle forme

$$5k + x^4 \quad ; \quad 5k + x^2.$$

È facile verificarlo: infatti, essendo x primo con 5, sarà di una delle forme:

$$5n + 1, \quad 5n + 2, \quad 5n + 3, \quad 5n + 4.$$

Ma se supponiamo che x sia della 1^a forma o della 4^a, x^2 e x^4 saranno della forma $5n + 1$; e se supponiamo che x sia della 2^a forma o della 3^a, x^2 e x^4 saranno della forma $5n + 4$; dunque le due espressioni

$$5k + x^4 \quad \text{e} \quad 5k + x^2$$

sono impossibili per i numeri 2 e 3.

Resta poi ancora dimostrato che sotto tale forma possono mettersi i numeri 1 e 4, che non sono radici primitive.

Da ultimo si può osservare che, messo sotto la nuova forma, il teorema che ho ricordato, è suscettibile di una lieve estensione: infatti per poter determinare un esponente $v < p - 1$, tale che $\xi^v \equiv 1 \pmod{p}$, nel caso che $\frac{p-1}{\theta} =$ numero pari e k positivo, basta che sia, essendo $x > 0$, $\xi = kp - x^\theta$; e che dal teorema stesso segue ancora il

COROLLARIO. — Se θ è il più grande divisore di $p - 1$, che soddisfa la relazione

$$\xi = kp + x^\theta,$$

nella quale x è primo con p , (p primo e k un numero intero), sarà $\frac{p-1}{\theta} =$ al minimo valore di v che soddisfa alla congruenza

$$\xi^v \equiv 1 \pmod{p}.$$

Genova, 25 Gennaio 1897.

G. Musso.

SULLE DEFINIZIONI DI EQUAZIONE E DI SISTEMA DI EQUAZIONI

1. Alcuni autori⁽¹⁾ danno la definizione seguente: *equazione è un'eguaglianza che non è verificata se non per certi valori delle lettere che si trovano nei termini dell'eguaglianza.* — Altri⁽²⁾ danno quest'altra: *si chiama equazione un'eguaglianza la quale non è soddisfatta per qualunque valore delle lettere che in essa compariscono.*

Varie obiezioni possono esser mosse contro queste definizioni. Anzitutto si può osservare che non v'è regola generale per stabilire se una data eguaglianza sia soddisfatta soltanto da particolari valori delle lettere, o se non sia soddisfatta da tutti i valori delle lettere contenutevi;⁽³⁾ e quindi, volendo seguire l'una o l'altra delle suddette definizioni, si urta contro la difficoltà di decidere se ad una data eguaglianza spetti il nome di equazione. Allorquando poi la difficoltà si sapia superare, il nome di equazione non potrebbe esser dato che in ultimo, quando cioè non vi sia alcun dubbio sulla specie dell'eguaglianza di cui si tratta. — D'altra parte, le suddette definizioni corrispondono esse nel modo il più esatto a ciò che in pratica s'intende ordinariamente colla parola equazione? Secondo le definizioni stesse, l'equazione apparisce come il contrapposto della identità,⁽⁴⁾ ma se si va a sfogliare i nostri libri di testo si vedrà che quasi tutti gli autori conservano il nome di equazione anche all'eguaglianza identica. Così ARZELÀ,⁽⁵⁾ discutendo la formula di risoluzione dell'equazione:

$$ax + b = a'x + b',$$

dice che se $a - a' = 0, b - b' = 0$, ogni valore che si possa pensare per la x soddisfa all'equazione; AMANZIO⁽⁶⁾ dice che se $P = 0, Q = 0$, l'equazione:

$$Px = Q$$

(1) BELLACCHI, *Lezioni ed esercizi d'algebra*, V. II, P. II, Firenze, Barbera 1891, pag. 2; BERTRAND, *Traité d'algebre*, Paris, Hachette 1879, V. I, pag. 81; FAIFOPFER, *Algebra*, Venezia, tip. Emiliana 1895, pag. 109; VISALLI e MANDÉS, *Algebra*, Livorno, Giusti 1893, pag. 104; GIULIANI, *Algebra*, Torino, Loescher, pag. 29, ecc.

(2) CUNEO e POGGI, *Algebra*, Torino, Paravia 1895, pag. 96; MORENO, *Algebra*, Napoli, Pellerano 1887, pag. 116; TESTI, *Corso di Matematiche*, VII, Livorno, Giusti, pag. 314; GARBINARI, *Algebra*, Padova, Sacchetto 1896, pag. 106; AMANZIO, *Algebra*, Napoli, Pellerano 1882, pag. 242; ecc.

(3) V. per es. GAZZANIGA, *Libro d'aritmetica e d'algebra elementare*, Padova, Sacchetto 1896, pag. 220.

(4) Su questo punto insistono infatti quasi tutti gli autori. V. per es. ARZELÀ, *Algebra elementare*, Firenze, Le Monnier 1890, pag. 163; TESTI, *o. c.* pag. 313; FAIFOPFER, *o. c.* pag. 108; ecc.

(5) *o. c.* pag. 187.

(6) *o. c.* pag. 258.

si riduce alla identità $0 = 0$, e perciò essa stessa è un'identità; BERTRAND⁽¹⁾ dice che l'equazione

$$ax + b = ax + b$$

è soddisfatta qualunque sia x ; ecc. ecc. Insomma da tutti si adopera, anche nel caso considerato la parola *equazione* invece dell'altra *identità*, e ciò contrariamente alla definizione data. Egli è che, con ragione, si trova conveniente di dare alla parola equazione un senso più esteso di quello espresso dalle definizioni suddette. Si può infine aggiungere che, secondo la prima definizione, una eguaglianza come ad es. la seguente:

$$3x + 4 = 3x + 7$$

non potrebbe meritare il nome di equazione, giacchè essa non è verificata da nessun valore, mentre, secondo la definizione stessa, sembrerebbe necessario che, per meritare il nome di equazione, l'eguaglianza dovesse essere soddisfatta da un valore almeno. Limitandosi ai numeri reali, come fanno parecchi autori, neppure si potrebbe chiamare equazione, secondo la prima definizione, un'eguaglianza della forma $x^{2n} = a$, dove a è un numero negativo, appunto perchè anche questa uguaglianza non sarebbe soddisfatta da nessun valore. Tuttavia, gli autori che seguono la prima definizione, conservano anche in questi casi il nome di equazione. P. es.

FALFOFFER⁽²⁾ dice che se $a = a'$, $b > b'$, l'equazione:

$$ax + b = a'x + b'$$

non ammette nessuna soluzione. Lo stesso autore,⁽³⁾ considerando l'equazione di 2.º grado:

$$x^2 + px + q = 0,$$

dice che se $p^2 - 4q < 0$, l'equazione non ha soluzioni.⁽⁴⁾

2. È bene quindi di vedere come deve esser posta la definizione di equazione, se si vuole che contro di essa non si possano muovere le obiezioni suddette, o altre che sieno. A me pare che si potrebbe, a tal uopo, precedere nell'insegnamento come segue.

Con opportuni esempi, si comincerà col fare osservare che, date due espressioni algebriche qualsivogliano,⁽⁵⁾ possono darsi i casi seguenti: 1º esse assumono valori uguali soltanto per alcuni valori delle lettere; (2º) 2º assumono valori disuguali per tutti i valori delle lettere; 3º assumono valori uguali per tutti i valori delle lettere. — Si dirà poi che, nell'intento di scoprire quale di questi tre casi abbia luogo quando sono date due espressioni algebriche qualsivogliano, si comincia col frapporre a queste il segno =, chiamando *equazione* la scrittura che si ottiene. Cosicché si potrebbe dare la definizione che segue:

(1) o. c. VI, pag. 153.

(2) o. c. pag. 133.

(3) o. c. pag. 259.

(4) V. anche VISALLI e MANDER, o. c. pag. 173; BERTRAND, o. c. pag. 153; BELLACCHI, o. c. pag. 16.

(5) Le due espressioni potrebbero anche essere l'una aritmetica e l'altra algebrica. — Sul senso dato qui alle espressioni aritmetiche e algebriche e ai valori delle medesime, si legga GAZZANIGA, o. c. pag. 191, 192.

(6) In quanto all'eguaglianza, o meno, delle due espressioni algebriche per il caso in cui per qualche valore delle lettere esse assumono valori infiniti, si veggia quanto ottimamente dice in proposito AMANZO, o. c. pag. 385 e seg.

Equazione è l'eguaglianza fatta tra due espressioni algebriche nell'intento di scoprire se esistono o no valori delle lettere per i quali le due espressioni algebriche acquistano valori uguali e di trovare tutti i detti valori nel caso che esistano. (1)

3. Passando ai sistemi di equazioni, trovo che alcuni autori (2) pongono la definizione: *si chiama sistema di equazioni un insieme di equazioni che debbono essere soddisfatte dai medesimi valori delle incognite; mentre altri (3) danno l'altra poco differente: si dice sistema di equazioni un insieme di equazioni che sono soddisfatte dagli stessi valori delle incognite.*

Contro queste definizioni possono pure essere mosse alcune obiezioni. Anzitutto si può osservare che anche qui si urta contro la difficoltà di decidere se ad un insieme di equazioni spetti il nome di *sistema*. Quando poi questa difficoltà si sappia superare, il nome di sistema non potrebbe esser dato che in ultimo. Inoltre le dette definizioni non corrispondono esattamente a ciò che in pratica s'intende ordinariamente per *sistema* di equazioni. Seguendo le definizioni stesse, sembrerebbe che il nome di sistema non si potesse dare ai complessi di equazioni che non sono soddisfatte dagli stessi valori delle incognite, per es. al complesso:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 3x + 4y = 7; \end{cases}$$

tuttavia tutti gli autori citati chiamano sistemi anche i complessi di equazioni incompatibili. Così AMANZIO, (4) considerando il complesso delle due equazioni:

$$\begin{aligned} ax + by &= k \\ a'x + b'y &= k' \end{aligned}$$

nell'ipotesi $ab' - a'b = 0$, dice: in questo caso dunque si deve concludere che il dato sistema non ammette soluzione. (5) GAZZANIGA, (6) scostandosi un po' dagli altri autori, contempla dapprima il caso di due equazioni con due incognite e dice che esse costituiscono un sistema se fra le soluzioni dell'una vi sono anche soluzioni dell'altra; e se vi sono inoltre soluzioni dell'una che non sono anche soluzioni dell'altra equazione. Con ciò sono esclusi tanto i sistemi impossibili, come quelli indeterminati. Benchè l'A. si attenga poi scrupolosamente alla definizione posta, io non credo che sia conveniente in pratica di seguirlo in questa definizione più ristretta. Anche in geometria analitica, per esempio, la parola *sistema* ha un significato più largo di quello attribuitole da GAZZANIGA.

4. A me pare che si potrebbe procedere nell'insegnamento come segue. — Con opportuni esempi si comincerà col fare osservare che, date più equazioni con più incognite, sono possibili i seguenti casi: 1° che le equazioni abbiano soltanto alcune soluzioni comuni; 2° che non abbiano nessuna soluzione comune; 3° che abbiano infinite soluzioni comuni. Si potrà quindi dare la seguente definizione:

(1) AMANZIO, o. c. pag. 291; CUNEO e POGGI, o. c. pag. 136; FAIFOPER, o. c. pag. 163; TESTI, o. c. pag. 371; GARBIBI, o. c. pag. 146; MORENO, o. c. pag. 118; BERTRAND, o. c. pag. 97; ecc.

(2) BELLACCHI, o. c. pag. 67; VISALLI e MANDER, o. c. pag. 204; ecc.

(3) Questa mia nota era preparata fin dall'agosto 1896. Nel frattempo, l'egregio mio amico prof. GAZZANIGA, pubblicando la 2ª edizione del suo ottimo libro di *Aritmetica e di Algebra*, tiene conto delle idee che esprimo in questa nota, idee che avevo sottoposte al suo autorevole parere.

(4) o. c. pag. 304.

(5) Si veggia anche FAIFOPER, o. c. pag. 181; TESTI, o. c. pag. 396; VISALLI e MANDER, o. c. pag. 213; ecc.

(6) o. c. pag. 249 e seg.

Chiamasi sistema di equazioni un complesso di equazioni che si considerano contemporaneamente nell'intento di scoprire se esse hanno o no delle soluzioni comuni, e di trovare tutte queste soluzioni nel caso che esistono.

5. Quanto si è detto relativamente alle equazioni e ai sistemi di equazioni può estendersi alle inequazioni e ai sistemi di inequazioni. TESTI ⁽¹⁾ chiama inequazione (disuguaglianza problematica) una disuguaglianza che sia soddisfatta soltanto quando ai simboli si danno valori maggiori o minori di certi determinati numeri. — VISALLI e MANDES ⁽²⁾ dicono che inequazione è un'ineguaglianza che non è verificata per tutti i valori delle lettere che contiene.

Contro queste definizioni si possono muovere le solite obiezioni, e quindi mi sembra conveniente, anche per seguire una via analoga a quella indicata per le equazioni, di procedere come segue.

Per mezzo di esempi, si comincerà col fare osservare che date due espressioni algebriche qualsivogliano, può darsi che la prima di esse assuma un valore maggiore o minore di quello che assume la seconda: 1° soltanto per particolari valori delle lettere; 2° per nessun valore delle lettere; 3° per tutti i valori delle lettere. Si dirà poi che, nell'intento di scoprire quale di questi tre casi abbia luogo quando sono date due espressioni algebriche qualsivogliano, si comincia col frapporre a queste il segno $>$ o $<$, chiamando inequazione la scrittura che si ottiene. Cosicché si potrà dare la definizione che segue:

Inequazione è una disuguaglianza posta tra due espressioni algebriche nell'intento di scoprire se esistono o no valori delle lettere per i quali una delle due espressioni algebriche acquisti un valore maggiore o minore di quello che assume l'altra, e di trovare tutti i detti valori nel caso che esistono.

Osservazioni analoghe alle precedenti possono essere fatte per i sistemi d'inequazioni.

Fermo, agosto 1896.

CORRADO CIAMBERLINI.

UN TEOREMA SUL TRIANGOLO ⁽³⁾

In ogni triangolo, il rettangolo di un'altezza e del segmento che va dall'ortocentro al lato corrispondente a quella, è equivalente al rettangolo delle proiezioni degli altri due lati sul primo.

Sia ABC un triangolo qualunque; dalla figura risulta che l'angolo B è considerato nei tre casi $B \leq 90^\circ$; sia H l'ortocentro del triangolo e sia D il piede

⁽¹⁾ o. c. pag. 182.

⁽²⁾ o. c. pag. 245.

⁽³⁾ Journ. de Mathématiques élémentaires par H. VUIBERT, ann. 21, n. 7.

dell'altezza partente da B. Osservando allora che i due triangoli AHD, BDC sono simili, si ha

$$\frac{HD}{DC} = \frac{AD}{BD}$$

da cui

$$\overline{HD \cdot BD} = \overline{DC \cdot AD}.$$

Siccome si può ripetere la cosa per gli altri due lati del triangolo ABC il teorema è dimostrato.

APPLICAZIONE I. — Indichiamo gli elementi relativi all'altezza con h_a, h_a'', \dots e quelli relativi al lato con a_1, a_2, \dots . Dal teorema dimostrato si ha

$$h_a h_a'' = a_1 a_2,$$

da cui

$$a_1^2 + a_2^2 + 2h_a h_a'' = a^2,$$

essendo d'altra parte

$$h_b'^2 - h_a''^2 = a_1^2, \quad h_a'^2 - h_a''^2 = a_2^2, \quad (h_a' = h_a - h_a'')$$

sostituendo questi valori di a_1^2, a_2^2 nella precedente si ottiene

$$2h_a h_a'' + h_c'^2 + h_b'^2 = a^2,$$

ed analogamente si trovano le altre eguaglianze

$$2h_b h_b'' + h_c'^2 + h_a'^2 = b^2.$$

$$2h_c h_c'' + h_a'^2 + h_b'^2 = c^2.$$

Da queste si ha

$$(1) \quad 2[h_a h_a'' + h_b h_b'' + h_c h_c'' + h_a'^2 + h_b'^2 + h_c'^2] = a^2 + b^2 + c^2.$$

È noto ora, essendo $H'H''$ incognito, che

$$h_a h_a'' = h_b h_b'' = h_c h_c'' = H'H'';$$

ed è noto ancora che

$$a^2 + h_a'^2 = b^2 + h_b'^2 = c^2 + h_c'^2 = 4R^2;$$

e combinando queste due ultime formole colla (1), si ha

$$2(H'H'' + 4R^2) = (a^2 + b^2 + c^2);$$

da cui si ha la formola

$$h_a h_a'' = h_b h_b'' = h_c h_c'' = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} - 4R^2.$$

II. — Indicando con x, y, z le coniugate isogonali delle altezze di un triangolo, si ha

$$\frac{x + y + z}{4RS} = \frac{1}{a(h_a + h_a')} + \frac{1}{b(h_b + h_b'')} + \frac{1}{c(h_c + h_c'')}$$

È noto il seguente teorema di Steiner: se due coniugate isogonali AM, AN dell'angolo BAC del triangolo ABC, incontrano il lato opposto BC in M ed in N, si ha la relazione

$$\overline{AM^2} : \overline{AN^2} = \overline{BM \cdot MC} : \overline{BN \cdot NC}.$$

Osservando allora che la coniugata isogonale dell'altezza passa per il centro del cerchio circoscritto al triangolo, applicando il teorema ora enunciato, si ha

$$\frac{h^2}{x^2} = \frac{h_a h_a''}{\overline{BN \cdot NC}} = \frac{h_a h_a''}{x(2R - x)},$$

da cui

$$x = \frac{2Rh_a}{h_a + h_a''} = \frac{bc}{h_a + h_a''}$$

epperò

$$x = \frac{abc}{a(h_a + h_a'')} = \frac{4RS}{a(h_a + h_a'')}$$

Analogamente operando per y e z si ha la formola enunciata.

III. — Indicando con D, E, F rispettivamente i piedi delle altezze h_a, h_b, h_c di un triangolo acutangolo ABC (è facile stabilire le considerazioni analoghe per gli altri casi), si ha la formola

$$\frac{c^2 \cdot DC + h^2 \cdot BD}{h_a + h_a''} = \frac{a^2 \cdot EA + c^2 \cdot CE}{h_b + h_b''} = \frac{h^2 \cdot FB + a^2 \cdot AF}{h_c + h_c''} = S.$$

Dal teorema di Stewart si ha

$$\overline{AB^2} \cdot DC + \overline{AC^2} \cdot BD = BC(\overline{AD^2} + BD \cdot DC),$$

ossia

$$c^2 \cdot DC + b^2 \cdot BD = S(h_a + h_a'').$$

Analogamente si deducono le altre parti della formola enunciata.

IV. — Colle notazioni precedenti si ha in generale

$$\frac{BD \cdot FC}{DC \cdot BE} = \frac{c}{b}.$$

Applicando il teorema di Stewart al triangolo ABC , si ha

$$BC \cdot \overline{AD^2} - BD \cdot \overline{AC^2} - DC \cdot \overline{AB^2} + BC \cdot BD \cdot DC = 0.$$

Applicando lo stesso teorema al triangolo BHC (H è l'ortocentro del triangolo ABC), si ha

$$BC \cdot \overline{HD^2} - BD \cdot \overline{HC^2} - DC \cdot \overline{HB^2} + BC \cdot BD \cdot DC = 0,$$

Sommando ora queste due formole si ha l'altra

$$BC(\overline{AD^2} + \overline{HD^2}) - BD(\overline{AC^2} + \overline{HC^2}) - DC(\overline{AB^2} + \overline{HB^2}) + 2BC \cdot BD \cdot DC = 0,$$

e tenendo conto che si ha pure

$$\overline{AD^2} + \overline{HD^2} = \overline{HA^2} + 2AD \cdot HD,$$

$$\overline{AC^2} + \overline{CH^2} = \overline{AH^2} + 2AC \cdot FC,$$

$$\overline{AB^2} + \overline{HB^2} = \overline{HA^2} + 2AB \cdot BE,$$

la precedente diviene

$$\overline{HA^2}(BC - BD - DC) + 2BC(AD \cdot HD - BD \cdot DC) + 2(DC \cdot AB \cdot BE - BD \cdot CA \cdot FC) = 0,$$

ma

$$BC - BD - DC = 0, \quad AD \cdot HD - BD \cdot DC = 0,$$

epperò la precedente diviene la formola enunciata.

V. Dal teorema enunciato in principio risulta ancora: Costruendo sui lati di un triangolo ABC i tre triangoli simmetrici $A'BC, B'AC, C'BA$, il cerchio circoscritto al triangolo ABC taglia le AA', BB', CC' rispettivamente negli ortocentri di questi triangoli; e le circonferenze a queste circoscritte si tagliano nell'ortocentro del triangolo fondamentale ABC .

SOLUZIONE DELLE QUISTIONI

291 292* 295* 324* 359* 372* 373* 374* 376* 377* E 378

291. 1°. Se per un punto M del piano di un triangolo si tracciano delle parallele ai lati e si costruiscono i coniugati armonici di M rispetto ai segmenti intercetti dai lati su queste parallele, i tre punti così determinati sono in linea retta.

2°. Le rette ottenute colla costruzione precedente per un punto ed i suoi isobarici, o per i tre punti semireciproci di un punto dato, formano un triangolo che è triplamente omologico a quello fondamentale.

JUAN I. DURÁN LOBIGA.

Risoluzione e generalizzazione del sig. prof. F. Ferrari.

1°. Si tirino dal punto M tre rette qualunque MX, MX', MX'' ad incontrare rispettivamente i lati a, b, c (o i loro prolungamenti) del triangolo fondamentale ABC nei punti X, X', X'' , e sieno Q, Q', Q'' rispettivamente i coniugati armonici di M rispetto ai segmenti delle rette MX, MX', MX'' intercetti dalle coppie di lati $(b, c), (c, a), (a, b)$ rispettivamente. La condizione necessaria e sufficiente perchè Q, Q', Q'' sieno in linea retta è che sieno in linea retta i punti X, X', X'' .

Ponendo $\frac{BX}{CX} = m$, le coordinate baricentriche di X rispetto ad ABC sono $(0, 1, m)$, e ponendo dunque in coordinate baricentriche $M(\alpha', \beta', \gamma'), Q(\alpha, \beta, \gamma)$, poichè M, Q, X sono in linea retta, sarà

$$(1) \quad \begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = 0,$$

Chiamando Y, Z i punti ove MX sega rispettivamente b, c ; ed M_a, Q_a le proiezioni di M, Q su a da A , si ha inoltre

$$(ZYMQ) = (BCM_a Q_a) = -1$$

donde

$$(2) \quad \frac{BQ_a}{Q_a C} = -\frac{BM_a}{M_a C},$$

ossia

$$\frac{\gamma}{\beta} = -\frac{\gamma'}{\beta'}$$

Dalle (1), (2) si ottengono le coordinate di Q , e cioè

$$\alpha : \beta : \gamma = \alpha' (m\beta' + \gamma') : \beta' (m\beta' - \gamma') : -\gamma' (m\beta' - \gamma').$$

Le coordinate di Q', Q'' , ponendo

$$\frac{OX'}{X'A} = m', \quad \frac{AX''}{X''B} = m'',$$

si avranno evidentemente da quelle di Q , mutando m in m' o in m'' , e permutando circolarmente fra α', β', γ' e fra α, β, γ ; si avrà dunque per Q'

$$\beta : \gamma : \alpha = \beta' (m'\gamma' + \alpha') : \gamma' (m'\gamma' - \alpha') : -\alpha' (m'\gamma' - \alpha')$$

per Q''

$$\gamma : \alpha : \beta = \gamma'(m''\alpha' + \beta') : \alpha'(m''\alpha' - \beta') : -\beta'(m''\alpha' - \beta')$$

La condizione perchè Q, Q', Q'' sieno in linea retta è quindi

$$\begin{vmatrix} \alpha'(m\beta' + \gamma') & \beta'(m\beta' - \gamma') & -\gamma'(m\beta' - \gamma') \\ -\alpha'(m'\gamma' - \alpha') & \beta'(m'\gamma' - \alpha') & \gamma'(m'\gamma' - \alpha') \\ \alpha'(m''\alpha' - \beta') & -\beta'(m''\alpha' - \beta') & \gamma'(m''\alpha' + \beta') \end{vmatrix} = 0$$

Il determinante è eguale a

$$4\alpha'^2\beta'^2\gamma'^2(m m' m'' + 1);$$

onde la condizione predetta ritenendo che M non sia sul perimetro di ABC (cioè che nessuna delle α', β', γ' sia zero), nel quale caso evidentemente le Q, Q', Q'' sono sempre in linea retta, perchè due di esse coincidono con M , si riduce alla

$$(3) \quad m m' m'' = -1,$$

cioè X, X', X'' in linea retta.

2°. Sieno ora $P(\beta', \gamma', \alpha'), S(\gamma', \alpha', \beta')$ i due punti isobarici di M . Da P si tirino tre rette a dividere a, b, c rispettivamente nei rapporti m', m'', m , e da S tre rette a dividere a, b, c rispettivamente nei rapporti m'', m, m' , e si costruiscano rispetto a P e ad S le due terne di punti

$$(Q_1, Q'_1, Q''_1), (Q_2, Q'_2, Q''_2)$$

analoghe alla terna (Q, Q', Q'') .

Permutando circolarmente fra m, m', m'' e fra α', β, γ' , dalle coordinate di Q si dedurranno quelle di Q_1 e Q_2 , dalle coordinate di Q' quelle di Q'_1 e Q'_2 , dalle coordinate di Q'' quelle di Q''_1 e Q''_2 . Fatto ciò, si trova che i punti (Q, Q'_1, Q''_2) sono fra loro isobarici, come pure i punti (Q', Q_1, Q''_2) , e i punti (Q'', Q'_1, Q_2) , e perciò le rette $QQ', Q'_1Q_1, Q'_2Q''_2$, ossia, nell'ipotesi (3), le rette $QQ', Q'_1Q_1, Q'_2Q''_2$, $Q'_1Q_1, Q'_2Q''_2$, Q''_1Q_1, Q''_2Q_2 si incontrano in tre punti fra loro isobarici, che quindi formano un triangolo triplamente omologico ad ABC .

Tre punti semireciproci di un punto dato sono fra loro isobarici; onde questo caso rientra nel precedente.

Si noti che, indipendentemente dall'ipotesi (3), i triangoli $(Q, Q''_1, Q'_2), (Q', Q_1, Q''_2), (Q'', Q'_1, Q_2)$ e i trilateri $(QQ', Q''_1Q_1, Q'_2Q''_2), (QQ'', Q''_1Q'_1, Q'_2Q_2), (Q'Q'', Q'_1Q''_1, Q'_2Q_2)$ sono tutti triplamente omologici con ABC , siccome aventi per vertici terne di punti isobarici.

292*. *Mostrare che le radici dell'equazione quadratica*

$$(1 - \lambda)x^2 - [a + a' - \lambda(b + b')]x + aa' - \lambda bb' = 0,$$

ove a, b, a', b', λ sono numeri reali, sono sempre reali e distinte se è

$$\lambda(a - b)(a' - b') > 0; \quad \text{e se è } \lambda(a - b)(a' - b') < 0,$$

dette radici possono essere reali e distinte, reali ed eguali, o immaginarie coniugate.

A. DEL RE.

Risoluzione del sig. Guido Bordini alunno del R. Istituto Tecnico di Piacenza.

Calcolo il discriminante dell'equazione quadratica proposta:

$$D = [a + a' - \lambda(b + b')]^2 + 4(\lambda - 1)(aa' - \lambda bb'),$$

$$D = (a + a')^2 + \lambda^2(b + b')^2 - 2\lambda(a + a')(b + b') + 4\lambda aa' - 4\lambda^2 bb' - 4aa' + 4\lambda bb'$$

$$D = a^2 + a'^2 + 2aa' + \lambda^2 b^2 + \lambda^2 b'^2 + 2\lambda^2 bb' - 2\lambda ab - 2\lambda ab' - 2\lambda a'b - 2\lambda a'b' + 4\lambda aa' - 4\lambda^2 bb' - 4aa' + 4\lambda bb'$$

$$D = a^2 + \lambda^2 b^2 - 2\lambda ab + a'^2 + \lambda^2 b'^2 - 2\lambda a'b' - 2aa' - 2\lambda ab' - 2\lambda a'b - 2\lambda^2 bb' + 4\lambda aa' + 4\lambda bb',$$

$$D = (a - \lambda b)^2 + (a' - \lambda b')^2 - 2aa' - 2\lambda bb' + 2\lambda ab' + 2\lambda a'b' + 4\lambda aa' + 4\lambda bb' - 4\lambda ab - 4\lambda a'b,$$

$$D = (a - \lambda b)^2 + (a' - \lambda b')^2 - 2[aa' + \lambda^2 bb' - \lambda ab' - \lambda a'b] + 4\lambda[aa' + bb' - ab - a'b],$$

$$D = (a - \lambda b)^2 + (a' - \lambda b')^2 - 2[a(a' - \lambda b') - \lambda b(a' - \lambda b')] + 4\lambda[a(a' - b') - b(a' - b')],$$

$$D = (a - \lambda b)^2 + (a' - \lambda b')^2 - 2(a - \lambda b)(a' - \lambda b') + 4\lambda(a - b)(a' - b'),$$

$$D = [(a - \lambda b) - (a' - \lambda b')]^2 + 4\lambda(a - b)(a' - b'),$$

$$D = [a - a' - \lambda(b - b')]^2 + 4\lambda(a - b)(a' - b').$$

Ora il primo termine essendo un quadrato è positivo, quindi per

$$\lambda(a - b)(a' - b') \geq 0$$

le radici sono reali e distinte, perchè $D > 0$.

Se $\lambda(a - b)(a' - b') < 0$, si possono considerare tre casi: che il primo termine superi il secondo in valore assoluto, e allora le radici sono reali e distinte, perchè $D > 0$; che il primo termine sia eguale al secondo in valore assoluto, allora $D = 0$, e quindi le radici sono reali ed uguali; in fine che il primo termine sia minore del secondo, e in questo caso, essendo $D < 0$, le radici sono immaginarie coniugate.

295*. Di un triangolo isoscele sono dati il perimetro $2p$ e l'altezza h , determinare i lati e gli angoli del triangolo.

Condizione di possibilità del problema e caso in cui il triangolo è equilatero.

BELLACCHI.

Risoluzione del sig. Emanuele Palumbo Todaro, studente della R. Università di Palermo.

Indicando con x e y rispettivamente il lato e la base del triangolo isoscele, le equazioni per mezzo delle quali si risolve il problema sono:

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad 2x + y = 2p \\ (2) \quad 4h^2 + y^2 = 4x^2 \end{array} \right\}$$

Risolvendo la (1) rispetto ad y , e sostituendo il valore di questo nella (2) si ha riducendo

$$h^2 + p^2 = 2px$$

da cui

$$x = \frac{h^2 + p^2}{2p}.$$

Sostituendo poi questo valore nella (1) e risolvendo rispetto ad y otteniamo:

$$y = 2p - \frac{h^2 + p^2}{p} = \frac{p^2 - h^2}{p}.$$

Denotando ora con α uno degli angoli alla base, risulta evidente la seguente relazione

$$\text{sen } \alpha = \frac{2ph}{h^2 + p^2};$$

e chiamando β l'angolo al vertice si ha:

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{y}{x} \operatorname{sen} \alpha = \frac{4ph(p^2 - h^2)}{(h^2 + p^2)^2}$$

Discussione. — Dalle formole trovate emerge che la condizione di possibilità del problema è che $p^2 - h^2$ sia maggiore di zero, cioè che p sia maggiore di h .

Affinchè il triangolo sia equilatero deve essere $3x^2 = 4h^2$ ossia $p = h\sqrt{3}$ essendo in questo caso $x = \frac{2p}{3}$.

324*. Mostrare come, risolvendo rispetto ad u, v, w le equazioni

$$\begin{cases} u' = \frac{\lambda(-u^2 + v^2 + w^2) - 2(\mu v + \nu w)u}{u^2 + v^2 + w^2 - 2\lambda u - 2\mu v - 2\nu w} \\ v' = \frac{\mu(u^2 - v^2 + w^2) - 2(\nu w + \lambda u)v}{u^2 + v^2 + w^2 - 2\lambda u - 2\mu v - 2\nu w} \\ w' = \frac{\nu(u^2 + v^2 - w^2) - 2(\lambda u + \mu v)w}{u^2 + v^2 + w^2 - 2\lambda u - 2\mu v - 2\nu w} \end{cases}$$

si hanno, posto

$$H = \sqrt{u'^2 + v'^2 + w'^2},$$

ed

$$K = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2},$$

le formole

$$\begin{cases} u = \frac{H\lambda \pm Ku'}{H \pm K} \\ v = \frac{H\mu \pm Kv'}{H \pm K} \\ w = \frac{H\nu \pm Kw'}{H \pm K} \end{cases}$$

Risoluzione del sig. Francesco Barbagallo alunno del R. Istituto Tecnico di Catania.

Aggiungendo e sottraendo $2\lambda u^2, 2\mu v^2, 2\nu w$, rispettivamente ai numeratori delle frazioni che sono per ipotesi eguali a u', v', w' rispettivamente, si ha, facendo

$$u^2 + v^2 + w^2 = x, \quad 2(\lambda u + \mu v + \nu w) = y,$$

$$\begin{cases} u' = \frac{\lambda x - \mu u}{x - y} \\ v' = \frac{\mu v - \nu w}{x - y} \\ w' = \frac{\nu x - \gamma w}{x - y}; \end{cases}$$

donde

$$(1) \begin{cases} u(x - y) = \lambda x - \mu u \\ v'(x - y) = \mu x - \nu w \\ w'(x - y) = \nu x - \gamma u \end{cases}$$

cioè

$$\begin{cases} x(u' - \lambda) = y(u' - u) \\ x(v' - \mu) = y(v' - v) \\ x(w' - \nu) = y(w' - w), \end{cases}$$

per cui

$$(2) \frac{u' - \lambda}{u' - u} = \frac{v' - \mu}{v' - v} = \frac{w' - \nu}{w' - w} = \frac{y}{x}$$

Dalle (1) ora si ha

$$\begin{cases} u'^2(x-y)^2 = \lambda^2 x^2 + y^2 u'^2 - 2\lambda u'xy \\ v'^2(x-y)^2 = \mu^2 x^2 + y^2 v'^2 - 2\mu v'xy \\ w'^2(x-y)^2 = \nu^2 x^2 + y^2 w'^2 - 2\nu w'xy; \end{cases}$$

sommando membro a membro e facendo

$$H^2 = u'^2 + v'^2 + w'^2; \quad K^2 = \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2,$$

si ha

$$H^2(x-y)^2 = K^2 x^2;$$

ed allora

$$Hx - Hy \pm Kx = 0,$$

ovvero

$$(H \pm K)x = Hy,$$

donde

$$\frac{H \pm K}{H} = \frac{y}{x}.$$

Dalle (2) si ricava

$$\frac{u' - \lambda}{u' - u} = \frac{v' - \mu}{v' - v} = \frac{w' - \nu}{w' - w} = \frac{H \pm K}{H},$$

ovvero

$$\begin{cases} (u' - \lambda)H = (H \pm K)(u' - u) \\ (v' - \mu)H = (H \pm K)(v' - v) \\ (w' - \nu)H = (H \pm K)(w' - w); \end{cases}$$

cioè eseguendo le moltiplicazioni, eliminando i termini simili e raccogliendo a fattor comune si ha:

$$\begin{cases} u(H \pm K) = \lambda H \pm u'K \\ v(H \pm K) = \mu H \pm v'K \\ w(H \pm K) = \nu H \pm w'K \end{cases}$$

donde

$$\begin{cases} u = \frac{\lambda H \pm u'K}{H \pm K} \\ v = \frac{\mu H \pm v'K}{H \pm K} \\ w = \frac{\nu H \pm w'K}{H \pm K} \end{cases}$$

359*. *In un triangolo qualunque ciascuna bisettrice è divisa dal centro del circolo inscritto in due parti, che stanno fra loro come la somma dei lati che comprendono l'angolo bisecato sta al terzo lato.*

CARDOSO LAYNES.

Risoluzione del sig. Michele Bello alunno dell'Istituto Tecnico di Bari.

Siano ABC il triangolo, ED e AE due bisettrici ed O il centro del circolo inscritto. Essendo BD bisettrice di \widehat{B} si ha: $AB:BC::AD:DC$, e componendo,

$$(1) \quad AB + BC : AB :: AC : AD.$$

Essendo AO bisettrice di \widehat{A} si ha pure, $BO:AB::OD:AD$, e paragonandola con la (1) risulta: $BO:OD::AB+BC:AC$, c, d, d.

372*. *La sesta potenza di qualunque numero intero è congrua a 0 o ad 1 rispetto al mod. 9.*

Risoluzione del sig. Eugenio Strocchi.

Ogni intero x o è primo con 9 od ha la forma $3y$.
In quest'ultimo caso è evidente che si ha

$$(3y)^6 \equiv 0 \pmod{9}.$$

Nel 1° caso poi, pel teor. di Fermat generalizzato, si ha

$$x^{p(9)} \equiv 1 \pmod{9} \quad \text{ossia} \quad x^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

373*. La terza potenza di ogni numero intero è congrua a 0 o a ± 1 o a ± 5 rispetto al mod. 13.

374*. La sesta potenza di ogni numero intero è congrua a 0 o a ± 1 rispetto al mod. 13.

BONOLIS.

Risoluzione del sig. Eugenio Strocchi.

Premettiamo che, essendo p un numero primo, da

$$a^p \equiv b^p \pmod{p} \quad \text{si ricava} \quad a \equiv \pm b \pmod{p}.$$

Infatti, essendo $a^p - b^p = (a + b)(a - b)$, p dovrà dividere o $a + b$ o $a - b$.

Osserviamo ora che ogni intero x o è divisibile per 13 o è primo con 13. —
Nel primo caso, qualunque sia k , si ha

$$x^k \equiv 0 \pmod{13}.$$

Supponendo poi che x sia primo con 13, pel teor. di Fermat si ha

$$x^{12} \equiv 1 \pmod{13}$$

da cui, per quanto si è premesso,

$$(1) \quad x^3 \equiv \pm 1 \pmod{13}.$$

Resta così dimostrata la 2ª questione.

Dalla prima delle congruenze (1), per ciò che abbiamo premesso si ha pure:

$$x^3 \equiv \pm 1 \pmod{13}.$$

Dalla seconda delle congruenze (1) si ha evidentemente

$$x^6 \equiv 25 \pmod{13},$$

da cui

$$x^3 \equiv \pm 5 \pmod{13}.$$

Resta dunque dimostrata la 1ª questione.

376*. Se si ha $N \equiv 6 \pmod{15}$, qualunque potenza di N sarà congrua a 6, (mod. 15).

377*. Se si ha $N \equiv 10 \pmod{15}$, qualunque potenza di N sarà congrua a 10, (mod. 15).

BONOLIS.

Risoluzione del sig. Eugenio Strocchi.

Si ha

$$6 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 10 \equiv 1 \pmod{3};$$

e qualunque sia p si ricava

$$6^{p-1} \equiv 1 \pmod{5}, \quad 10^{p-1} \equiv 1 \pmod{3};$$

da cui si ha facilmente

$$6^p \equiv 6 \pmod{15}, \quad 10^p \equiv 10 \pmod{15}.$$

E siccome dall'ipotesi si ricava

$$\begin{aligned} N^p &\equiv 6^p \pmod{15}, & N^p &\equiv 10^p \pmod{15}, \\ \text{si ha infine} & & N^p &\equiv 6 \pmod{15}, & N^p &\equiv 10 \pmod{15}. \end{aligned}$$

578. Dimostrare le identità

$$\begin{aligned} (1) \quad \sin(nx) &= \begin{vmatrix} 2 \cos x & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos x & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \cos x \end{vmatrix} \sin x \\ (2) \quad \cos(nx) &= \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos x & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 \cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \cos x \end{vmatrix} \end{aligned}$$

dove il primo determinante è di ordine $n-1$ il secondo di ordine n .

BETTINI.

Risoluzione del sig. Eugenio Strocchi.

a) Per $n=2$ la (1) è evidente; infatti essa diventa $\sin 2x = 2 \cos x \sin x$.

Ma essa è poi vera anche per $n=3$; infatti si ha

$$\begin{vmatrix} 2 \cos x & 1 \\ 1 & 2 \cos x \end{vmatrix} \sin x = (4 \cos^2 x - 1) \sin x = (3 - 4 \sin^2 x) \sin x = \sin 3x.$$

Proveremo ora, che se è vera fino ad $n=p-1$, è vera anche per $n=p$. Indicando con D_r il determinante di ordine r della forma (1), ed applicando una nota formola sui determinanti (Vedi CESARO, *Analisi algebrica*, pag. 12, § 7) si ha

$$D_{p-1} = 2 \cos x D_{p-2} - D_{p-3}.$$

Ed essendo per quanto si è supposto,

$$D_{p-2} \sin x = \sin(p-1)x, \quad D_{p-3} \sin x = \sin(p-2)x$$

si ha

$$\begin{aligned} D_{p-1} \sin x &= 2 \cos x \sin(p-1)x - \sin(p-2)x = [\sin px + \sin(p-2)x] - \sin(p-2)x \\ &= D_{p-1} \sin x = \sin px. \end{aligned}$$

Possiamo dunque asserire che la (1) è vera in generale.

b) Lasciaremos al lettore la cura di verificare che la (2) è verificata per $n=1, 2$. Per poter affermare che è vera in generale, basta che, supponendola vera fino ad $n=p-1$, si dimostri che è vera anche per $n=p$.

Indicando con D'_r il determinante di r^{mo} ordine del tipo (2) si ha:

$$D'_p = 2 \cos x D'_{p-1} - D'_{p-2}.$$

Ed essendo per ipotesi

$$D'_{p-1} = \cos(p-1)x, \quad D'_{p-2} = \cos(p-2)x,$$

si ha

$$\begin{aligned} D'_p &= 2 \cos x \cos(p-1)x - \cos(p-2)x = [\cos px + \cos(p-2)x] - \cos(p-2)x \\ &= D'_p = \cos px. \end{aligned}$$

Altra risoluzione del sig. E. Laura.

QUISTIONI PROPOSTE (*)

383*. Trovare l'espressione dell'area d'un quadrilatero ABCP del quale si conoscono due lati consecutivi e l'angolo da essi compreso, $\overline{AC} = a$, $\overline{BC} = b$, $\widehat{ABC} = B$, e gli angoli che la diagonale passante pel vertice B forma coi due lati adiacenti nel vertice P, $\widehat{APB} = \alpha$, $\widehat{BPC} = \beta$.

384. Trovare l'espressione dell'area d'un poligono ABCP₁P₂...P_nP₁ di (n + 3) lati del quale si conoscono due lati consecutivi e l'angolo da essi compreso $\overline{AB} = a$, $\overline{BC} = b$, $\widehat{ABC} = B$ e gli angoli che le diagonali passanti pel vertice B formano cogli altri lati successivi nei vertici:

$$P_1, P_2, P_n, \widehat{AP_1B} = \alpha_1, \widehat{BP_1P_2} = \beta; \widehat{BP_2P_1} = \alpha_2, \widehat{BP_2P_3} = \beta_2; \dots$$

$$\widehat{BP_nP_{n-1}} = \alpha_n, \widehat{BP_nC} = \beta_n.$$

DELITALA.

385*. Dimostrare l'uguaglianza

$$\sqrt[7]{29 + 13\sqrt{5}} - \sqrt[7]{29 - 13\sqrt{5}} = \sqrt[7]{2}.$$

GÉLIN.

386. Date in un medesimo piano tre punteggiate simili, il luogo del centro del cerchio circoscritto al triangolo formato da tre punti omologhi è una cubica razionale.

387. Date in un piano tre punteggiate eguali trovare il luogo del centro del cerchio circoscritto al triangolo avente per vertici tre punti omologhi.

REYALI.

388*. Dati due corpi di forma sferica e di peso P, P', determinare la relazione fra p e p' (pesi specifici), perchè, essendo P = nP', il corpo di peso P', cadendo nell'aria, acquisti una velocità costante maggiore di quella che acquisterebbe il corpo di peso P, ammettendo che la resistenza dell'aria sia proporzionale al quadrato della velocità.

BARBAGALLO.

389*. Se N e k sono numeri interi ed r > 1, si ha N^{6k+r} ≡ N^r (modulo 9).

390*. La quinta potenza d'ogni numero intero è congrua a 0, o a ± 1 rispetto al modulo 11.

BONOLIS.

(*) Le quistioni contrassegnate con un asterisco sono proposte agli studenti delle scuole secondarie; le altre a tutti gli studiosi indistintamente.

BIBLIOGRAFIA

TOLOMEI. — *Tavole dei logaritmi a cinque decimali.* — Firenze, Succ. Le Monnier 1897.

Questo manualetto si distingue dagli altri dello stesso genere per la nitidezza ed eleganza dell'edizione. Oltre alle tavole dei numeri e delle linee trigonometriche, precedute da una succinta spiegazione sul loro uso, contiene varie altre tavole di uso frequente. Crediamo quindi che esso potrà esser molto utile agli studenti.

RIBONI Dott. G. — *Elementi di geometria ad uso delle scuole secondarie superiori, 2ª edizione con molte aggiunte e correzioni.* — Bologna, Zanichelli 1898.

Della 1ª edizione di questo libro, già favorevolmente conosciuto dal pubblico si occupò diffusamente il *Periodico di Matematica*, (Fasc. III-IV anno 1894). Le aggiunte fatte sono enunciate nella prefazione colle parole seguenti:

“ Fra le innovazioni noterò un maggiore sviluppo nei preliminari; l'aggiunta di alcune nozioni sulle figure direttamente ed inversamente eguali e simili; di qualche teorema sull'equivalenza, sulle serie, sulla misura, sulle grandezze proporzionali; del teorema di Stewart; di qualche nozione sulla divisione armonica; di un'applicazione del teorema di Tolomeo sul quadrilatero iscritto. Infine dove mi si presentò l'occasione, ho dato qualche notizia storica, che credo utile anche agli studenti delle scuole secondarie „

SERRET. — *Trattato di trigonometria piana e sferica tradotto da Francesco Grassi, 4ª edizione con note ed aggiunte del traduttore, 1000 esercizi colle risposte, ed un formulario di matematica e fisica.* — Bocca, Firenze 1898.

Questo libro è tanto conosciuto che crediamo inutile parlare di esso. Il rapido succedersi delle edizioni, attesta il favore degli insegnanti per questa ormai vecchia opera.

Prospetto degli studi della I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste, pubblicato alla fine dell'anno scolastico 1896-97. — Trieste, Herrmanstorfer.

Questo prospetto contiene oltre i programmi d'insegnamento di quell'importante accademia e la cronaca dell'anno scolastico, una interessante biografia del celebre scienziato e violinista Giuseppe Tartini scritta dal prof. Giorgio Benedetti, e un curioso lavoro inedito dello stesso Tartini, intitolato: *Scienza dei triangoli pitagorici dipendenti dai tre mezzi determinati dalle proporzioni geometriche, discrete di questa scienza di cui sono una parte integrante.*

Lo stesso prof. Benedetti presenta ai lettori l'articolo suddetto colle seguenti parole:

“ Dissi in quei miei studi (su Tartini) di un matematico punto dispregevole di questa città, che essendo stato per parecchi anni a Pirano, mercè la gentilezza del bibliotecario comunale, che gli aveva aperto i battenti del sacrario tartiniano, aveva potuto comporre un suo studio sulla scienza dei triangoli pi-

“ tagorici del Tartini, studio questo che poi ridotto e compendiato ebbe l'alto
 “ onore di venire stampato nella Rivista dei Ginnasi Austriaci. Il Professore in
 “ parola è il sig. Enrico Zavagna, che, da me pregato a volere stampare questo
 “ suo studio, di 20 anni addietro, di buon grado accondiscese, che in questo pro-
 “ gramma, non più in compendio, ma in tutta la sua interezza, potesse trovar
 “ posto „

Il prof. Benedetti infine cita le seguenti parole del prof. Zavagna, alle quali
 volentieri ci associamo. “ Sarebbe desiderabile che i manoscritti del Tartini, an-
 “ cora inediti, venissero tolti dalla polvere della biblioteca, poichè contengono
 “ importantissime ricerche nel campo della matematica e della fisica „

ASSOCIAZIONE “ MATHESIS „

L'Associazione *Mathesis* pubblicò per due volte il suo Bollettino nel
 decorso anno sulle pagine di questo giornale. Nell'anno attuale l'Asso-
 ciazione, resasi indipendente dal *Periodico*, ha pubblicato separatamente
 i fascicoli 3 e 4. In essi, oltre le notizie interessanti i Soci, si trovano
 un elenco delle pubblicazioni matematiche recenti, fatte sul catalogo quin-
 dicinale della Biblioteca Nazionale di Firenze, una rubrica destinata a
 raccogliere quanto di notevole o di interessante per la matematica ele-
 mentare si trova in libri o periodici italiani ed esteri, i programmi da
 insegnamento per la matematica nelle Scuole secondarie estere (per ora
 di Svizzera e Francia), le relazioni sui lavori dell'Associazione rappre-
 sentati da adunanze, da risposte alle questioni del Comitato, da memo-
 riali al Ministero, e infine articoli originali dei Soci.

Il N. 4 contiene già le relazioni sulle risposte spedite dai Soci alla
 questione II (V. N. 1 del Bollettino) “ Modificazioni da portarsi nei
 vigenti programmi per l'insegnamento scientifico nelle scuole medie, af-
 finchè quello di matematica riesca maggiormente coordinato con quello
 delle scienze affini „ e alla questione VI (ivi) “ Se e come convenga mo-
 dificare e completare l'insegnamento della matematica attualmente impar-
 tito nelle scuole secondarie, e specialmente nei Licei, per ottenere un
 migliore ordinamento con la facoltà di matematica pura ed applicata „.
 Contiene anche il Memoriale spedito all'on. Ministro dal Comitato; nel
 quale sono chieste alcune riforme nell'insegnamento della matematica
 nelle scuole secondarie, suggerite dalle risposte alle questioni del Comi-
 tato indicate dai Soci. Le riforme domandate sono: che nelle scuole se-
 condarie classiche sia data alla matematica l'importanza che le spetta,
 e che nei Licei, alleggerito il programma per la comune degli studenti,
 sia istituito un corso complementare per i soli iscrivendi alle facoltà
 scientifiche universitarie, e negli Istituti tecnici sia alleggerito e meglio
 distribuito il programma della sezione fisico-matematica; che nel Liceo
 la materia comune a tutti gli studenti si svolga entro i primi due anni;
 che dell'aritmetica razionale una parte sia tolta al Ginnasio ed al 1°

anno d'Istituto e portata al Liceo ed al 2° biennio d'Istituto; che sia modificato il programma di geometria nel Ginnasio; che sia resa possibile nell'insegnamento della geometria la scelta fra il metodo della separazione e quello della fusione della planimetria e stereometria; che sia ripristinata la prova scritta di matematica almeno negli esami di Licenza.

I N. 3 e 4 del Bollettino portano inoltre i verbali delle adunanze, promosse dall'associazione e tenute fra professori soci e non soci, nelle quali si sono discusse le quistioni proposte dal Comitato: adunanze che hanno potuto aver luogo nella città di Palermo, Milano, Padova, Torino, Chieti, Firenze.

Nel N. 3 sono pubblicate due comunicazioni sulla questione VII relativa all'equivalenza, una del prof. CIAMBERLINI, il quale propone di sostituire al postulato del Giudice «ogni sfera è finita» l'altro «esistono un triangolo e un tetraedro finito» che apparisce più semplice, e che è sufficiente per trattare la teoria dell'equivalenza — l'altra del prof. SERANA nella quale l'autore stabilisce che, a parer suo, i postulati necessari alla teoria delle grandezze, in un corso elementare di Geometria, sono quelle della rovesciabilità dell'angolo, quello sull'equivalenza dei solidi, e quello d'Archimede sui segmenti, e suggerisce come definizione d'equivalenza quello da lui data già nel 1894, che cioè due grandezze si dicano equivalenti, se possono decomporre in modo che ogni parte dell'una abbia la sua corrispondente uguale nell'altra e reciprocamente, sia finito od infinito il numero di queste parti.

Nel N. 4 col titolo «Un appunto agli attuali programmi di matematica del 1° biennio degli Istituti Tecnici» il prof. SFORZA propone una miglior distribuzione delle materie nell'Istituto tecnico per evitare gli inconvenienti che si hanno ora nell'insegnare la teoria delle proporzioni fra grandezze senza ricorrere al concetto di rapporto, mentre dalle Scuole tecniche i giovanetti escono conoscendo le proporzioni numeriche. Il professor BETTAZZI in un suo articolo che risponde alla questione VII suggerisce che per evitare le difficoltà della trattazione della teoria dell'equivalenza nella scuola, si definiscano equivalenti due enti, che siano o somma di enti uguali - o differenza di enti uguali - o equisummultipli di enti uguali - o equivalenti ad uno stesso ente per una di tali ragioni - o somma, differenza, equimultipli, equisummultipli, o equivalenti di enti già riconosciuti equivalenti: e che si scansi il concetto di limite facendo comparire le grandezze, nelle quali esso si suole usare come somme di infinite grandezze. Riferiamo la definizione di equivalenza proposta dal Prof. Bettazzi, ma non l'approviamo affatto, poichè ci sembra della stessa natura di questa evidentemente assurda. *Si chiama parallelogrammo un quadrangolo che ha ogni lato parallelo al suo opposto, oppure che ha ogni lato eguale al suo opposto, oppure che ha ogni angolo eguale al suo opposto, oppure che ha due lati opposti eguali e paralleli, oppure che ha le diagonali che si dividono scambievolmente per metà.*

GIULIO LAZZERI — Direttore responsabile

Finito di stampare il 10° Novembre 1897.